
STIELTJESŮV INTEGRÁL

Kurzweilova teorie

Milan Tvrđý



Univerzita Palackého v Olomouci

STIELTJESŮV INTEGRÁL

Kurzweilova teorie

Milan Tvrdý



”Il semble donc que les sommes de Riemann-Stieltjes aient encore un bel avenir devant elle en calcul intégral, et qu’elles pourront réserver encore, dans les mains d’habiles analystes, d’intéressantes surprises.”

Jean Mawhin

Oponenti:

prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc.

doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D.

Ivo Vrkoč, DrSc.

1. vydání

© Milan Tvrďý, 2012

© Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

ISBN 978-80-244-3240-3

Publikace vychází za podpory výzkumného záměru MSM 6198959214 „Matematické modely a struktury“ (příjemce Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého) a institucionální podpory dlouhodobého rozvoje výzkumných organizací RVO 67985840 (příjemce Matematický ústav AV ČR).

Neoprávněné užití tohoto díla je porušením autorských práv a může zakládat občanskoprávní, správněprávní, popř. trestněprávní odpovědnost.

Obsah

Předmluva	5
Úmluvy a označení	9
1 Úvod	13
1.1 Obsah rovinných útvarů a momenty	13
1.2 Křivkové integrály	15
2 Funkce s konečnou variací	17
2.1 Definice a základní vlastnosti	17
2.2 Prostor funkcí s konečnou variací	24
2.3 Konečná variace a spojitost	27
2.4 Derivace funkcí s konečnou variací	31
2.5 Skokové funkce	32
2.6 Jordanův rozklad funkce s konečnou variací	36
2.7 Bodová konvergence	39
3 Absolutně spojitě funkce	43
3.1 Definice a základní vlastnosti	43
3.2 Absolutně spojitě funkce a Lebesgueův integrál	48
3.3 Lebesgueův rozklad funkcí s konečnou variací	52
4 Regulované funkce	55
5 Riemannův-Stieltjesův integrál	63
5.1 Definice a základní vlastnosti	63
5.2 Podmínka pseudoaditivity a její důsledky	74
5.3 Absolutní integrovatelnost	79
5.4 Substitute	85
5.5 Integrace per-partes	88
5.6 Stejněměrná konvergence a existence integrálu	89
5.7 Bodová konvergence	94
5.8 Další věty o existenci integrálu	99
5.9 Věty o střední hodnotě	104
5.10 Další integrály Stieltjesova typu	105
5.11 Cvičení na závěr	105

6 Kurzweilův-Stieltjesův integrál	107
6.1 Definice a základní vlastnosti	107
6.2 Existence integrálu	115
6.3 Integrace per-partes	129
6.4 Saksovo-Henstockovo lemma a některé jeho důsledky	134
6.5 Neurčitý integrál	137
6.6 Substituce	139
6.7 Bodová konvergence	143
6.8 Integrály maticových a vektorových funkcí	144
6.9 Souvislost s dalšími typy integrálů	146
7 Aplikace Stieltjesova integrálu ve funkcionální analýze	151
7.1 Několik základních pojmů z funkcionální analýzy	151
7.2 Spojité lineární funkcionály na prostoru spojitých funkcí	152
7.3 Spojité lineární funkcionály na prostorech integrovatelných, resp. absolutně spojitých funkcí	159
7.4 Spojité lineární funkcionály na prostorech regulovaných funkcí	160
7.5 Aplikace v teorii distribucí	166
8 Zobecněné lineární diferenciální rovnice	171
8.1 Úvod	171
8.2 Diferenciální rovnice s impulsy	172
8.3 Lineární operátory	175
8.4 Existence řešení zobecněných lineárních diferenciálních rovnic	177
8.5 Zobecněné Gronwallovo lemma a apriorní odhady řešení	183
8.6 Spojitá závislost řešení na parametrech a existence řešení pro regulované pravé strany	187
8.7 Fundamentální matice	192
8.8 Nehomogenní rovnice	199
Literatura	205
Věcný rejstřík	209
Symboly	211

Předmluva


Tato publikace je vlastně pokračováním monografie Štefana Schwabika „*Integrace v R (Kurzweilova teorie)*“ [46] věnované teorii integrálu přes jednorozměrné intervaly. V této monografické učebnici se autorovi podařilo vysvětlit nejen klasické pojmy Newtonova i Riemannova integrálu, ale i integrálu McShaneova a především Kurzweilova. Poprvé byl tak širokému okruhu českých čtenářů (včetně studentů fakult s matematicko-fyzikálním zaměřením) předložen ucelený výklad jednoho z nejuznávanějších příspěvků české matematiky do pokladnice světové matematiky: součtové definice neabsolutně konvergentního integrálu. Tato definice



Thomas Joannes Stieltjes



Jaroslav Kurzweil



Štefan Schwabik

náleží Jaroslavu Kurzweilovi a poprvé ji uvedl v práci publikované v roce 1957 v časopise *Czechoslovak Mathematical Journal* (viz [28]). Nový integrál, který se dnes ve světové matematické literatuře nazývá integrál Kurzweilův, resp. integrál Kurzweilův-Henstockův (nezávisle na J. Kurzweilovi publikoval definici analogického integrálu v roce 1960 specialista v teorii integrálu Ralph Henstock ze Spojeného království), se od té doby ukázal být velice inspirativním nejen pro teorii integrálu (zahrnuje klasické a dobře známé pojmy Riemannova a Newtonova integrálu včetně jejich nevlastních modifikací a obtížněji zvládnutelné integrály Lebesgueův a Perronův), ale i pro teorii diferenciálních a integrálních rovnic. Z hlediska metodického důraz kladený na Kurzweilův integrál umožnil Š. Schwabikovi soustředit se na neabsolutně konvergentní integrály, které ve starší metodice teorie integrálu byly považovány za velmi obtížně vysvětlitelné. Kurzweilův pojem integrálu je totiž ekvivalentní s integrálem Perronovým, který je neabsolutně konvergentní. Jeho definice přitom zdánlivě téměř mechanicky „kopíruje“ definici Riemannovu, která je pro studenta nepřijatelnější svou názorností a výraznou geometrickou interpretací. Právě srovnání s Riemannovou definicí však ukazuje, jak důmyslná je její nenápadná, ale přitom velmi účinná Kurzweilova modifikace. Vel-

kou výhodou je rovněž ten rys Kurzweilova integrálu, že nepotřebuje zobecnění na nevlastní integrály – platí pro něj totiž věta Hakeova typu (tj. věta o limitním přechodu vzhledem k mezím integrálu).

V integrálech Riemannově, Newtonově, Lebesgueově, Perronově, Kurzweilově se integruje daná funkce vzhledem k identické funkci. Některé fyzikální problémy si však vynutily rozšíření pojmu integrálu na integrál, ve kterém se daná funkce integruje vzhledem k funkci, která nemusí být obecně identita. Poprvé se takový integrál vyskytl ve slavném Stieltjesově pojednání [57] z let 1894–5, věnovaném souvislostem konvergence řetězových zlomků a problému, jak popsat rozložení hmoty na hmotné úsečky, jsou-li známy všechny momenty této úsečky přirozených řádů.

Integrály tohoto typu jsou od té doby nazývány *Stieltjesovy integrály* a integrál funkce f (*integrand*) vzhledem k funkci g (*integrátor*) přes interval $[a, b]$ se od té doby značí $\int_a^b f \, d g$. K různým modifikacím definice, které časem vznikly, se pak přidávají zpravidla jména autorů těchto modifikací. Brzy se objevily integrály: Riemannův-Stieltjesův, Perronův-Stieltjesův či Lebesgueův-Stieltjesův. Dalším významným impulsem, který obrátil pozornost ke Stieltjesovu integrálu, byl fundamentální Rieszův výsledek z roku 1909 (viz [40]) o tom, že každý spojitý lineární funkcionál na prostoru spojitých funkcí může být vyjádřen pomocí Stieltjesova integrálu. Vzápětí, v roce 1910, dokázal H. Lebesgue (viz [30]), že pro spojitou funkci f a funkci g s konečnou variací lze pomocí vhodné substituce vyjádřit Stieltjesův integrál jako Lebesgueův integrál tvaru $\int_a^{v(b)} f(w(t)) h(t) \, dt$, kde $v(x)$ je variace funkce g na intervalu $[a, x]$, w je zobecněná inverzní funkce k v , $w(t) = \inf\{s \in [a, b] : v(s) = t\}$ pro $t \in [a, b]$, a $h(t) = dg(w(t))/dt$ pro s.v. $t \in [a, v(b)]$. H. Lebesgue takto dospěl k pojmu Lebesgueova-Stieltjesova integrálu funkce f vzhledem ke g . Několik let po Rieszově výsledku se v roce 1912 objevuje Stieltjesův integrál také v monografii O. Perrona [39]. V dalších zhruba dvou desetiletích byl Stieltjesův integrál a jeho modifikace předmětem bádání řady významných osobností teorie funkcí: W. H. Young ([65], 1914), C. J. de la Vallée Poussin ([60], 1917), E. B. Van Vleck ([61], 1917), T. H. Hildebrandt ([10], 1917), L. C. Young ([63], 1927 a [64], 1936), A. J. Ward ([62], 1936) a další. V roce 1933 věnoval S. Saks ve své slavné monografii [42] integrálu Lebesgueovu-Stieltjesovu a funkcím s konečnou variací celou kapitolu. Do dnešních dnů našly integrály Stieltjesova typu široké uplatnění v mnoha oblastech: např. v teorii křivkových integrálů, teorii pravděpodobnosti, teorii hystereze, teorii funkcionálně-diferenciálních, zobecněných diferenciálních rovnic ap. Historii teorie integrálu je věnována řada monografií. Není mi však známo, že by se některá z nich věnovala zevrubněji historii Stieltjesova integrálu. Existuje dokonce i znamenité dílko v češtině „*Malý průvodce historií integrálu*“ autorů Š. Schwabika a P. Šarmanové, které je nyní

díky *České digitální matematické knihovně* volně přístupné na internetu. Žel, ani sem se Stieltjesův integrál nevešel. Pro znalce francouzštiny připomeňme alespoň historickou esej [36] J. Mawhina.

Vzhledem k omezenému přidělenému rozsahu nemohl Štefan Schwabik do své monografie zahrnout přirozené zobecnění Kurzweilova pojmu integrálu na Stieltjesovy integrály, ač jsme v té době už měli „Kurzweilovu teorii“ Stieltjesova integrálu v našich společných pracích (viz např. [55]) věnovaných zobecněným diferenciálním rovnicím do značné míry zpracovánu a připravenu. Je mou ctižádostí navázat na jeho počín a doplnit jeho monografii o teorii Stieltjesova integrálu s důrazem na Kurzweilovu definici a některé její aplikace. Výklad v této knize je rozdělen do 8 kapitol. V úvodní kapitole jsou stručně popsány dvě z mnoha motivací pro studium Stieltjesova integrálu: problém momentů a křivkové integrály. Zavedeno je tu též základní značení závazné pro celou knihu. Další tři kapitoly jsou přípravné a poskytují přehled o vlastnostech tříd funkcí, se kterými se v této knize nejčastěji pracuje: funkce s konečnou variací, funkce absolutně spojitě a funkce regulované. Rozsáhlá pátá kapitola je věnována klasickým definicím Riemannova-Stieltjesova integrálu a vlastnostem takto definovaných integrálů. Jádrem celé knihy je pak kapitola 6 věnovaná definici Stieltjesova integrálu v Kurzweilově smyslu. Jsou tu demonstrovány přednosti této definice: širší třídy funkcí integrovatelných v tomto smyslu, široká škála vlastností takto definovaného integrálu, např. platnost velmi obecných vět o limitním přechodu včetně Hakeovy věty, o integraci per partes a různých formách substituce. V závěrečných dvou kapitolách jsou popsány některé vybrané aplikace ve funkcionální analýze a v teorii zobecněných diferenciálních rovnic.

Samozřejmě bylo by možno pokračovat dále. Podstatnou část zde vyložené teorie Kurzweilova-Stieltjesova integrálu je možno přenést i na integraci v abstraktních prostorech (viz [50]–[53] a [37]). Významné uplatnění nachází Kurzweilův-Stieltjesův integrál v dnes velmi populární teorii dynamických systémů na „časových škálách“ neboli „time scales“ (česká terminologie se dosud neustálila), viz [56] a [38]. To je však už hudba budoucnosti a do této publikace se už nic víc nevejde. I tak její stávající rozsah výrazně převyšuje rozsah původně plánovaný.

Předkládaným textem bych rád také poněkud zaplnil stávající mezeru v české literatuře. V druhém dílu *Integrálního počtu* Vojtěcha Jarníka (viz [15]) jsou věnovány dvě kapitoly (III a X) výkladu teorie integrálu Lebesgueova-Stieltjesova, který ovšem vyžaduje značnou porci znalostí o teorii míry a přitom je méně obecný než integrál Kurzweilův-Stieltjesův. Celé monumentální a zakladatelské dílo Vojtěcha Jarníka bylo právě zpřístupněno na webových stránkách *České digitální matematické knihovny* a může tedy posloužit čtenářům k upřesnění některých zde pouze naznačených souvislostí s teorií míry. Pěkný, ale stručný úvod do teorie

Riemannova-Stieltjesova integrálu je obsažen též v dnes již v podstatě nedostupných skriptech [17] J. Krále o teorii potenciálu z roku 1965. Podrobně je o různých formách Stieltjesova integrálu pojednáno v dnes již, bohužel, také těžko dostupných skriptech [31] J. Lukeše. Je třeba také zmínit rozsáhlý traktát J. Maříka [35] z roku 1952, který měl zejména zásadní význam pro propagaci Perronova i Perronova-Stieltjesova integrálu v našich krajích. (Také on je nyní dostupný na stránkách *České digitální matematické knihovny*.)

Pokud jde o cizojazyčnou literaturu, mohu doporučit čtenářům zajímavícím se o další souvislosti v rámci klasické teorie monografií [11] T. H. Hildebrandta a také nenápadnou, ale moderně pojatou monografii R. M. McLeoda [34] z roku 1981 zahrnující dokonce i Kurzweilův-Stieltjesův integrál. Další podněty může čtenář najít také v monografiích A. N. Kolmogorova a S. V. Fomina [16], E. Schechtera [43], W. Rudina [41] nebo skriptech J. Lukeše a J. Malého [33]. Dvě náročné monografie [25] a [26] J. Kurzweila z let 2000 a 2002 věnované topologickým problémům souvisejícím s integrací se stieltjesovské integrace přímo nedotýkají. Integrály a zobecněné diferenciální rovnice studované v Kurzweilově nejnovější monografii [27] však zahrnují Kurzweilův-Stieltjesův integrál i lineární zobecněné rovnice, kterými se zabýváme v kapitolách 6 a 8 této knihy. Vynikajícím doplňkem této publikace bude, kromě již zmíněné Schwabikovy monografie [46], také jeho další monografie [45] věnovaná speciálně zobecněným diferenciálním rovnicím.

Tento text vznikl po několika let jako pomůcka pro posluchače mých výběrových přednášek na Přírodovědecké fakultě Palackého univerzity v Olomouci v rámci výuky matematické analýzy. Jsem vděčen *Katedře matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity* za to, že mi umožňuje tyto přednášky konat, a studentům několika ročníků za to, že bez viditelného reptání mé přednášky navštěvovali. Kniha by měla být srozumitelná všem, kdo absolvovali základní kursy matematické a funkcionální analýzy. Ve výkladu se snažím vyhýbat teorii míry, jak je to jen možné. Nicméně ti, kteří mají aspoň základní znalosti o této oblasti, budou mít výhodu při porozumění některým (více-méně okrajovým) pasážím této knihy.

Závěrem předmluvy chci poděkovat za velkou pomoc mým vzácným kolegům Jaroslavu Kurzweilovi, Ireně Rachůnkové, Antonínu Slavíkovi, Jiřímu Šremrovi a Ivo Vrkočovi, kteří podrobně přečetli rukopis tohoto textu a pomohli mi odstranit mnohé nedostatky a vylepšit výklad. Text byl vysázen v systému LaTeX s využitím některých prvků stylu vyvinutého v Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação Universidade de São Paulo v São Carlos v Brazílii. Za jeho poskytnutí děkuji kolegyním Giselle Antunes Monteiro a Jaqueline Godoy Mesquita.

Úmluvy a označení

- (i) \mathbb{N} je množina přirozených čísel (mezi něž nezahrnujeme nulu). \mathbb{R} je množina reálných čísel, \mathbb{R}^m je prostor reálných m -vektorů (m -tic reálných čísel). Je-li $x \in \mathbb{R}^m$, jeho i -tý prvek značíme x_i . Píšeme $x = (x_i)_{i=1, \dots, m}$ nebo, nehrozí-li nedorozumění, $x = (x_i)$. Norma v \mathbb{R}^m je definována předpisem

$$x = (x_i)_{i=1, \dots, m} \in \mathbb{R}^m \rightarrow |x| = \sum_{i=1}^m |x_i|.$$

- (ii) $\{x \in A : B(x)\}$ značí, jak je zvykem, množinu všech prvků x množiny A , které vyhovují podmínce $B(x)$.

Pro dané množiny P, Q symbolem $P \setminus Q$ značíme množinu

$$P \setminus Q = \{x \in P : x \notin Q\}.$$

Jak je zvykem, $P \subset Q$ znamená, že P je podmnožina množiny Q (každý prvek množiny P je též prvkem množiny Q). Nehrozí-li nedorozumění, píšeme $\{x_n\}$ místo $\{x_n \in \mathbb{R} : n \in \mathbb{N}\}$, resp. místo $\{x_n \in \mathbb{R} : n = 1, 2, \dots, m\}$. Řekneme, že posloupnost $\{x_n\}$ je *prostá*, jestliže se v ní žádný prvek neopakuje ($x_k \neq x_n$ jestliže $k \neq n$).

- (iii) Je-li $-\infty < a < b < \infty$, pak $[a, b]$ značí *uzavřený* interval $\{t \in \mathbb{R} : a \leq t \leq b\}$ a (a, b) je *otevřený* interval $\{t \in \mathbb{R} : a < t < b\}$. Odpovídající *polouzavřené*, resp. *polootvřené* intervaly značíme $[a, b)$ a $(a, b]$. Ve všech těchto případech nazýváme body a, b krajní body intervalu. Jestliže $a = b \in \mathbb{R}$, říkáme, že interval $[a, b]$ *degeneruje* na jednobodovou množinu, a píšeme $[a, b] = [a]$. Je-li I interval (uzavřený, resp. otevřený, resp. polootvřený) s krajními body a, b , značíme symbolem $|I| = |b - a|$ jeho délku ($|[a]| = 0$).

Konečnou množinu bodů $\sigma = \{\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_m\}$ intervalu $[a, b]$ nazveme *dělením intervalu* $[a, b]$, jestliže platí $a = \sigma_0 < \sigma_1 < \dots < \sigma_m = b$. Množinu všech dělení intervalu $[a, b]$ značíme $\mathcal{D}[a, b]$.

Je-li $\sigma \in \mathcal{D}[a, b]$, pak, nebude-li uvedeno jinak, budeme jeho elementy značit σ_j , $|\sigma|$ je délka nejdelšího z těchto podintervalů a $\nu(\sigma)$ je počet podintervalů $[\sigma_{j-1}, \sigma_j]$ generovaných dělením σ , tj.

$$\sigma_{\nu(\sigma)} = b \quad \text{a} \quad |\sigma| = \max_{j=1, 2, \dots, \nu(\sigma)} (\sigma_j - \sigma_{j-1}) \quad \text{pro} \quad \sigma \in \mathcal{D}[a, b].$$

Jestliže $\sigma' \supset \sigma$, pak říkáme, že σ' je *zjemnění* σ .

(iv) Pro dané $A \in \mathbb{R}$ značíme $A^+ = \max\{A, 0\}$ a $A^- = \max\{-A, 0\}$. (Připomeňme, že platí $A^+ + A^- = |A|$ a $A^+ - A^- = A$ pro každé $A \in \mathbb{R}$.) Dále

$$\text{sign}(A) = \begin{cases} 1 & \text{když } A > 0, \\ -1 & \text{když } A < 0, \\ 0 & \text{když } A = 0. \end{cases}$$

(v) Pro danou množinu $M \subset \mathbb{R}$ symbolem χ_M značíme její charakteristickou funkci, tj. funkci $\mathbb{R} \rightarrow \{0, 1\}$ definovanou předpisem

$$\chi_M(t) = \begin{cases} 1 & \text{pro } t \in M, \\ 0 & \text{pro } t \notin M. \end{cases}$$

(vi) Supremum (resp. infimum) množiny M značíme $\sup M$ (resp. $\inf M$). Pokud $m = \sup M \in M$ ($m = \inf M \in M$) (tj. m je maximum (resp. minimum) množiny M), píšeme též $m = \max M$ (resp. $m = \min M$). Je-li M množina všech hodnot $F(x)$ nějakého zobrazení F , kde proměnná x probíhá množinu B ($M = \{F(x) : x \in B\}$), píšeme též $\sup_{x \in B} F(x)$. Podobné pravidlo platí i pro infimum, resp. maximum, resp. minimum.

(vii) Zápis $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ znamená, že funkce f je definována pro každé $x \in [a, b]$ a každá její hodnota $f(x)$ je (konečné) reálné číslo. Pro libovolné funkce $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ a $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ a reálné číslo λ definujeme

$$f + g : x \in [a, b] \rightarrow f(x) + g(x) \quad \text{a} \quad \lambda f : x \in [a, b] \rightarrow \lambda f(x).$$

(viii) Pro libovolnou funkci $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ značíme

$$\|f\| = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|.$$

(Není-li funkce f ohraničená na intervalu $[a, b]$, pak ovšem $\|f\| = \infty$.)

(ix) Je-li $\{x_n\}$ nekonečná posloupnost reálných čísel, která má limitu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \cup \{\infty\},$$

píšeme též zkráceně $x_n \rightarrow A$.

Podobně, jestliže posloupnost funkcí $\{f_n\}$ konverguje k funkci f stejnoměrně na intervalu $[a, b]$, tj. $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\| = 0$, píšeme též $f_n \rightrightarrows f$ na $[a, b]$.

- (x) Jestliže $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $t \in [a, b]$ a $s \in (a, b]$ a jestliže existují konečné jednostranné limity $\lim_{\tau \rightarrow t+} f(\tau)$ a $\lim_{\tau \rightarrow s-} f(\tau)$, pak značíme

$$f(t+) = \lim_{\tau \rightarrow t+} f(\tau), \quad f(s-) = \lim_{\tau \rightarrow s-} f(\tau),$$

$$\Delta^+ f(t) = f(t+) - f(t), \quad \Delta^- f(s) = f(s) - f(s-),$$

$$\Delta f(x) = f(x+) - f(x-) \quad \text{pro } x \in (a, b).$$

Zpravidla používáme následující úmluvu:

$$f(a-) = f(a), \quad f(b+) = f(b), \quad \Delta^- f(a) = \Delta^+ f(b) = 0.$$

- (xi) $\mathbb{C}[a, b]$ je prostor reálných funkcí spojitých na intervalu $[a, b]$ s normou definovanou předpisem

$$\|f\| = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)| \quad \text{pro } f \in \mathbb{C}[a, b].$$

$\mathbb{L}^1[a, b]$ je prostor reálných funkcí lebesgueovsky integrovatelných na intervalu $[a, b]$ s rovností

$$f = g \in \mathbb{L}^1[a, b] \iff f(x) = g(x) \quad \text{pro s.v. } x \in [a, b]$$

a normou definovanou předpisem

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(x)| \, dx \quad \text{pro } f \in \mathbb{L}^1[a, b].$$

Prostor vektorových funkcí zobrazujících interval $[a, b]$ do Banachova prostoru \mathbb{Y} a spojitých na $[a, b]$ značíme $\mathbb{C}([a, b], \mathbb{Y})$. Podobný význam má symbol $\mathbb{L}^1([a, b], \mathbb{Y})$ i analogické symboly pro další prostory funkcí, které v textu zavedeme.

- (xii) Je-li M podmnožina Banachova prostoru \mathbb{X} , pak symbolem \overline{M} značíme její uzávěr v prostoru \mathbb{X} . $\text{Lin}(M)$ je množina všech konečných lineárních kombinací prvků M , tj. množina všech prvků $x \in M$ tvaru $x = \sum_{j=1}^m c_j x_j$, kde $m \in \mathbb{N}$, $c_1, c_2, \dots, c_m \in \mathbb{R}$ a $x_1, x_2, \dots, x_m \in M$.

- (xiii) Množinu všech spojitých lineárních zobrazení Banachova prostoru \mathbb{X} do Banachova prostoru \mathbb{Y} značíme $\mathcal{L}(\mathbb{X}, \mathbb{Y})$. Je-li $\mathbb{X} = \mathbb{Y}$, píšeme jednodušeji $\mathcal{L}(\mathbb{X})$ místo $\mathcal{L}(\mathbb{X}, \mathbb{X})$. Speciálně $\mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$ je prostor reálných matic typu $m \times n$ neboli $m \times n$ -matic a $\mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R})$ je prostor sloupcových m -vektorů, který ztotožňujeme s prostorem \mathbb{R}^m .

- (xiv) Je-li $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$, pak její element v i -tém řádku a j -tém sloupci značíme $a_{i,j}$. Píšeme $A = (a_{i,j})_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}}$. Pro každé n značíme symbolem I jednotkovou matici typu $n \times n$, tj.

$$I = (e_{i,j})_{\substack{i=1,\dots,n \\ j=1,\dots,n}}, \quad \text{kde } e_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{když } i = j, \\ 0 & \text{když } i \neq j. \end{cases}$$

Norma v $\mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$ je definována předpisem

$$|A| = \max_{j=1,\dots,m} \sum_{i=1}^n |a_{i,j}| \quad \text{pro } A = (a_{i,j})_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}} \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n).$$

Speciálně pro $x \in \mathbb{R}^m = \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R})$ máme $|x| = \sum_{i=1}^m |x_i|$, což souhlasí s bodem (i).

Dále $|A| = \sup \{|Ax| : |x| \leq 1\}$, tj. takto zavedená norma matice souhlasí s operátorovou normou v $\mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$ (vzhledem k normě v \mathbb{R}^n z bodu (i)).

- (xv) V omezené míře, leč přece jen se to občas zdá být výhodné, až nutné, používáme standardní logické symboly. Například

$$„\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : (A \wedge B) \implies C“$$

znamená

„pro každé $\varepsilon > 0$ existuje $\delta > 0$ takové, že platí-li současně A i B , pak platí také C “.

Úvod

1.1 Obsah rovinných útvarů a momenty

Je známo (viz např. kapitolu I v [46]), že hodnota klasického Riemannova integrálu $\int_a^b f(x) dx$ nezáporné a spojitě funkce f přes interval ohraničený $[a, b]$ je rovna obsahu útvaru M ohraničeného v rovině s osami x, y křivkou $y = f(x)$ a přímkami $y = 0$, $x = a$ a $x = b$. K tomuto poznání nás vede následující úvaha:


Zvolme v intervalu $[a, b]$ body $\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_m$ tak, aby platilo

$$a = \sigma_0 < \sigma_1 < \dots < \sigma_m = b.$$

Množinu bodů $\{\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_m\}$ s těmito vlastnostmi budeme nazývat *dělení intervalu* $[a, b]$ a značit σ . Dále v každém intervalu $[\sigma_{j-1}, \sigma_j]$, $j = 1, 2, \dots, m$, vyberme nějaký bod ξ_j . Tomuto bodu budeme říkat *značka intervalu* $[\sigma_{j-1}, \sigma_j]$. Vektor $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m) \in \mathbb{R}^m$ nazveme *vektor značek* dělení σ a označíme ho symbolem ξ . Plocha útvaru M se dá přibližně nahradit součtem ploch obdélníků vytvořených nad úsečkami $[\sigma_{j-1}, \sigma_j]$ s výškou $f(\xi_j)$, tj. součtem

$$S(\sigma, \xi) = \sum_{j=1}^m f(\xi_j) [\sigma_j - \sigma_{j-1}]. \tag{1.1}$$

Jak naznačují přiložené obrázky, přesnost aproximace bude tím lepší, čím jmenň-



Riemannovy integrální součty

ší bude dělení intervalu $[a, b]$ na podintervaly $[\sigma_{j-1}, \sigma_j]$. Lze očekávat, že při vhodně definovaném limitním procesu založeném na zjemňování dělení intervalu

se součty $S(\sigma, \xi)$ (nezávisle na volbě odpovídajících vektorů značek) neomezeně blíží k nějakému reálnému číslu $S(M)$, které se rovná plošnému obsahu útvaru M . Prozatím se spokojíme s intuitivní představou o takovém limitním procesu. Později ho popíšeme exaktněji. Jeho výsledkem je pojem Riemannova integrálu funkce f přes interval $[a, b]$ (neboli „od a do b “), který se značí symbolem $\int_a^b f(x) dx$ a definuje tak, že platí

$$S(M) = \int_a^b f(x) dx.$$

Podobného typu je i úloha určit *statický moment* rovinných a prostorových útvarů. Omezme se na ohraničenou úsečku $[a, b]$ ležící na reálné ose \mathbb{R} . Víme, že statický moment hmotného bodu $x \in [a, b]$ o hmotě μ vzhledem k počátku je dán výrazem $|x|\mu$. Je-li hmota úsečky soustředěna do konečného počtu bodů $x_i \in [a, b]$, $i = 1, 2, \dots, n$, přičemž hmota bodu x_i se rovná μ_i , pak statický moment úsečky $[a, b]$ vzhledem k počátku je roven součtu $\sum_{i=1}^m |x_i| \mu_i$.

V obecném případě, kdy hmota úsečky není soustředěna do konečného počtu bodů, uvažujeme takto:

Mějme dáno dělení $\sigma = \{\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_m\}$ intervalu $[a, b]$ a nechť pro každé $j = 1, 2, \dots, m$ je ξ_j značka intervalu $I_j = [\sigma_{j-1}, \sigma_j]$. Nechť pro každé $x \in [a, b]$ značí $\mu(x)$ hmotu úsečky $[a, x]$. Potom je zřejmě $\mu(\sigma_j) - \mu(\sigma_{j-1})$ hmota podintervalu I_j pro každé $j = 1, 2, \dots, m$. Představujme si, že hmota každého takového podintervalu je soustředěna do bodu jeho značky. Statický moment úsečky I_j je tedy přibližně roven výrazu $|\xi_j| [\mu(\sigma_j) - \mu(\sigma_{j-1})]$ a statický moment celé úsečky $[a, b]$ můžeme aproximovat součtem

$$S(\sigma, \xi) = \sum_{j=1}^m |\xi_j| [\mu(\sigma_j) - \mu(\sigma_{j-1})]. \quad (1.2)$$

Opět můžeme očekávat, že přiblížení ke skutečné hodnotě statického momentu bude tím lepší, čím jemnější bude dělení σ , tj. čím více bude mít prvků. Je vidět, že pokud se při vhodné definici limitního procesu součty (1.2) blíží k nějakému číslu S , bude se toto číslo rovnat statickému momentu úsečky $[a, b]$ vzhledem k počátku. Značíme

$$S = \int_a^b |x| d[\mu(x)]$$

a výrazu na pravé straně budeme říkat *Stieltjesův integrál* funkce vzhledem k μ přes interval $[a, b]$. Na místě funkce $x \in [a, b] \rightarrow |x|$ může být ovšem také libovolná „rozumná“ funkce f definovaná na intervalu $[a, b]$. Můžeme tedy takto

určit také moment setrvačnosti úsečky $[a, b]$ jako $\int_a^b x^2 d[\mu(x)]$ a obecně moment k -tého řádu jako $\int_a^b |x|^k d[\mu(x)]$.

1.2 Křivkové integrály

KŘIVKOVÝ INTEGRÁL PRVNÍHO DRUHU

Nechť φ je spojitě zobrazení uzavřeného a ohraničeného intervalu $[a, b]$ do třírozměrného vektorového prostoru \mathbb{R}^3 . Množina bodů

$$\varphi(t) = (\varphi_1(t), \varphi_2(t), \varphi_3(t)) \in \mathbb{R}^3,$$

kde t probíhá interval $[a, b]$, se nazývá *cesta* v \mathbb{R}^3 definovaná na intervalu $[a, b]$ a značíme ji také symbolem φ . *Délkou cesty* φ rozumíme délku křivky definované grafem $\{\varphi(t) : t \in [a, b]\}$ funkce φ a značíme ji symbolem $\Lambda(\varphi; [a, b])$.

Buď φ cesta v \mathbb{R}^3 definovaná na intervalu $[a, b]$, jejíž délka je konečná. Předpokládejme dále, že zobrazení $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ je prosté. Představme si, že φ je drát a $f(x) \in \mathbb{R}$ je jeho hustota v bodě x . Hmotu části drátu odpovídající intervalu $[c, d] \subset [a, b]$ je tedy přibližně vyjádřena číslem $f(\varphi(\xi)) \Lambda(\varphi; [c, d])$, kde ξ je nějaký bod intervalu $[c, d]$.

Nechť $\sigma = \{\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_m\}$ je dělení intervalu $[a, b]$ a $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m)$ je vektor jeho značek, tj. $\xi_j \in [\sigma_{j-1}, \sigma_j]$ pro $j = 1, 2, \dots, m$.

Položme $v(t) = \Lambda(\varphi; [a, t])$ pro $t \in [a, b]$. Potom součet

$$\sum_{j=1}^m f(\varphi(\xi_j)) [v(\sigma_j) - v(\sigma_{j-1})]$$

aproximuje hmotu celého drátu. Opět je přirozené očekávat, že tato aproximace bude tím přesnější, čím bude dělení jemnější. Vede-li takový limitní proces k jednoznačně určené limitní veličině M , bude tato veličina rovna hmotě celého drátu a budeme psát

$$M = \int_{\varphi} f \, ds \quad \text{nebo také} \quad M = \int_a^b f(\varphi) \, dv.$$

První symbol se nazývá *křivkový integrál prvního druhu* funkce f podél cesty φ , zatímco druhý symbol představuje ekvivalentní pojem *Stieltjesova integrálu* skalární funkce $f(\varphi)$ vzhledem ke skalární funkci $v(t) = \Lambda(\varphi; [a, t])$.

KŘIVKOVÝ INTEGRÁL DRUHÉHO DRUHU

Mějme hmotný bod, který se pohybuje po cestě φ a v okamžiku $t \in [a, b]$ se nachází v bodě $\varphi(t)$. Dále nechť

$$f : x \in \varphi \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow f(x) = (f_1(x), f_2(x), f_3(x)) \in \mathbb{R}^3$$

je silové vektorové pole v \mathbb{R}^3 . Potom $f(\varphi(t)) \in \mathbb{R}^3$ je vektor síly, která na tento hmotný bod působí v čase t .

Nechť $\sigma = \{\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_m\}$ je dělení intervalu $[a, b]$ a $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m)$ je vektor jeho značek. Potom skalární součin

$$f(\varphi(\xi_j)) \cdot [\varphi(\sigma_j) - \varphi(\sigma_{j-1})] = \sum_{k=1}^3 f_k(\varphi(\xi_j)) [\varphi_k(\sigma_j) - \varphi_k(\sigma_{j-1})]$$

představuje práci, kterou vykoná síla $f(\varphi(\xi_j))$, posune-li se náš hmotný bod z bodu $\varphi(\sigma_{j-1})$ do bodu $\varphi(\sigma_j)$. Součet

$$\sum_{j=1}^m f(\varphi(\xi_j)) \cdot [\varphi(\sigma_j) - \varphi(\sigma_{j-1})] = \sum_{k=1}^3 \sum_{j=1}^m f_k(\varphi(\xi_j)) [\varphi_k(\sigma_j) - \varphi_k(\sigma_{j-1})]$$

tedy aproximuje práci, kterou vykoná silové pole f při přesunu daného hmotného bodu po cestě φ od okamžiku $t = a$ do okamžiku $t = b$. Jestliže se hodnoty těchto součtů budou při zjemňování dělení σ „libovolně blížit“ k nějaké jednoznačně určené limitní hodnotě, bude tato hodnota rovna velikosti práce, kterou vykoná silové pole f při přesunu daného hmotného bodu po cestě φ od okamžiku $t = a$ do okamžiku $t = b$. Budeme ji značit

$$\int_{\varphi} f \quad \text{nebo také} \quad \int_a^b f(\varphi) \, d\varphi = \sum_{k=1}^3 \int_a^b f_k(\varphi) \, d\varphi_k.$$

První symbol se nazývá *křivkový integrál druhého druhu* vektorové funkce f podél cesty φ , zatímco druhý symbol představuje ekvivalentní pojem *Stieltjesova integrálu* (složené) vektorové funkce $f(\varphi) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ vzhledem k vektorové funkci $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$.

Funkce s konečnou variací

V této kapitole definujeme variaci funkce a odvodíme základní vlastnosti třídy funkcí, které mají konečnou variaci na daném uzavřeném a konečném intervalu. Funkce s konečnou variací jsou užitečné v celé řadě fyzikálních a technických problémů, v teorii pravděpodobnosti, teorii Fourierových řad, v diferenciálních rovnicích a v dalších oblastech matematiky.

2.1 Definice a základní vlastnosti

Nechť $-\infty < a < b < \infty$. Připomeňme, děleními intervalu $[a, b]$ nazýváme konečné množiny bodů $\sigma = \{\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_m\}$ intervalu $[a, b]$ takové, že

$$a = \sigma_0 < \sigma_1 < \dots < \sigma_m = b$$

a symbol $\mathcal{D}[a, b]$ značí množinu všech dělení intervalu $[a, b]$. Dále elementy dělení $\sigma \in \mathcal{D}[a, b]$ jsou zpravidla značeny symboly σ_j , $\nu(\sigma) = m$,

$$\sigma_\nu(\sigma) = b \quad \text{a} \quad |\sigma| = \max_{j=1,2,\dots,\nu(\sigma)} (\sigma_j - \sigma_{j-1}) \quad \text{pro } \sigma \in \mathcal{D}[a, b].$$

Jestliže $\sigma' \supset \sigma$, pak říkáme, že σ' je *zjemnění* σ .

2.1 Definice. Pro danou funkci $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ a dělení σ intervalu $[a, b]$ definujeme

$$V(f, \sigma) = \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} |f(\sigma_j) - f(\sigma_{j-1})| \quad \text{a} \quad \text{var}_a^b f = \sup_{\sigma \in \mathcal{D}[a, b]} V(f, \sigma).$$

Je-li $a = b$, definujeme $\text{var}_a^b f = \text{var}_a^a f = 0$. Veličinu $\text{var}_a^b f$ nazýváme *variace funkce* f na intervalu $[a, b]$. Je-li $\text{var}_a^b f < \infty$, říkáme, že funkce f má *konečnou variaci* na $[a, b]$. Množinu funkcí s konečnou variací na $[a, b]$ značíme $\mathbb{BV}[a, b]$.

Geometrický význam pojmu variace nám přiblíží následující tvrzení, zpravidla nazývané DRUHÁ JORDANOVA VĚTA. Dříve než ji budeme formulovat, připomeňme, jak se definuje délka křivky, která je zadána jako graf spojitě funkce f na intervalu $[a, b]$:

Pro každé dělení σ intervalu $[a, b]$ je součet

$$\lambda(f, \sigma) := \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \sqrt{(\sigma_j - \sigma_{j-1})^2 + (f(\sigma_j) - f(\sigma_{j-1}))^2}.$$

roven délce lomené křivky proložené body $[\sigma_j, f(\sigma_j)]$, $j = 0, 1, \dots, m$, ležícími

na grafu funkce f . Délka grafu $\Lambda(f; [a, b])$ funkce f na intervalu $[a, b]$ se pak definuje jako

$$\Lambda(f; [a, b]) = \sup_{\sigma \in \mathcal{D}[a, b]} \lambda(f, \sigma).$$

2.2 Věta (DRUHÁ JORDANOVA VĚTA). *Nechť f je spojitá na $[a, b]$. Potom má její graf na intervalu $[a, b]$ konečnou délku právě tehdy, když f má konečnou variaci na intervalu $[a, b]$.*

D ů k a z . Použijeme nerovnosti

$$|\beta| \leq \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} \leq |\alpha| + |\beta|, \quad (2.1)$$

kteřé platí pro libovolná reálná čísla α, β . (Odvodíme je odmocněním triviálních nerovností $\beta^2 \leq \alpha^2 + \beta^2 \leq (|\alpha| + |\beta|)^2$.) Pro libovolné dělení $\sigma \in \mathcal{D}[a, b]$ máme podle (2.1)

$$\begin{aligned} V(f, \sigma) &= \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} |f(\sigma_j) - f(\sigma_{j-1})| \\ &\leq \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \sqrt{(\sigma_j - \sigma_{j-1})^2 + (f(\sigma_j) - f(\sigma_{j-1}))^2} = \lambda(f, \sigma) \\ &\leq \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} [(\sigma_j - \sigma_{j-1}) + |f(\sigma_j) - f(\sigma_{j-1})|] = (b - a) + V(f, \sigma) \end{aligned}$$

neboli

$$V(f, \sigma) \leq \lambda(f, \sigma) \leq V(f, \sigma) + (b - a).$$

Přechodem k supremu dostaneme nerovnosti

$$\text{var}_a^b f \leq \Lambda(f; [a, b]) \leq \text{var}_a^b f + (b - a),$$

ze kterých tvrzení věty okamžitě plyne. \square

2.3 Příklad. Buď f funkce spojitá na intervalu $[a, b]$ a taková, že pro každé $x \in (a, b)$ platí $|f'(x)| \leq M < \infty$, kde M nezávisí na x .

Podle věty o střední hodnotě tedy platí $|f(y) - f(x)| \leq M|y - x|$ pro všechna $x, y \in [a, b]$. Pro každé dělení σ intervalu $[a, b]$ tedy máme

$$V(f, \sigma) \leq M \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} [\sigma_j - \sigma_{j-1}] = M [b - a].$$

Vidíme, že každá funkce spojitá na intervalu $[a, b]$, která má na jeho vnitřku (a, b) ohraničenou derivaci, má konečnou variaci.

Jestliže je navíc $|f'|$ riemannovsky integrovatelná na intervalu $[a, b]$ (na příklad f' je spojitá na (a, b)), můžeme variaci funkce f na intervalu $[a, b]$ přesně určit. Platí totiž

$$\text{var}_a^b f = (\mathbb{R}) \int_a^b |f'(x)| \, dx, \quad (2.2)$$

kde na pravé straně je Riemannův integrál. Důkaz tohoto tvrzení pochopitelně předpokládá znalost Riemannova integrálu.

Buď dáno $\varepsilon > 0$. Předpoklad o existenci a konečné hodnotě Riemannova integrálu $(\mathbb{R}) \int_a^b |f'(x)| \, dx$ znamená, že existuje $\delta > 0$ takové, že

$$\left| \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} |f'(\xi_j)| (\sigma_j - \sigma_{j-1}) - (\mathbb{R}) \int_a^b |f'(x)| \, dx \right| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (2.3)$$

platí pro každé dělení σ intervalu $[a, b]$ takové, že $|\sigma| < \delta$ a každý výběr bodů ξ_j takových, že

$$\xi_j \in [\sigma_{j-1}, \sigma_j] \quad \text{pro } j = 1, 2, \dots, \nu(\sigma). \quad (2.4)$$

Na druhou stranu, podle definice variace existuje $\sigma \in \mathcal{D}[a, b]$ takové, že $|\sigma| < \delta$ a

$$\text{var}_a^b f \geq V(f, \sigma) > \text{var}_a^b f - \frac{\varepsilon}{2}. \quad (2.5)$$

Podle věty o střední hodnotě existují body ξ_j , $j = 1, 2, \dots, \nu(\sigma)$, splňující (2.4) a takové, že

$$V(f, \sigma) = \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} |f'(\xi_j)| (\sigma_j - \sigma_{j-1}).$$

Odtud podle (2.3) a (2.5) dostáváme, že platí

$$\begin{aligned} & \left| \text{var}_a^b f - (\mathbb{R}) \int_a^b |f'(x)| \, dx \right| \\ & \leq \left| \text{var}_a^b f - V(f, \sigma) \right| + \left| \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} |f'(\xi_j)| (\sigma_j - \sigma_{j-1}) - (\mathbb{R}) \int_a^b |f'(x)| \, dx \right| \\ & < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Vzhledem k tomu, že $\varepsilon > 0$ bylo libovolné, to znamená, že platí (2.2).

2.4 Cvičení. (i) Dokažte, že pro libovolnou spojitou funkci f platí

$$\left((\text{var}_a^b f)^2 + (b - a)^2 \right)^{1/2} \leq \Lambda(f, [a, b]) \leq \text{var}_a^b f + (b - a).$$

(ii) Určete $\text{var}_a^b f$ a odhadněte délku grafu funkce f , jestliže

a) $f(x) = \sin^2 x$, $a = 0$, $b = \pi$,

b) $f(x) = x^3 - 3x + 4$, $a = 0$, $b = 2$,

c) $f(x) = \cos x + x \sin x$, $a = 0$, $b = 2\pi$.

2.5 Poznámka. Z definice 2.1 je zřejmé, že pro každou funkci $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ je $\text{var}_a^b f \geq 0$. Dále je-li dáno libovolné dělení $\rho \in \mathcal{D}[a, b]$, pak platí

$$\text{var}_a^b f = \sup_{\sigma \supset \rho} V(f, \sigma). \quad (2.6)$$

To plyne z několika elementárních pozorování: Zaprvé, protože

$$\{V(f, \sigma) : \sigma \in \mathcal{D}[a, b] \text{ a } \sigma \supset \rho\} \subset \{V(f, \sigma) : \sigma \in \mathcal{D}[a, b]\},$$

musí být $\sup_{\sigma \supset \rho} V(f, \sigma) \leq \text{var}_a^b f$.

Dále díky trojúhelníkové nerovnosti pro libovolná dvě dělení σ, σ' intervalu $[a, b]$ taková, že $\sigma' \supset \sigma$, a funkci $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, máme $V(f, \sigma) \leq V(f, \sigma')$.

Konečně, je-li $\sigma \in \mathcal{D}[a, b]$ libovolné a $\sigma' = \sigma \cup \rho$, pak $\sigma' \supset \rho$ a tedy $V(f, \sigma) \leq V(f, \sigma')$. To znamená, že pro každé $d \in \{V(f, \sigma) : \sigma \in \mathcal{D}[a, b]\}$ existuje $d' \in \{V(f, \sigma) : \sigma \in \mathcal{D}[a, b] \text{ a } \sigma \supset \rho\}$ takové, že $d \leq d'$, a tedy

$$\text{var}_a^b f \leq \sup_{\sigma \supset \rho} V(f, \sigma).$$

Platí tedy (2.6).

2.6 Cvičení. Dokažte následující vlastnosti variace a funkcí s konečnou variací.

(i) Je-li $[c, d] \subset [a, b]$, pak pro každou funkci $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ platí

$$|f(d) - f(c)| \leq \text{var}_c^d f \leq \text{var}_a^b f.$$

(ii) $\text{var}_a^b f = d \in \mathbb{R}$

$$\iff (\forall \varepsilon > 0 \exists \sigma_\varepsilon \in \mathcal{D}[a, b] : \sigma \supset \sigma_\varepsilon \implies d - \varepsilon \leq V(f, \sigma) \leq d).$$

(iii) $\text{var}_a^b f = \infty \iff (\forall K > 0 \exists \sigma_K \in \mathcal{D}[a, b] : V(f, \sigma_K) \geq K).$

(iv) Jestliže pro funkci $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ existuje $L \in \mathbb{R}$ takové, že

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y| \text{ platí pro všechna } x, y \in [a, b],$$

pak $\text{var}_a^b f \leq L(b - a)$.

(V takovém případě říkáme, že f splňuje Lipschitzovu podmínku na $[a, b]$, nebo též, že je Lipschitzovská na $[a, b]$.)

2.7 Příklad. Nechť

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{pro } x = 0, \\ x \sin\left(\frac{\pi}{x}\right) & \text{pro } x \in (0, 2]. \end{cases}$$

Všimněme si, že $f(x) = 0$ právě když $x = 0$ nebo $x = \frac{1}{k}$ pro nějaké $k \in \mathbb{N}$ a pro

$x \in (0, 2]$ platí

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{právě když } x = y_k = \frac{2}{4k+1}, k \in \mathbb{N} \cup \{0\}, \\ -x & \text{právě když } x = z_k = \frac{2}{4k-1}, k \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Pro dané $n \in \mathbb{N}$ a dělení $\sigma^n = \{0, y_n, z_n, \dots, y_1, z_1, 2\}$ dostaneme

$$\begin{aligned} V(f, \sigma^n) &= |f(0) - f(y_n)| + \sum_{k=1}^n |f(y_{k-1}) - f(z_k)| + \sum_{k=1}^n |f(y_k) - f(z_k)| \\ &= y_n + \sum_{k=1}^n (y_{k-1} + z_k) + \sum_{k=1}^n (y_k + z_k) \\ &= y_0 + 2 \sum_{k=1}^n (y_k + z_k) = 2 + 4 \sum_{k=1}^n \frac{8k}{16k^2 - 1} \geq 2 \left(1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}\right). \end{aligned}$$

Je známo, že $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty$. Tudíž $\lim_{n \rightarrow \infty} V(f, \sigma^n) = \infty$ a $\text{var}_0^2 f = \infty$.

Snadno můžeme určit variaci monotónních funkcí.

2.8 Věta. Pro každou funkci f monotónní na $[a, b]$ platí $\text{var}_a^b f = |f(b) - f(a)|$.

Důkaz. Je-li f nerostoucí na $[a, b]$ a $\sigma \in \mathcal{D}[a, b]$, pak

$$\begin{aligned} V(f, \sigma) &= \sum_{j=1}^m [f(\sigma_{j-1}) - f(\sigma_j)] \\ &= [f(a) - f(\sigma_1)] + [f(\sigma_1) - f(\sigma_2)] + \dots \\ &\quad + [f(\sigma_{m-2}) - f(\sigma_{m-1})] + [f(\sigma_{m-2}) - f(b)] \\ &= f(a) - f(b), \end{aligned}$$

tj. $\text{var}_a^b f = f(a) - f(b) = |f(b) - f(a)|$.

Podobně bychom ukázali, že je-li f neklesající na $[a, b]$, pak

$$\text{var}_a^b f = f(b) - f(a) = |f(b) - f(a)|. \quad \square$$

2.9 Cvičení. Dokažte, že funkce $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ má konečnou variaci na $[a, b]$ právě tehdy, když existuje taková neklesající funkce φ na $[a, b]$, že

$$|f(x) - f(y)| \leq \varphi(x) - \varphi(y) \quad \text{pro } x, y \in [a, b], y \leq x.$$

2.10 Příklady. (i) Příkladem jednoduché funkce, která nemá ohraničenou derivaci na intervalu $[0, 1]$ (a tudíž tvrzení z příkladu 2.3 (i) nezaručuje, že má konečnou variaci na $[0, 1]$) je $f(x) = \sqrt{x}$. Protože je ale f rostoucí, je $\text{var}_0^1 f = 1$ podle věty 2.8.

(ii) Konečnou variaci mohou mít i funkce nespojité, jak ukazuje příklad

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{je-li } x = 0, \\ \frac{1}{k} & \text{je-li } x \in (0, 1] \text{ a } x \in (\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k}] \text{ pro nějaké } k \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Tato funkce je zřejmě definovaná a neklesající na intervalu $[0, 1]$. Podle věty 2.8 je tedy $\text{var}_0^1 f = 1$.

2.11 Věta. Pro každé $c \in [a, b]$ a každou funkci $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ platí

$$\text{var}_a^b f = \text{var}_a^c f + \text{var}_c^b f.$$

D ů k a z. Buď te dány funkce $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ a bod $c \in [a, b]$. Pokud $c = a$ nebo $c = b$, je tvrzení věty triviální. Nechť tedy $c \in (a, b)$.

Nechť $\tilde{\sigma} = \{a, c, b\}$ a nechť σ je libovolné dělení intervalu $[a, b]$ takové, že $\sigma \supset \tilde{\sigma}$. Pak nutně $c \in \sigma$. Dělení σ lze tudíž rozdělit na dělení σ' intervalu $[a, c]$ a dělení σ'' intervalu $[c, b]$, tj. $\sigma = \sigma' \cup \sigma''$, kde $\sigma' \in \mathcal{D}[a, c]$ a $\sigma'' \in \mathcal{D}[c, b]$. Zřejmě pak také platí

$$V(f, \sigma) = V(f, \sigma') + V(f, \sigma''). \quad (2.7)$$

Podle poznámky 2.5 dostáváme tedy

$$\text{var}_a^b f = \sup_{\sigma \supset \tilde{\sigma}} V(f, \sigma) \leq \text{var}_a^c f + \text{var}_c^b f.$$

Na druhou stranu pro každá dvě dělení $\sigma' \in \mathcal{D}[a, c]$ a $\sigma'' \in \mathcal{D}[c, b]$ je jejich sjednocení $\sigma = \sigma' \cup \sigma''$ dělením intervalu $[a, b]$ a platí opět (2.7). Odtud plyne, že

$$\text{var}_a^c f + \text{var}_c^b f = \sup_{\sigma' \in \mathcal{D}[a, c]} V(f, \sigma') + \sup_{\sigma'' \in \mathcal{D}[c, b]} V(f, \sigma'') \leq \text{var}_a^b f.$$

Tím je důkaz věty hotov. □

2.12 Příklad. Buď dáno $n \in \mathbb{N}$. Vyšetřujeme funkci

$$f_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{pro } 0 \leq x \leq \frac{1}{n}, \\ x \sin\left(\frac{\pi}{x}\right) & \text{pro } \frac{1}{n} \leq x \leq 2. \end{cases}$$

Její derivace

$$f'_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{pro } 0 \leq x < \frac{1}{n}, \\ \sin\left(\frac{\pi}{x}\right) - \frac{\pi}{x} \cos\left(\frac{\pi}{x}\right) & \text{pro } \frac{1}{n} > x \geq 2 \end{cases}$$

je ohraničená na $(0, \frac{1}{n})$ a na $(\frac{1}{n}, 2)$. Zřejmě je $\text{var}_0^{1/n} f_n = 0$. Podle příkladu 2.3 (i) je dále $\text{var}_{1/n}^2 f_n < \infty$. Věta 2.11 tedy implikuje, že je také $\text{var}_0^2 f_n < \infty$ pro každé $n \in \mathbb{N}$.

Na množině $\mathbb{BV}[a, b]$ jsou přirozeným způsobem definovány operace sčítání a násobení skalárem (viz Úmluvy a označení (x)). Funkci identicky nulovou na $[a, b]$ nazveme nulovým prvkem množiny $\mathbb{BV}[a, b]$. Následující tvrzení je zřejmé.

2.13 Lemma. Pro libovolné dvě funkce $f_1, f_2 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ a reálné číslo c platí

$$\text{var}_a^b (f_1 + f_2) \leq \text{var}_a^b f_1 + \text{var}_a^b f_2 \quad \text{a} \quad \text{var}_a^b (c f_1) = |c| \text{var}_a^b f_1. \quad (2.8)$$

Dále $\text{var}_a^b f = 0$ tehdy a jen tehdy, když f je konstantní na $[a, b]$.

Stačí si totiž uvědomit, že pro každé dělení $\sigma \in \mathcal{D}[a, b]$ platí

$$V(f_1 + f_2, \sigma) \leq V(f_1, \sigma) + V(f_2, \sigma) \quad \text{a} \quad V(c f, \sigma) = |c| V(f, \sigma)$$

a dále že je-li $\text{var}_a^b f = 0$, musí pro každé $x \in (a, b)$ platit $|f(x) - f(a)| = 0$.

2.14 Věta. $f \in \mathbb{BV}[a, b]$ tehdy a jen tehdy, když existují funkce f_1 a f_2 neklesající na $[a, b]$ a takové, že platí $f(x) = f_1(x) - f_2(x)$ pro každé $x \in [a, b]$.

D ů k a z. Jestliže f_1 a f_2 jsou neklesající na $[a, b]$ a $f = f_1 - f_2$, pak podle věty 2.8 mají f_1 i f_2 konečnou variaci na $[a, b]$ a podle (2.8) je také $\text{var}_a^b f < \infty$.

Stačí tedy dokázat, že pro každou funkci $f \in \mathbb{BV}[a, b]$ existují funkce f_1 a f_2 neklesající na $[a, b]$ a takové, že $f = f_1 - f_2$.

Nechť tedy $f \in \mathbb{BV}[a, b]$. Položme

$$f_1(x) = \text{var}_a^x f \quad \text{a} \quad f_2(x) = f_1(x) - f(x) \quad \text{pro } x \in [a, b].$$

Nechť $x, y \in [a, b]$ a $y \geq x$. Potom podle věty 2.11 je $f_1(y) = f_1(x) + \text{var}_x^y f$, a protože variace je vždy nezáporná, znamená to, že funkce f_1 je neklesající na $[a, b]$. Dále podle věty 2.11 máme

$$f_2(y) = f_1(x) + \text{var}_x^y f - f(y)$$

a

$$f_2(y) - f_2(x) = \text{var}_x^y f - (f(y) - f(x)) \geq 0$$

(viz cvičení 2.6 (i)). To znamená, že funkce f_2 je také neklesající na $[a, b]$ a důkaz je hotov. \square

2.15 Cvičení. Nechť $f \in \mathbb{BV}[a, b]$. Dokažte, že obě funkce

$$\mathbf{p}(x) = \begin{cases} 0 & \text{pro } x = a, \\ \sup_{\sigma \in \mathcal{D}[a, x]} \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} (f(\sigma_j) - f(\sigma_{j-1}))^+ & \text{pro } x \in (a, b] \end{cases}$$

a

$$\mathbf{n}(x) = \begin{cases} 0 & \text{pro } x = a, \\ \sup_{\sigma \in \mathcal{D}[a, x]} \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} (f(\sigma_j) - f(\sigma_{j-1}))^- & \text{pro } x \in (a, b] \end{cases}$$

jsou neklesající a nezáporné na $[a, b]$ a platí

$$f(x) = f(a) + \mathbf{p}(x) - \mathbf{n}(x) \quad \text{a} \quad \text{var}_a^x f = \mathbf{p}(x) + \mathbf{n}(x) \quad \text{pro } x \in [a, b].$$

2.16 Důsledek. Pro každou funkci f s konečnou variací na $[a, b]$ a pro všechna $t \in [a, b]$ a $s \in (a, b]$ existují konečné limity

$$f(t+) = \lim_{\tau \rightarrow t+} f(\tau) \quad \text{a} \quad f(s-) = \lim_{\tau \rightarrow s-} f(\tau)$$

(tj. f může mít v $[a, b]$ pouze nespojitosti prvního druhu).¹

D ů k a z. Podle věty 2.14 můžeme předpokládat, že f je neklesající na $[a, b]$. Pro každé $x \in [a, b]$ je $f(a) \leq f(x) \leq f(b)$, a tudíž platí také

$$f(a) \leq \sup_{x \in [a, s]} f(x) \leq f(b) \quad \text{pro každé } s \in (a, b]$$

a

$$f(a) \leq \inf_{x \in (t, b]} f(x) \leq f(b) \quad \text{pro každé } t \in [a, b)$$

Ukážeme, že

$$f(t+) = \inf_{x \in (t, b]} f(x), \quad \text{jestliže } t \in [a, b) \quad (2.9)$$

Označme $d = \inf_{x \in (t, b]} f(x)$ a zvolme libovolné $\varepsilon > 0$. Potom podle definice infima existuje $t' \in (t, b]$ takové, že je $d \leq f(t') < d + \varepsilon$. Vzhledem k monotónnosti funkce f odtud plyne, že nerovnost $d \leq f(x) < d + \varepsilon$ platí pro každé $x \in (t, t']$. Dokázali jsme tedy vztah (2.9).

Podobně bychom ukázali, že platí také

$$f(s-) = \sup_{x \in [a, s]} f(x), \quad \text{jestliže } s \in (a, b]. \quad (2.10)$$

□

2.2 Prostor funkcí s konečnou variací

Podle lemmatu 2.13 každá lineární kombinace funkcí s konečnou variací má také konečnou variací. Z toho plyne, že množina $\mathbb{BV}[a, b]$ je lineární prostor. Ukážeme, že při vhodně zvolené normě se $\mathbb{BV}[a, b]$ stane lineárním normovaným prostorem.

¹Ríkáme, že bod x je bodem nespojitosti 1. druhu funkce f , jestliže existují konečné limity $f(x-)$, $f(x+)$, přičemž $f(x-) \neq f(x+)$

2.17 Věta. $\mathbb{BV}[a, b]$ je lineární normovaný prostor vzhledem k normě definované předpisem

$$\|f\|_{\mathbb{BV}} = |f(a)| + \text{var}_a^b f \quad \text{pro } f \in \mathbb{BV}[a, b]. \quad (2.11)$$

D ů k a z. $\mathbb{BV}[a, b]$ je lineární prostor podle lemmatu 2.13. Dále pro každou funkci $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ a každé $x \in [a, b]$ platí

$$|f(x)| \leq |f(a)| + |f(x) - f(a)| \leq |f(a)| + \text{var}_a^b f \quad \text{pro } x \in [a, b].$$

(Rozmyslete si, proč tomu tak je.) Tudíž

$$\|f\| \leq \|f\|_{\mathbb{BV}} < \infty \quad \text{pro } f \in \mathbb{BV}. \quad (2.12)$$

Podle lemmatu 2.13 relace

$$\|f + g\|_{\mathbb{BV}} \leq \|f\|_{\mathbb{BV}} + \|g\|_{\mathbb{BV}} \quad \text{a} \quad \|cf\|_{\mathbb{BV}} = |c| \|f\|_{\mathbb{BV}} \quad (2.13)$$

platí pro všechny funkce $f, g \in \mathbb{BV}[a, b]$ a každé reálné číslo $c \in \mathbb{R}$.

Konečně, jestliže $\|f\|_{\mathbb{BV}} = 0$, musí být $f(a) = 0$ a $\text{var}_a^b f = 0$. Podle lemmatu 2.13 je tedy $f(x) \equiv f(a) = 0$ na $[a, b]$, tj. f je nulový prvek $\mathbb{BV}[a, b]$.

Dokázali jsme tedy, že rovnost (2.11) definuje normu na $\mathbb{BV}[a, b]$. \square

2.18 Poznámka. Nerovnost (2.12) implikuje, že každá funkce, která má ohraničenou variaci na $[a, b]$ je také ohraničená na $[a, b]$.

Podle věty 2.17 je $\mathbb{BV}[a, b]$ lineární normovaný prostor vzhledem k normě definované předpisem (2.11). Nyní dokážeme, že $\mathbb{BV}[a, b]$ je Banachův prostor vzhledem k této normě. Toto tvrzení umožňuje používání metod funkcionální analýzy při práci s funkcemi s konečnou variací. Nejprve ale připomeňme Bolzanovu-Weierstrašovu větu, kterou budeme potřebovat.

2.19 Věta (BOLZANO-WEIERSTRASŮ). Z každé ohraničené posloupnosti reálných čísel lze vybrat konvergentní podposloupnost.

2.20 Věta. $\mathbb{BV}[a, b]$ je Banachův prostor.

D ů k a z. Zbývá dokázat, že $\mathbb{BV}[a, b]$ je úplný, tj. že každá posloupnost cauchyovská v $\mathbb{BV}[a, b]$ má v $\mathbb{BV}[a, b]$ limitu. Nechť $\{f_n\} \subset \mathbb{BV}[a, b]$ je posloupnost cauchyovská v $\mathbb{BV}[a, b]$. Potom platí

$$\left. \begin{aligned} &\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon : \\ &n, m \geq n_\varepsilon \implies |f_n(x) - f_m(x)| \leq \|f_n - f_m\|_{\mathbb{BV}} < \varepsilon \quad \text{pro } x \in [a, b]. \end{aligned} \right\} \quad (2.14)$$

a) Podle (2.14) je pro každé $x \in [a, b]$ posloupnost reálných čísel $\{f_n(x)\}$ cauchyovská. Pro každé $x \in [a, b]$ tedy existuje konečná limita

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x).$$

b) Nechť je dáno libovolné $\varepsilon > 0$ a nechť $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ je určeno podmínkou (2.14). Potom pro každé $x \in [a, b]$ máme také

$$|f(x) - f_{n_\varepsilon}(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f_{n_\varepsilon}(x)| \leq \varepsilon,$$

a tudíž pro každé $n \geq n_\varepsilon$ a každé $x \in [a, b]$ platí

$$|f(x) - f_n(x)| \leq |f(x) - f_{n_\varepsilon}(x)| + |f_{n_\varepsilon}(x) - f_n(x)| < 2\varepsilon.$$

To ovšem znamená, že

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - f_n\| = 0$$

neboli posloupnost $\{f_n\}$ konverguje k f stejnoměrně na $[a, b]$.

c) Podle (2.13) a (2.14) existuje $n_1 \in \mathbb{N}$ takové, že

$$\text{var}_a^b f_n \leq \|f_n\|_{\mathbb{BV}} \leq \|f_{n_1}\|_{\mathbb{BV}} + 1 \text{ pro } n \geq n_1.$$

Číselná posloupnost $\{\text{var}_a^b f_n\}$ je tedy ohraničená. Podle Bolzanovy-Weierstraßovy věty z ní lze vybrat podposloupnost $\{\text{var}_a^b f_{n_k} : k \in \mathbb{N}\}$, pro kterou platí

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \text{var}_a^b f_{n_k} = d < \infty,$$

tj.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists k_\varepsilon \in \mathbb{N} : (k \geq k_\varepsilon \text{ a } \sigma \in \mathcal{D}[a, b]) \implies V(f_{n_k}, \sigma) < d + \varepsilon$$

a

$$\forall \varepsilon > 0 \forall \sigma \in \mathcal{D}[a, b] : V(f, \sigma) = \lim_{k \rightarrow \infty} V(f_{n_k}, \sigma) \leq d + \varepsilon.$$

Odtud ovšem už plyne, že je

$$\text{var}_a^b f = \sup_{\sigma \in \mathcal{D}[a, b]} V(f, \sigma) \leq d < \infty, \quad \text{tj. } f \in \mathbb{BV}[a, b].$$

d) Podle (2.14) tedy pro každé $\varepsilon > 0$ existuje $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ takové, že

$$n, m \geq n_\varepsilon \implies V(f_n - f_m, \sigma) \leq \text{var}_a^b (f_n - f_m) < \varepsilon \text{ pro } \sigma \in \mathcal{D}[a, b].$$

Tudíž, je-li $m \geq n_\varepsilon$, pak pro každé $\sigma \in \mathcal{D}[a, b]$ platí

$$V(f - f_m, \sigma) = \lim_{n \rightarrow \infty} V(f_n - f_m, \sigma) \leq \varepsilon \text{ neboli } \text{var}_a^b (f - f_m) \leq \varepsilon.$$

To ovšem znamená, že $\lim_{m \rightarrow \infty} \|f - f_m\|_{\mathbb{BV}} = 0$, což zbývalo ještě dokázat. \square

2.3 Konečná variace a spojitost

Podle důsledku 2.16 mohou mít funkce s konečnou variací nespojitosti pouze prvního druhu. Podívejme se nyní trochu podrobněji na vlastnosti funkcí s konečnou variací související se spojitostí.

2.21 Věta. *Každá funkce $f \in \mathbb{BV}[a, b]$ má nejvýše spočetně mnoho bodů nespojitosti na intervalu $[a, b]$.*

Důkaz z plyne z důsledku 2.16 a z následujícího lemmatu. \square

2.22 Lemma. *Nechť $J \subset \mathbb{R}$ je otevřený interval, $f: J \rightarrow \mathbb{R}$ a M je množina bodů nespojitosti I. druhu funkce f v J . Potom M je nejvýše spočetná.*

Důkaz. a) Označme

$$M^+ = \{x \in J : f(x+) \neq f(x)\}, \quad M^- = \{x \in J : f(x-) \neq f(x)\}$$

a

$$M_1^+ = \{x \in M^+ : f(x) < f(x+)\}, \quad M_2^+ = \{x \in M^+ : f(x) > f(x+)\}.$$

Potom je $M = M^+ \cup M^-$ a $M^+ = M_1^+ \cup M_2^+$. Uspořádejme množinu \mathbb{P} racionálních čísel do posloupnosti $\mathbb{P} = \{r_k\}$. (Uvědomte si však, že množinu \mathbb{P} nelze uspořádat „podle velikosti“, tj. tak aby platilo $r_k < r_{k+1}$ pro každé $k \in \mathbb{N}$.)

Nechť r značí zobrazení, které každému $x \in M_1^+$ přiřadí první (při daném uspořádání množiny \mathbb{P}) racionální číslo, které leží v intervalu $(f(x), f(x+))$. Přesněji řečeno,

$$r(x) = r_j \iff r_j \in (f(x), f(x+)) \text{ a } \{r_1, r_2, \dots, r_{j-1}\} \cap (f(x), f(x+)) = \emptyset.$$

Dále pro každé $q \in \mathbb{P}$ označme symbolem $r_{-1}(q)$ jeho vzor při zobrazení r , tj.

$$r_{-1}(q) = \{x \in M_1^+ : r(x) = q\}.$$

Máme

$$M_1^+ = \bigcup_{q \in \mathbb{P}} r_{-1}(q).$$

Ukážeme-li tedy, že každá množina $r_{-1}(q)$, $q \in \mathbb{P}$ je spočetná, budeme mít současně také dokázáno, že i množina M_1^+ je spočetná.

Nechť je tedy dáno libovolné $q \in \mathbb{P}$. Vzhledem k definici množiny M_1^+ a zobrazení r pro každé $x \in r_{-1}(q)$ existuje $\delta(x) > 0$ takové, že

$$x < y < x + \delta(x) \implies f(y) > r(x).$$

Jsou-li $x_1, x_2 \in r_{-1}(q)$ taková, že $x_1 < x_2$ a $r(x_1) = r(x_2) = q$, pak musí platit

$$(x_1, x_1 + \delta(x_1)) \cap (x_2, x_2 + \delta(x_2)) = \emptyset.$$

Vskutku, kdyby bylo $x_1 < x_2 < x_1 + \delta(x_1)$, bylo by též (vzhledem k definici δ)

$$q = r(x_1) < f(x_2) < r(x_2) = q,$$

což není možné. Systém intervalů $\{(x, x + \delta(x)), x \in r_{-1}(q)\}$ je tedy disjunktní. Každému $x \in r_{-1}(q)$ lze tedy přiřadit jediné racionální číslo $p \in (x, x + \delta(x))$ a tím definovat prosté zobrazení $r_{-1}(q)$ do \mathbb{P} . To znamená, že pro každé $q \in \mathbb{P}$ je množina $r_{-1}(q)$ spočetná.

b) Protože $M_2^+ = \{x \in J : -f(x) < -f(x+)\}$, můžeme použít část a) tohoto důkazu k důkazu spočetnosti množiny M_2^+ .

c) Konečně, $M^- = \{x \in J : f(-x) \neq f(-x+)\}$, takže podle částí a)–b) tohoto důkazu je také M^- spočetná množina. \square

2.23 Poznámka. Klíčovým argumentem pro platnost lemmatu 2.22 je tvrzení: Každý disjunktní systém intervalů v \mathbb{R} je spočetný. Důkaz tohoto tvrzení je v našem důkazu lemmatu 2.22 obsažen.

Nechť $f \in \mathbb{BV}[a, b]$ a

$$v(x) = \text{var}_a^x f \quad \text{pro } x \in [a, b]. \quad (2.15)$$

Podle důkazu věty 2.14 víme, že funkce v a $v - f$ jsou neklesající na $[a, b]$. Ukážeme nyní, že funkce v „kopíruje“ spojitost funkce f .

2.24 Lemma. *Nechť $f \in \mathbb{BV}[a, b]$ a $v : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ je definována vztahem (2.15). Potom je f spojitá v bodě $x \in [a, b]$ zprava právě tehdy, když je v tomto bodě spojitá zprava i funkce v . Podobně, f je spojitá v bodě $x \in (a, b]$ zleva právě tehdy, když je v tomto bodě spojitá zleva i funkce v .*

D ů k a z. a) Nechť $x \in (a, b]$ a $f(x-) = f(x)$. Buď dáno $\varepsilon > 0$. Zvolme $\delta > 0$ tak, aby platilo

$$|f(x) - f(t)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{pro každé } t \in (x - \delta, x].$$

Zvolme dělení $\sigma = \{\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_m\} \in \mathcal{D}[a, x]$ tak, aby platilo

$$v(x) - V(f, \sigma) < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{a } \sigma_{m-1} \in (x - \delta, x).$$

Máme $|f(x) - f(\sigma_{m-1})| < \frac{\varepsilon}{2}$, a tedy

$$v(x) - \sum_{j=1}^{m-1} |f(\sigma_j) - f(\sigma_{j-1})| < |f(x) - f(\sigma_{m-1})| + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Odtud snadno odvodíme, že platí $v(x) - v(\sigma_{m-1}) < \varepsilon$. Protože v je neklesající na $[a, b]$, dostáváme dále

$$v(x) - v(t) < \varepsilon \quad \text{pro každé } t \in (\sigma_{m-1}, x].$$

Tím je dokázána spojitost zleva funkce v .

b) Podobně dokážeme, že funkce v je spojitá zprava v každém bodě $x \in [a, b)$, ve kterém je zprava spojitá funkce f .

c) Pravdivost zbývajících implikací plyne okamžitě z nerovností

$$|f(x) - f(y)| \leq |v(x) - v(y)|$$

platných pro všechna $x, y \in [a, b]$ (viz cvičení 2.6 (i)). □

Z následujícího tvrzení vyplyne, že součet absolutních hodnot skoků funkce s konečnou variací je vždy konečný.

2.25 Věta. *Nechť $f \in \mathbb{BV}[a, b]$ a nechť $W = \{s_k\}$ je prostá posloupnost bodů z intervalu (a, b) . Potom*

$$|\Delta^+ f(a)| + \sum_{k=1}^{\infty} (|\Delta^+ f(s_k)| + |\Delta^- f(s_k)|) + |\Delta^- f(b)| \leq \text{var}_a^b f. \quad (2.16)$$

D ů k a z . a) Předpokládejme nejprve, že f je neklesající. Potom

$$\begin{aligned} |\Delta^+ f(a)| + \sum_{k=1}^{\infty} (|\Delta^+ f(s_k)| + |\Delta^- f(s_k)|) + |\Delta^- f(b)| \\ = \Delta^+ f(a) + \sum_{k=1}^{\infty} \Delta f(s_k) + \Delta^- f(b). \end{aligned}$$

Nechť $n \in \mathbb{N}$ a $\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_{n+1}$ jsou body intervalu $[a, b]$ takové, že

$$a = \sigma_0 < \sigma_1 < \dots < \sigma_n < \sigma_{n+1} = b$$

a

$$\{\sigma_k : k = 0, \dots, n+1\} = \{a\} \cup \{s_k : k = 1, \dots, n\} \cup \{b\}.$$

Zvolme dále t_k , $k = 1, 2, \dots, n+1$, tak, aby platilo

$$a < t_1 < \sigma_1 < t_2 < \sigma_2 < \dots < \sigma_n < t_{n+1} < b.$$

Potom je

$$0 \leq \Delta^+ f(a) \leq f(t_1) - f(a), \quad 0 \leq \Delta^- f(b) \leq f(b) - f(t_{n+1})$$

a

$$0 \leq \Delta f(\sigma_k) \leq f(t_{k+1}) - f(t_k) \quad \text{pro } k = 1, 2, \dots, n.$$

Tudíž

$$\begin{aligned} \Delta^+ f(a) + \sum_{k=1}^n \Delta f(\sigma_k) + \Delta^- f(b) &= \Delta^+ f(a) + \sum_{k=1}^n \Delta f(\sigma_k) + \Delta^- f(b) \\ &\leq (f(t_1) - f(a)) + \sum_{k=1}^n (f(t_{k+1}) - f(t_k)) + (f(b) - f(t_{n+1})) \\ &= f(b) - f(a). \end{aligned}$$

Pro libovolné $n \in \mathbb{N}$ tedy máme

$$\Delta^+ f(a) + \sum_{k=0}^n \Delta f(s_k) + \Delta^- f(b) \leq f(b) - f(a) = \text{var}_a^b f.$$

Nerovnost (2.16) tedy platí pro každou funkci f neklesající na $[a, b]$.b) Nyní nechť f je libovolná funkce s konečnou variací na $[a, b]$ a nechť funkce \mathbf{p} a \mathbf{n} jsou definovány jako ve cvičení 2.15. Potom $f = f(a) + \mathbf{p} - \mathbf{n}$,

$$\begin{aligned} \Delta^+ f(t) &= \Delta^+ \mathbf{p}(t) - \Delta^+ \mathbf{n}(t), \quad \Delta^- f(s) = \Delta^- \mathbf{p}(s) - \Delta^- \mathbf{n}(s), \\ |\Delta^+ f(t)| &= \Delta^+ \mathbf{p}(t) + \Delta^+ \mathbf{n}(t) \quad \text{a} \quad |\Delta^- f(s)| = \Delta^- \mathbf{p}(s) + \Delta^- \mathbf{n}(s) \end{aligned}$$

pro $t \in [a, b)$, $s \in (a, b]$. Podle první části důkazu máme

$$\Delta^+ \mathbf{p}(a) + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\Delta^+ \mathbf{p}(s_k) + \Delta^- \mathbf{p}(s_k) \right) + \Delta^- \mathbf{p}(b) \leq \mathbf{p}(b)$$

a

$$\Delta^+ \mathbf{n}(a) + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\Delta^+ \mathbf{n}(s_k) + \Delta^- \mathbf{n}(s_k) \right) + \Delta^- \mathbf{n}(b) \leq \mathbf{n}(b).$$

Sečteme-li tyto nerovnosti, dostaneme

$$|\Delta^+ f(a)| + \sum_{k=0}^n \left(|\Delta^+ f(s_k)| + |\Delta^- f(s_k)| \right) + |\Delta^- f(b)| \leq \mathbf{p}(b) + \mathbf{n}(b) = \text{var}_a^b f. \quad \square$$

2.26 Poznámka. Nechť $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ má konečnou variaci a nechť množina W jejích bodů nespojitosti v (a, b) je nekonečná. Podle věty 2.21 existuje vzájemně jednoznačné zobrazení $k \in \mathbb{N} \rightarrow s_k \in W$ takové, že $W = \{s_k\}$. Takových zobrazení je ovšem nekonečně mnoho. Podle věty 2.25 je však řada

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(|\Delta^+ f(s_k)| + |\Delta^- f(s_k)| \right)$$

(absolutně) konvergentní a její součet nezávisí na volbě uspořádání množiny W . Protože pro $x \in (a, b)$ je $(|\Delta^+ f(x)| + |\Delta^- f(x)|) \neq 0$ pouze tehdy, když $x \in W$, má tedy smysl definovat

$$\sum_{x \in (a,b)} (|\Delta^+ f(x)| + |\Delta^- f(x)|) = \sum_{k=1}^{\infty} (|\Delta^+ f(s_k)| + |\Delta^- f(s_k)|), \quad (2.17)$$

kde $\{s_k\}$ je libovolná prostá posloupnost bodů z (a, b) taková, že $W = \{s_k\}$. Analogicky budeme rozumět i symbolům $\sum_{x \in [a,b]}$, resp. $\sum_{x \in (a,b]}$, resp. $\sum_{x \in [a,b)}$.

Větu 2.25 můžeme nyní přeformulovat do následující podoby.

2.27 Důsledek. Pro každou funkci $f \in \mathbb{BV}[a, b]$ platí

$$\sum_{x \in [a,b)} |\Delta^+ f(x)| + \sum_{x \in (a,b]} |\Delta^- f(x)| \leq \text{var}_a^b f. \quad (2.18)$$

2.4 Derivace funkcí s konečnou variací

Nyní se budeme věnovat vlastnostem funkcí s konečnou variací vzhledem k derivování. Nejprve připomeňme pojem množin s nulovou mírou.

2.28 Definice. Množina $M \subset \mathbb{R}$ má nulovou míru ($\mu(M) = 0$), když ke každému $\varepsilon > 0$ existuje nejvýše spočetný systém otevřených intervalů I_j , $j \in \mathbb{N}$, takový, že

$$M \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} I_j \text{ a } \sum_{j=1}^{\infty} |I_j| < \varepsilon.$$

Řekneme, že nějaká vlastnost platí skoro všude (s.v.) na intervalu $[a, b]$, jestliže existuje množina $M \subset [a, b]$ nulové míry taková, že tato vlastnost platí pro každé $x \in [a, b] \setminus M$.

2.29 Cvičení. Dokažte, že platí:

- (i) Každá spočetná množina $S \subset \mathbb{R}$ má nulovou míru.
- (ii) Sjednocení spočetně mnoha množin nulové míry má nulovou míru.

2.30 Věta (LEBESGUEOVA VĚTA O DERIVACI MONOTÓNÍ FUNKCE). Každá funkce f , definovaná a monotónní na intervalu $[a, b]$, má konečnou derivaci $f'(x)$ pro s.v. $x \in [a, b]$.

Důkaz věty 2.30 je rozsáhlý, technicky komplikovaný a do značné míry závislý na pojmech, které se do tohoto textu nevejdou. Pro důkaz odkazujeme na učebnice, které obsahují důkladný přehled této tematiky (viz např. [15, věta 84], [16, věta VI.1.2], [33, Theorem 22.5]).

2.31 Poznámka. Speciálně vzhledem k větě 2.14, má každá funkce $f \in \mathbb{BV}[a, b]$ konečnou derivaci skoro všude na intervalu $[a, b]$. Je dokonce známo (viz větu 3.10), že derivace funkcí s konečnou variací jsou lebesgueovskými integrovatelné. **ALE !!!** Obecně neplatí pro každou funkci $f \in \mathbb{BV}[a, b]$ zdánlivě přirozená rovnost

$$f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t) dt \quad \text{pro } x \in [a, b].$$

Existují totiž funkce $f \in \mathbb{BV}[a, b]$ nekonstantní na $[a, b]$ a takové, že $f' = 0$ s.v. na $[a, b]$.

2.32 Definice. Funkce $f \in \mathbb{BV}[a, b]$ se nazývá *singulární*, jestliže $f'(x) = 0$ pro s.v. $x \in [a, b]$.

2.5 Skokové funkce

Nejjednodušším příkladem nekonstantních singulárních funkcí jsou funkce typu $f(x) = \chi_{[a,c]}(x)$, kde $c \in (a, b)$. Jejich zobecněním jsou třídy *jednoduchých skokových funkcí* (anglicky *step functions*), resp. *skokových funkcí* (anglicky *break functions*).

2.33 Definice. Funkce $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ je *jednoduchá (též konečná) skoková funkce* na $[a, b]$, jestliže existuje dělení $\sigma \in \mathcal{D}[a, b]$ takové, že na každém jeho dílčím otevřeném intervalu (σ_{j-1}, σ_j) je f konstantní. Množinu jednoduchých skokových funkcí na intervalu $[a, b]$ značíme $\mathbb{S}[a, b]$.

Funkce $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ je *skoková funkce* na $[a, b]$, jestliže buď to f je jednoduchá skoková funkce, nebo existují $c, c_0, d \in \mathbb{R}$, prostá posloupnost $\{s_k\} \subset (a, b)$ a posloupnosti $\{c_k\} \subset \mathbb{R}$ a $\{d_k\} \subset \mathbb{R}$ takové, že platí

$$\sum_{k=1}^{\infty} (|c_k| + |d_k|) < \infty \tag{2.19}$$

a

$$f(x) = c + c_0 \chi_{(a,b]}(x) + \sum_{k=1}^{\infty} \left(c_k \chi_{(s_k,b]}(x) + d_k \chi_{[s_k,b]}(x) \right) + d \chi_{[b]}(x) \tag{2.20}$$

pro $x \in [a, b]$.

Množinu skokových funkcí na intervalu $[a, b]$ značíme $\mathbb{B}[a, b]$.

2.34 Cvičení. Dokažte, že platí:

(i) $f \in \mathbb{S}[a, b]$ právě tehdy, když existují $m \in \mathbb{N}$, $c, c_0, d \in \mathbb{R}$, množiny

$$\{c_k : k = 1, 2, \dots, m\} \subset \mathbb{R}, \quad \{d_k : k = 1, 2, \dots, m\} \subset \mathbb{R}$$

a prostá množina $\{s_k : k = 1, 2, \dots, m\} \subset (a, b)$ takové, že platí

$$f(x) = c + c_0 \chi_{(a,b]}(x) + \sum_{k=1}^m \left(c_k \chi_{(s_k,b]}(x) + d_k \chi_{[s_k,b]}(x) \right) + d \chi_{[b]}(x)$$

pro $x \in [a, b]$.

- (ii) $f \in \mathbb{B}[a, b]$ právě tehdy, když buďto $f \in \mathbb{S}[a, b]$, nebo existují $c \in \mathbb{R}$, posloupnosti $\{c_k\} \subset \mathbb{R}$, $\{d_k\} \subset \mathbb{R}$ a prostá posloupnost $\{s_k\} \subset [a, b]$ takové, že platí (2.19) a

$$f(x) = c + \sum_{a \leq s_k < x} c_k + \sum_{a < s_k \leq x} d_k \quad \text{pro } x \in [a, b], \quad (2.21)$$

kde součtové symboly mají smysl zavedený v poznámce 2.26 (tj. v první sumě se sčítá přes všechny indexy k , pro které $s_k \in (a, x]$, a ve druhé se sčítá přes všechny indexy k , pro které $s_k \in [a, x)$). POZOR na jemné rozdíly mezi posloupnostmi $\{s_k\}$, $\{c_k\}$, $\{d_k\}$ zde a v definici 2.33.

- (iii) Pro každou funkci $f \in \mathbb{B}[a, b]$ tvaru (2.21) platí

$$f(x-) = c + \sum_{a \leq s_k < x} c_k + \sum_{a < s_k < x} d_k, \quad \text{jestliže } x \in (a, b]$$

a

$$f(x+) = c + \sum_{a \leq s_k \leq x} c_k + \sum_{a < s_k \leq x} d_k, \quad \text{jestliže } x \in [a, b).$$

(Jak bude vypadat vyjádření jednostranných limit funkcí z $\mathbb{B}[a, b]$, vyjdeme-li z tvaru (2.20)?)

2.35 Věta. Pro každou skokovou funkci $f \in \mathbb{B}[a, b]$ platí

$$\text{var}_a^b f = |\Delta^+ f(a)| + \sum_{x \in (a,b)} \left(|\Delta^+ f(x)| + |\Delta^- f(x)| \right) + |\Delta^- f(b)| < \infty. \quad (2.22)$$

Speciálně $\mathbb{S}[a, b] \subset \mathbb{B}[a, b] \subset \mathbb{BV}[a, b]$.

D ů k a z. Je-li $f \in \mathbb{S}[a, b]$, je tvrzení věty zřejmé. Předpokládejme tedy, že $f \in \mathbb{B}[a, b] \setminus \mathbb{S}[a, b]$ je vyjádřena ve tvaru (2.21) ze cvičení 2.34 (ii).

a) Pro libovolná $x, y \in [a, b]$, $x < y$, máme

$$|f(y) - f(x)| \leq \sum_{x \leq s_k < y} |c_k| + \sum_{x < s_k \leq y} |d_k|.$$

Pro každé dělení σ intervalu $[a, b]$ tedy platí

$$V(f, \sigma) \leq \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} m \left(\sum_{\sigma_{j-1} \leq s_k < \sigma_j} |c_k| + \sum_{\sigma_{j-1} < s_k \leq \sigma_j} |d_k| \right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} (|c_k| + |d_k|).$$

Odtud plyne podle (2.19), že

$$\operatorname{var}_a^b f \leq \sum_{k=1}^{\infty} (|c_k| + |d_k|) < \infty, \quad (2.23)$$

tj. $f \in \mathbb{BV}[a, b]$.

b) Na druhou stranu, podle cvičení 2.34 (iii) snadno odvodíme, že platí

$$\Delta^+ f(s_k) = c_k \quad \text{a} \quad \Delta^- f(s_k) = d_k \quad \text{pro každé } k \in \mathbb{N}. \quad (2.24)$$

Můžeme tedy použít také důsledek 2.27, podle kterého platí obrácená nerovnost

$$\sum_{k=1}^{\infty} (|c_k| + |d_k|) \leq \operatorname{var}_a^b f$$

a uzavřít tak důkaz věty. \square

Je-li f jednoduchá skoková funkce na $[a, b]$, pak zřejmě platí $f'(x) = 0$ pro každé $x \in [a, b] \setminus M$, kde $M \subset [a, b]$ je nějaká konečná (nebo také prázdná) množina. Jednoduché skokové funkce na $[a, b]$ jsou tedy singulární na $[a, b]$. Ukážeme, že dokonce každá skoková funkce na $[a, b]$ je singulární na $[a, b]$. K tomu budeme potřebovat následující tvrzení známé ze základů matematické analýzy jako *malá Fubinova věta*.

2.36 Věta (MALÁ FUBINIOVA). *Nechť $\{f_k\}$ je posloupnost funkcí neklesajících na $[a, b]$ a taková, že řada $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ konverguje pro každé $x \in [a, b]$.*

Potom $f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f'_k(x) < \infty$ pro s.v. $x \in [a, b]$.

D ů k a z . a) Označme

$$g_k(x) = f_k(x) - f_k(a) \quad \text{a} \quad g(x) = f(x) - f(a) \quad \text{pro } k \in \mathbb{N} \quad \text{a} \quad x \in [a, b]$$

Potom jsou všechny funkce $g, g_k, k \in \mathbb{N}$, nezáporné a neklesající na $[a, b]$. Podle věty 2.30 pro každé $k \in \mathbb{N}$ existuje množina $W_k \subset [a, b]$ nulové míry taková, že funkce g_k má konečnou derivaci $g'_k(x)$ pro každé $x \in [a, b] \setminus W_k$. Podobně existuje konečná derivace $g'(x)$ pro každé $x \in [a, b] \setminus W$, kde $W \subset [a, b]$ má také nulovou míru. Označíme-li tedy $U = W \cup \bigcup_{k=1}^m W_k$, můžeme shrnout, že existují konečné derivace $g'(x), g'_k(x), k \in \mathbb{N}$, pro každé $x \in [a, b] \setminus U$. Podle Cvičení 2.29 (ii) má ovšem také množina U nulovou míru.

Pro libovolná $x \in [a, b] \setminus U$ a $\xi \in [a, b]$ taková, že $\xi \neq x$, máme

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{g_k(\xi) - g_k(x)}{\xi - x} = \frac{g(\xi) - g(x)}{\xi - x}.$$

Protože každý sčítanec v sumě na levé straně je neklesající, plyne odtud, že

$$s_n(x) := \sum_{k=1}^n \frac{g_k(\xi) - g_k(x)}{\xi - x} \leq \frac{g(\xi) - g(x)}{\xi - x}$$

platí pro libovolná $x \in [a, b] \setminus U$, $\xi \in [a, b] \setminus \{x\}$ a $n \in \mathbb{N}$. Limitním přechodem $\xi \rightarrow x$ dostaneme

$$s'_n(x) = \sum_{k=1}^n g'_k(x) \leq g'(x) \quad \text{pro } x \in [a, b] \setminus U \text{ a } n \in \mathbb{N}.$$

Díky tomu, že $g'_k(x) \geq 0$ pro $x \in [a, b] \setminus U$ a $k \in \mathbb{N}$, je posloupnost $\{s'_n\}$ neklesající a ohraničená na $[a, b]$. Pro každé $x \in [a, b] \setminus U$ tedy existuje konečná limita

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s'_n(x) = \sum_{k=1}^{\infty} g'_k(x) \leq g'(x), \quad (2.25)$$

tj. řada $\sum_{k=1}^{\infty} g'_k(x)$ konverguje pro s.v. $x \in [a, b]$.

b) Z druhé strany, pro každé $\ell \in \mathbb{N}$ existuje n_ℓ takové, že $0 \leq g(b) - s_{n_\ell}(b) < \frac{1}{2^\ell}$. Protože g i s_{n_ℓ} jsou neklesající na $[a, b]$, znamená to, že je také

$$0 \leq g(x) - s_{n_\ell}(x) < \frac{1}{2^\ell}$$

a tudíž

$$0 \leq \sum_{\ell=1}^{\infty} (g(x) - s_{n_\ell}(x)) \leq \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{1}{2^\ell} = 1 \quad \text{pro } x \in [a, b].$$

Podle první části důkazu, kde uvažujeme posloupnost $\{g(x) - s_{n_\ell}(x)\}$ místo $\{g_k\}$, dostáváme odtud, že i řada $\sum_{\ell=1}^{\infty} (g'(x) - s'_{n_\ell}(x))$ je konvergentní pro s.v. $x \in [a, b]$.

Speciálně, musí platit $\lim_{\ell \rightarrow \infty} (s'_{n_\ell}(x) - g'(x)) = 0$ pro s.v. $x \in [a, b]$. Toto by ovšem nemohlo být pravda, kdyby nerovnost v (2.25) byla ostrá. Platí tedy rovnosti

$$\begin{aligned} f'(x) &= (f(x) - f(a))' = g'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} g'_k(x) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} (f_k(x) - f(a))' = \sum_{k=1}^{\infty} f'_k(x) \quad \text{pro s.v. } x \in [a, b]. \end{aligned}$$

Tím je důkaz dokončen. □

2.37 Věta. Každá skoková funkce na $[a, b]$ je singulární na $[a, b]$.

D ů k a z . Nechť $f \in \mathbb{B}[a, b] \setminus \mathbb{S}[a, b]$, $c \in \mathbb{R}$, posloupnosti $\{c_k\} \subset \mathbb{R}$ a $\{d_k\} \subset \mathbb{R}$ a prostá posloupnost $W = \{s_k\} \subset [a, b]$ jsou takové, že platí (2.19) a (2.21). Definujme pro $k \in \mathbb{N}$

$$v_k(x) = \begin{cases} 0, & \text{když } a \leq x < s_k, \\ |d_k|, & \text{když } x = s_k, \\ |c_k| + |d_k|, & \text{když } s_k < x \leq b. \end{cases}$$

Každá funkce v_k je neklesající na $[a, b]$ a $v'_k(x) = 0$ pro $x \neq s_k$. Dále

$$\sum_{k=1}^{\infty} v_k(x) = \sum_{a \leq s_k < x} |c_k| + \sum_{a < s_k \leq x} |d_k| \quad \text{pro } x \in [a, b].$$

Protože podle (2.21) řady $\sum_{a \leq s_k < x} |c_k|$ a $\sum_{a < s_k \leq x} |d_k|$ konvergují pro každé $x \in [a, b]$, je funkce

$$v(x) = \sum_{k=1}^{\infty} v_k(x)$$

definovaná pro každé $x \in [a, b]$ a podle věty 2.36 platí

$$v'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} v'_k(x) = 0 \quad \text{pro s.v. } x \in [a, b].$$

Protože pro všechna $x, y \in [a, b]$ taková, že $x \neq y$, zřejmě platí

$$\left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right| \leq \left| \frac{v(x) - v(y)}{x - y} \right|,$$

plyne odsud, že také $f'(x) = 0$ pro $x \notin W$.

V případě, že $f \in \mathbb{S}[a, b]$, je tvrzení věty evidentní. □

2.38 Poznámka. Příklad funkce, která je spojitá, neklesající a singulární na daném intervalu, je uveden v [14, V.9, cvičení 4].

2.6 Jordanův rozklad funkce s konečnou variací

2.39 Věta. Každou funkci $f \in \mathbb{BV}[a, b]$ lze vyjádřit jako součet $f = f_1 + f_2$ na $[a, b]$, kde $f_1 \in \mathbb{BV}[a, b] \cap \mathbb{C}[a, b]$ a $f_2 \in \mathbb{B}[a, b]$.

Je-li $f = \tilde{f}_1 + \tilde{f}_2$, kde $\tilde{f}_1 \in \mathbb{C}[a, b] \cap \mathbb{BV}[a, b]$ a $\tilde{f}_2 \in \mathbb{B}[a, b]$, jiný takový rozklad, potom jsou funkce $f_1 - \tilde{f}_1$ a $f_2 - \tilde{f}_2$ konstantní na $[a, b]$.

D ů k a z. a) Označme symbolem W množinu bodů nespojitosti funkce f , tj. $W = \{s_k \in [a, b] : k \in \mathbb{K}\}$, kde $\mathbb{K} = \{1, 2, \dots, m\}$ pro nějaké $m \in \mathbb{N}$. nebo $\mathbb{K} = \mathbb{N}$. Definujme

$$f_2(x) = \sum_{a < s_k \leq x} \Delta^- f(s_k) + \sum_{a \leq s_k < x} \Delta^+ f(s_k) \quad \text{pro } x \in [a, b]. \quad (2.26)$$

Potom podle důsledku 2.27 platí

$$\sum_{x \in [a, b]} |\Delta^+ f(x)| + \sum_{x \in (a, b]} |\Delta^- f(x)| \leq \text{var}_a^b f$$

a podle definice 2.33 je tedy $f_2 \in \mathbb{B}[a, b]$. Analogicky jako ve cvičení 2.34 (iii) (viz též (2.24)) dostaneme

$$f_2(t+) = \sum_{a < s_k \leq t} \Delta^- f(s_k) + \sum_{a \leq s_k \leq t} \Delta^+ f(s_k) \quad \text{pro } t \in [a, b]$$

a

$$f_2(s-) = \sum_{a < s_k < s} \Delta^- f(s_k) + \sum_{a \leq s_k < s} \Delta^+ f(s_k) \quad \text{pro } s \in (a, b]$$

Snadno tedy ověříme, že

$$\left. \begin{aligned} \Delta^+ f_2(t) &= \Delta^+ f(t) \quad \text{pro } t \in [a, b), \\ \Delta^- f_2(s) &= \Delta^- f(s) \quad \text{pro } s \in (a, b]. \end{aligned} \right\} \quad (2.27)$$

Tudíž

$$((f(t+) - f_2(t+)) - (f(t) - f_2(t))) = \Delta^+ f(t) - \Delta^+ f_2(t) = 0$$

a

$$(f(s) - f_2(s)) - (f(s-) - f_2(s-)) = \Delta^- f(s) - \Delta^- f_2(s) = 0.$$

Funkce $f_1 = f - f_2$ je tedy spojitá na $[a, b]$ a $f = f_1 + f_2$ na $[a, b]$.

b) Nechť $f = \tilde{f}_1 + \tilde{f}_2$, kde $\tilde{f}_1 \in \mathbb{C}[a, b] \cap \mathbb{BV}[a, b]$ a $\tilde{f}_2 \in \mathbb{B}[a, b]$. Potom

$$(f(t+) - \tilde{f}_2(t+)) - (f(t) - \tilde{f}_2(t)) = \Delta^+ f(t) - \Delta^+ \tilde{f}_2(t) = 0$$

a

$$(f(s) - \tilde{f}_2(s)) - (f(s-) - \tilde{f}_2(s-)) = \Delta^- f(s) - \Delta^- \tilde{f}_2(s) = 0$$

platí pro všechna $t \in [a, b)$ a $s \in (a, b]$. Vzhledem k (2.27) dostáváme, že platí

$$\Delta^+ \tilde{f}_2(t) = \Delta^+ f_2(t) = \Delta^+ f(t) \quad \text{a} \quad \Delta^- \tilde{f}_2(s) = \Delta^- f_2(s) = \Delta^- f(s)$$

pro $t \in [a, b)$, $s \in (a, b]$. Odtud podle definice 2.33 (viz cvičení 2.34 (ii), (2.21)) a

(2.24)) plyne, že

$$\tilde{f}_2(x) = c + \sum_{a < s_k \leq x} \Delta^- f(s_k) + \sum_{a \leq s_k < x} \Delta^+ f(s_k) \quad \text{pro } x \in [a, b],$$

kde $c \in \mathbb{R}$ může být libovolné. Rozdíl $f_2 - \tilde{f}_2 = f_2(a) - \tilde{f}_2(a)$ je tedy konstantní na $[a, b]$. \square

2.40 Poznámka. Podle věty 2.39 lze každou funkci s konečnou variací rozložit na součet funkce spojitě a funkce skokové. Takový rozklad se nazývá *Jordanův rozklad* funkce s konečnou variací.

2.41 Definice. Každou funkci f_2 přiřazenou k f podle věty 2.39 nazýváme *skoková část* funkce f . Rozdíl $f - f_2$ nazýváme *spojitá část* funkce f . Skokovou, resp. spojitou část funkce f značíme obvykle f^{B} , resp. f^{C} .

Následující lemmátka se nám bude hodit v kapitole 5.

2.42 Lemma. *Nechť $f \in \mathbb{B}\mathbb{V}[a, b]$, $W = \{w_k\}$ je její množina bodů nespojitosti v intervalu $[a, b]$. Pro $n \in \mathbb{N}$ a $x \in [a, b]$ definujme*

$$f^{\text{B}}(x) = \sum_{a < w_k \leq x} \Delta^- f(w_k) + \sum_{a \leq w_k < x} \Delta^+ f(w_k)$$

a

$$f_n^{\text{B}}(x) = \sum_{\substack{a < w_k \leq x \\ k \leq n}} \Delta^- f(w_k) + \sum_{\substack{a \leq w_k < x \\ k \leq n}} \Delta^+ f(w_k).$$

Potom je $f_n^{\text{B}} \in \mathbb{S}[a, b]$ pro každé $n \in \mathbb{N}$ a platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{var}_a^b (f^{\text{B}} - f_n^{\text{B}}) = 0. \quad (2.28)$$

Důkaz. Zřejmě je $f_n^{\text{B}} \in \mathbb{S}[a, b]$ pro každé $n \in \mathbb{N}$. V případě, že množina W je konečná, je $f_n^{\text{B}} = f^{\text{B}}$ na $[a, b]$ pro dostatečně velká n a tvrzení lemmatu je triviální. Předpokládejme tedy, že W je nekonečná. Potom

$$f^{\text{B}} - f_n^{\text{B}} = \sum_{\substack{a < w_k \leq x \\ k > n}} \Delta^- f(w_k) + \sum_{\substack{a \leq w_k < x \\ k > n}} \Delta^+ f(w_k)$$

a podle věty 2.35 dostaneme

$$\text{var}_a^b (f^{\text{B}} - f_n^{\text{B}}) \leq \sum_{\substack{a < w_k \leq x \\ k > n}} |\Delta^- f(w_k)| + \sum_{\substack{a \leq w_k < x \\ k > n}} |\Delta^+ f(w_k)|. \quad (2.29)$$

Podle důsledku 2.27 je výraz na pravé straně nerovnosti (2.29) zbytek absolutně konvergentní řady, který ovšem konverguje k 0 při $n \rightarrow \infty$. Platí tudíž (2.28). \square

2.43 Příklad. Vraťme se ještě k funkcím

$$f_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{pro } 0 \leq x \leq \frac{1}{n}, \\ x \sin\left(\frac{\pi}{x}\right) & \text{pro } \frac{1}{n} \leq x \leq 2 \end{cases} \quad \text{pro } n \in \mathbb{N}$$

a

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{pro } x = 0, \\ x \sin\left(\frac{\pi}{x}\right) & \text{pro } x > 0. \end{cases}$$

Z příkladu 2.12 víme, že $\text{var}_0^2 f_n < \infty$ pro každé $n \in \mathbb{N}$. Snadno ověříme, že $\{f_n\}$ konverguje k f stejnoměrně na $[0, 2]$ a přitom podle příkladu 2.7 f nemá konečnou variaci na $[0, 2]$.

2.7 Bodová konvergence

Podle příkladu 2.43 stejnoměrná konvergence posloupnosti funkcí s konečnou variací nemusí stačit k tomu, aby její limita měla také konečnou variaci. Z následující věty však uvidíme, že stejnoměrná ohraničenost variací členů dané posloupnosti už zaručí, že dokonce její bodová limita konečnou variaci má. (Pomocí argumentů použitých v příkladu 2.7 ověřte, že pro posloupnost funkcí $\{f_n\}$ z příkladů 2.12 a 2.43 platí, že $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{var}_0^2 f_n = \infty$ a $\sup_{n \in \mathbb{N}} \text{var}_0^2 f_n = \infty$.)

2.44 Věta. *Nechť pro funkci $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ existuje posloupnost funkcí $\{f_n\}$ taková, že*

$$\text{var}_a^b f_n \leq \varkappa < \infty \quad \text{pro } n \in \mathbb{N}, \quad \text{a} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \quad \text{pro } x \in [a, b].$$

Potom je také $\text{var}_a^b f \leq \varkappa$.

Důkaz. Pro každé dělení $\sigma \in \mathcal{D}[a, b]$ platí

$$V(f, \sigma) = \lim_{n \rightarrow \infty} V(f_n, \sigma) \leq \varkappa,$$

a tudíž je také $\text{var}_a^b f \leq \varkappa$. □

2.45 Cvičení. Nechť

$$g(x) = \begin{cases} 2^{-k} & \text{když } x = \frac{1}{k+1} \text{ pro nějaké } k \in \mathbb{N}, \\ 0 & \text{pro ostatní } x \in [0, 1]. \end{cases}$$

Dokažte, že $f \in \mathbb{BV}[0, 1]$.

Nyní zformulujeme a dokážeme Hellyovu větu, která bude užitečná např. pro důkaz totální spojitosti některých operátorů definovaných na prostoru $\mathbb{BV}[a, b]$.

Hellyova věta říká, že z každé posloupnosti funkcí se stejnoměrně ohraničenou variací lze vybrat posloupnost bodově konvergující k funkci s konečnou variací.

2.46 Věta (HELLYOVA VĚTA O VÝBĚRU). *Nechť* $\{f_n\} \subset \mathbb{BV}[a, b]$, $\varkappa \in \mathbb{R}$,

$$|f_n(a)| \leq \varkappa \text{ a } \text{var}_a^b f_n \leq \varkappa \text{ pro všechna } n \in \mathbb{N}.$$

Potom existují funkce $f \in \mathbb{BV}[a, b]$ *a podposloupnost* $\{f_{n_k} : k \in \mathbb{N}\}$ *posloupnosti* $\{f_n\}$ *takové, že platí*

$$|f(a)| \leq \varkappa, \quad \text{var}_a^b f \leq \varkappa \quad \text{a} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x) = f(x) \quad \text{pro } x \in [a, b].$$

V důkazu využijeme následující dvě tvrzení.

Tvrzení 1. *Nechť*

$$|f_n(x)| \leq M < \infty \quad \text{na } [a, b] \quad \text{pro všechna } n \in \mathbb{N}.$$

Potom pro každou spočetnou množinu $P \subset [a, b]$ *posloupnost* $\{f_n\}$ *obsahuje podposloupnost* $\{f_{n_k} : k \in \mathbb{N}\}$ *takovou, že*

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(p) \in \mathbb{R} \quad \text{pro všechna } p \in P.$$

D ů k a z. Nechť $P = \{p_k\}$. Máme $|f_n(p_k)| \leq M < \infty$ pro všechna $n, k \in \mathbb{N}$. Podle Bolzanovy-Weierstrašovy věty pak existují posloupnost $\{n_{k,1} : k \in \mathbb{N}\}$ a $q_1 \in \mathbb{R}$ tak, že

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_{k,1}}(p_1) = q_1.$$

Podobně existují $\{f_{n_{k,2}} : k \in \mathbb{N}\} \subset \{f_{n_{k,1}} : k \in \mathbb{N}\}$ a $q_2 \in \mathbb{R}$ takové, že

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_{k,2}}(p_2) = q_2 \in \mathbb{R}, \quad \text{přičemž také} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_{k,2}}(p_1) = q_1 \in \mathbb{R}.$$

Takto pro každé $j \in \mathbb{N} \cap (1, \infty)$ najdeme posloupnosti

$$\{f_{n_{k,j}} : k \in \mathbb{N}\} \subset \{f_{n_{k,j-1}} : k \in \mathbb{N}\}$$

a čísla $q_j \in \mathbb{R}$ tak, že bude platit

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_{k,\ell}}(p_\ell) = q_\ell \in \mathbb{R} \quad \text{pro každé } \ell \in \{1, 2, \dots, j\}.$$

Položme $f_{n_k} = f_{n_{k,k}}$ pro $k \in \mathbb{N}$. Potom

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(p_j) = q_j \in \mathbb{R} \quad \text{pro } j \in \mathbb{N}. \quad \square$$

Tvrzení 2. *Předpokládejme, že všechny funkce* f_n , $n \in \mathbb{N}$, *jsou neklesající na* $[a, b]$ *a že existuje* $M \in (0, \infty)$ *takové, že* $\|f_n\| \leq M$ *pro každé* $n \in \mathbb{N}$. *Potom existují podposloupnost* $\{f_{n_k} : k \in \mathbb{N}\}$ *posloupnosti* $\{f_n\}$ *a funkce* $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ *neklesající na* $[a, b]$ *takové, že platí*

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x) = f(x) \quad \text{pro } x \in [a, b].$$

D ů k a z . Nechť $P = (\mathbb{P} \cap (a, b)) \cup [a] \cup [b]$ je množina racionálních čísel z intervalu (a, b) doplněná o body a, b . Množina P je spočetná a $[a, b] \setminus P \subset (a, b)$. Podle tvrzení 1 existují podposloupnost $\{n_k\} \subset \mathbb{N}$ a zobrazení $\varphi : P \rightarrow \mathbb{R}$ takové, že

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(p) = \varphi(p) \quad \text{pro } p \in P.$$

Zřejmě $\varphi(p') \leq \varphi(p'')$ pro všechna $p', p'' \in P$ taková, že $p' \leq p''$. Dále definujeme

$$\varphi(x) = \sup_{p \in P \cap [a, x]} \varphi(p) \quad \text{pro } x \in (a, b) \setminus P.$$

Potom φ je definovaná a neklesající na $[a, b]$ a

$$\varphi(x) = \lim_{\substack{p \rightarrow x^- \\ p \in P}} \varphi(p) \quad \text{pro } x \in (a, b) \setminus P.$$

Ukážeme, že v každém bodě $x_0 \in (a, b)$, ve kterém je funkce φ spojitá, platí

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x_0) = \varphi(x_0). \quad (2.30)$$

Vskutku, nechť je dáno $\varepsilon > 0$. Potom existuje $\delta_\varepsilon > 0$ takové, že

$$x_0 - \delta_\varepsilon < x < x_0 + \delta_\varepsilon \implies \varphi(x_0) - \varepsilon < \varphi(x) < \varphi(x_0) + \varepsilon.$$

Zvolíme-li $r' \in P \cap (x_0 - \delta_\varepsilon, x_0)$ a $r'' \in P \cap (x_0, x_0 + \delta_\varepsilon)$, bude platit

$$\varphi(x_0) - \varepsilon < \varphi(r') \leq \varphi(x_0) \leq \varphi(r'') < \varphi(x_0) + \varepsilon.$$

Dále zvolme k_ε tak, aby bylo

$$\varphi(r') - \varepsilon < f_{n_k}(r') < \varphi(r') + \varepsilon$$

a

$$\varphi(r'') - \varepsilon < f_{n_k}(r'') < \varphi(r'') + \varepsilon$$

pro každé $k \geq k_\varepsilon$. Potom pro každé $k \geq k_\varepsilon$ dostaneme také

$$\begin{aligned} \varphi(x_0) - 2\varepsilon &< \varphi(r') - \varepsilon < f_{n_k}(r') \leq f_{n_k}(x_0) \\ &\leq f_{n_k}(r'') < \varphi(r'') + \varepsilon < \varphi(x_0) + 2\varepsilon \end{aligned}$$

čili platí (2.30).

Dokázali jsme tedy, že je-li Q množina bodů nespojitosti funkce φ v (a, b) , pak

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x) = \varphi(x) \quad \text{pro } x \in [a, b] \setminus Q.$$

Podle věty 2.21 je množina Q spočetná. Můžeme tedy použít ještě jednou tvrzení 1 a dokázat tak existenci vybrané posloupnosti

$$\{f_{n_{k_\ell}} : \ell \in \mathbb{N}\} \subset \{f_{n_k} : k \in \mathbb{N}\},$$

která má limitu $\psi(x) \in \mathbb{R}$ pro každé $x \in Q$. Definujeme-li tedy

$$f(x) = \begin{cases} \varphi(x), & \text{když } x \in [a, b] \setminus Q, \\ \psi(x), & \text{když } x \in Q, \end{cases}$$

bude

$$\lim_{\ell \rightarrow \infty} f_{n_{k_\ell}}(x) = f(x) \quad \text{pro } x \in [a, b],$$

a protože funkce, která je na intervalu $[a, b]$ bodovou limitou posloupnosti funkcí neklesajících na $[a, b]$, je také neklesající, tvrzení 2 je dokázáno. \square

Důkaz věty 2.46

Pro každé $n \in \mathbb{N}$ a $x \in [a, b]$ položme

$$g_n(x) = \text{var}_a^x f_n \quad \text{a} \quad h_n(x) = g_n(x) - f_n(x).$$

Máme $f_n = g_n - h_n$ a všechny funkce g_n, h_n jsou neklesající na $[a, b]$ (viz cvičení 2.15). Dále

$$\|g_n\| \leq \text{var}_a^b f_n \leq \varkappa \quad \text{a} \quad \|h_n\| \leq \|f_n\| + \|g_n\| \leq 2\varkappa \quad \text{pro } n \in \mathbb{N}.$$

Podle tvrzení 2 existují funkce $g, h \in \mathbb{BV}[a, b]$ a posloupnost $\{n_k\} \subset \mathbb{N}$ takové, že

$$\lim_{k \rightarrow \infty} g_{n_k}(x) = g(x) \quad \text{a} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} h_{n_k}(x) = h(x) \quad \text{pro každé } x \in [a, b].$$

Označme $f = g - h$. Potom je

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} (g_{n_k}(x) - h_{n_k}(x)) = g(x) - h(x) = f(x)$$

pro každé $x \in [a, b]$. Zřejmě je $|f(a)| \leq \varkappa$. Konečně, podle věty 2.44 je také $\text{var}_a^b f \leq \varkappa$. Tím je důkaz dokončen. \square

Výklad v této kapitole se opíral o monografie V. Jarníka *Diferenciální počet II* [14, Kapitola V] a *Integrální počet II* [15, Kapitola V] a dále o odstavec II.6 v monografii T. H. Hildebrandta *Theory of Integration* [11] a o kapitolu XIII v monografii Š. Schwabika *Integrace v \mathbb{R} (Kurzweilova teorie)* [46], viz též kapitolu VI.2 v monografii A. N. Kolmogorova a S. V. Fomina *Základy teorie funkcí a funkcionální analýzy*. V těchto monografiích lze též nalézt i některé další podrobnosti.

Absolutně spojité funkce

Speciálním případem funkcí s konečnou variací jsou funkce absolutně spojité, které úzce souvisí s Lebesgueovou teorií integrálu a jsou dobře známy z Carathéodoryovy teorie obyčejných diferenciálních rovnic. Integrály, které se v této kapitole vyskytují, jsou integrály Lebesgueovy.

3.1 Definice a základní vlastnosti

3.1 Definice. Funkce $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ je *absolutně spojitá* na intervalu $[a, b]$, jestliže ke každému $\varepsilon > 0$ existuje $\delta > 0$ takové, že pro každý konečný systém intervalů $\{[a_j, b_j] : j = 1, 2, \dots, m\}$ splňující

$$a \leq a_1 < b_1 \leq a_2 < b_2 < \dots < b_{m-1} \leq a_m < b_m \leq b \quad \text{a} \quad \sum_{j=1}^m (b_j - a_j) < \delta \quad (3.1)$$

platí

$$\sum_{j=1}^m |f(b_j) - f(a_j)| < \varepsilon. \quad (3.2)$$

Množinu funkcí absolutně spojitých na $[a, b]$ značíme $\mathbb{AC}[a, b]$.

3.2 Cvičení. Dokažte tvrzení:

Každá lipschitzovská funkce na intervalu $[a, b]$ (viz cvičení 2.6 (iv)) je na tomto intervalu absolutně spojitá. Speciálně je-li derivace f' funkce f spojitá na $[a, b]$ ¹, pak f je absolutně spojitá na $[a, b]$.

3.3 Věta. *Je-li f absolutně spojitá na $[a, b]$ a $[c, d] \subset [a, b]$, pak je f absolutně spojitá i na $[c, d]$.*

Je-li $a < c < b$ a f je absolutně spojitá na $[a, c]$ i $[c, b]$, pak je f absolutně spojitá na $[a, b]$.

D ů k a z . První tvrzení je evidentní.

Předpokládejme, že $f \in \mathbb{AC}[a, c]$ a $f \in \mathbb{AC}[c, b]$ a buď dáno $\varepsilon > 0$. Můžeme zvolit $\delta > 0$ tak, aby platilo

$$\sum_{j=1}^m |f(\beta_j) - f(\alpha_j)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

¹tj. f' je spojitá na (a, b) , existují konečné limity $f'(a+) = \lim_{t \rightarrow a+} f'(t)$, $f'(b-) = \lim_{t \rightarrow b-} f'(t)$ a $f'(a) = f'(a+)$ a $f'(b) = f'(b-)$

pro každý systém intervalů $\{[\alpha_j, \beta_j] : j = 1, 2, \dots, m\}$ takový, že

$$a \leq \alpha_1 < \beta_1 \leq \alpha_2 < \beta_2 \dots < \beta_{m-1} \leq \alpha_m < \beta_m \leq c \quad \text{a} \quad \sum_{j=1}^m (\beta_j - \alpha_j) < \delta \quad (3.3)$$

a současně

$$\sum_{j=1}^p |f(\delta_j) - f(\gamma_j)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

pro každý systém intervalů $\{[\gamma_j, \delta_j] : j = 1, 2, \dots, p\}$ takový, že

$$c \leq \gamma_1 < \delta_1 \leq \gamma_2 < \delta_2 \dots < \delta_{p-1} \leq \gamma_p < \delta_p \leq b \quad \text{a} \quad \sum_{j=1}^p (\delta_j - \gamma_j) < \delta. \quad (3.4)$$

Nyní, mějme systém intervalů $\{[a_j, b_j] : j = 1, 2, \dots, n\}$ takový, že

$$a \leq a_1 < b_1 \leq a_2 < b_2 \dots < b_{n-1} \leq a_n < b_n \leq b \quad \text{a} \quad \sum_{j=1}^n (b_j - a_j) < \delta. \quad (3.5)$$

Smíme předpokládat, že c neleží v žádném z intervalů (a_j, b_j) , $j = 1, 2, \dots, n$. (Kdyby totiž bylo $c \in (a_k, b_k)$ pro nějaké $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, rozdělili bychom interval $[a_k, b_k]$ na sjednocení $[a_k, c] \cup [c, b_k]$ a nový systém by opět splňoval (3.5).) Můžeme tedy rozdělit daný systém $\{[a_j, b_j] : j = 1, 2, \dots, n\}$ na systémy

$$\{[\alpha_j, \beta_j] : j = 1, 2, \dots, m\} \quad \text{a} \quad \{[\gamma_j, \delta_j] : j = 1, 2, \dots, p\}$$

splňující (3.3) a (3.4). Součet $\sum_{j=1}^n |f(b_j) - f(a_j)|$ se tedy rozpadá na dva součty,

z nichž každý je menší než $\frac{\varepsilon}{2}$. Tudíž $\sum_{j=1}^n |f(b_j) - f(a_j)| < \varepsilon$. \square

3.4 Příklad. Podle cvičení 3.2 je každá funkce, která má spojitou derivaci na $[a, b]$, absolutně spojitá na $[a, b]$. Jednoduchým příkladem absolutně spojitě funkce na $[a, b]$, která nemá spojitou derivaci na (a, b) , je např. funkce

$$f(x) = \begin{cases} x - a & \text{pro } x \in [a, \frac{a+b}{2}], \\ b - x & \text{pro } x \in [\frac{a+b}{2}, b], \end{cases}$$

kteřá je zřejmě absolutně spojitá na intervalech $[a, \frac{a+b}{2}]$ a $[\frac{a+b}{2}, b]$, a tedy podle věty 3.3 také na $[a, b]$.

3.5 Poznámka. Jestliže $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathbb{K} \subset \mathbb{N}$ a jestliže pro každé $\varepsilon > 0$ existuje $\delta > 0$ takové, že

$$\sum_{j \in \mathbb{K}} |f(\beta_j) - f(\alpha_j)| < \varepsilon \quad (3.6)$$

platí pro každý (nikoliv nutně konečný) systém intervalů $\{[\alpha_j, \beta_j] \subset [a, b] : j \in \mathbb{K}\}$, splňující

$$(\alpha_j, \beta_j) \cap (\alpha_k, \beta_k) = \emptyset \quad \text{pro } j \neq k \text{ a } \sum_{j \in \mathbb{K}} (\beta_j - \alpha_j) < \delta, \quad (3.7)$$

pak je funkce $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ samozřejmě absolutně spojitá na $[a, b]$.

V následujícím lemmatu ukážeme, že platí i obrácená implikace. Poznamenejme ještě, že podle lemmatu 2.22 je každý systém intervalů splňující (3.7) nejvýše spočetný.

3.6 Lemma. *Je-li $f \in \mathbb{A}\mathbb{C}[a, b]$, pak pro každé $\varepsilon > 0$ existuje $\delta > 0$ takové, že (3.6) platí pro libovolný (případně nekonečný) systém podintervalů intervalu $[a, b]$*

$$\{[\alpha_j, \beta_j] \subset [a, b] : j \in \mathbb{K}\}$$

splňující (3.7).

D ů k a z. Předpokládejme, že $f \in \mathbb{A}\mathbb{C}[a, b]$. Zřejmě stačí dokázat tvrzení lemmatu pro případ, že $\mathbb{K} = \mathbb{N}$. Nechť je dáno $\varepsilon > 0$ a nechť $\delta > 0$ je určeno definicí 3.1 pro $\varepsilon/2$ na místě ε . Nechť $\{[\alpha_j, \beta_j] : j \in \mathbb{N}\}$ je systém podintervalů v $[a, b]$ splňující (3.7). Potom pro každé $m \in \mathbb{N}$ máme

$$\sum_{j=1}^m (\beta_j - \alpha_j) < \delta, \quad \text{a tedy} \quad \sum_{j=1}^m |f(\beta_j) - f(\alpha_j)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Odtud

$$\sum_{j=1}^{\infty} |f(\beta_j) - f(\alpha_j)| = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^m |f(\beta_j) - f(\alpha_j)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Tím je důkaz dokončen. □

3.7 Věta. *Každá funkce absolutně spojitá na intervalu $[a, b]$ má na tomto intervalu konečnou variaci.*

D ů k a z. Nechť $f \in \mathbb{A}\mathbb{C}[a, b]$. Zvolme $\delta > 0$ tak, aby platilo

$$\sum_{j=1}^m |f(b_j) - f(a_j)| < 1$$

pro každý konečný systém intervalů $\{[a_j, b_j] : j = 1, 2, \dots, m\}$ splňující (3.1). Dále zvolme dělení $\{x_0, x_1, \dots, x_k\}$ intervalu $[a, b]$ tak, aby platilo

$$0 < x_i - x_{i-1} < \delta \quad \text{pro každé } i = 1, 2, \dots, k.$$

Potom pro každé $i = 1, 2, \dots, k$ a každé dělení $\sigma^i = \{\alpha_0^i, \alpha_1^i, \dots, \alpha_{m_i}^i\}$ intervalu $[x_{i-1}, x_i]$ máme

$$\sum_{j=1}^{m_i} (\alpha_j^i - \alpha_{j-1}^i) = x_i - x_{i-1} < \delta,$$

a tudíž (podle věty 2.11)

$$\text{var}_a^b f = \sum_{i=1}^k \text{var}_{x_{i-1}}^{x_i} f = \sum_{i=1}^k \sup_{\sigma^i \in \mathcal{D}[x_{i-1}, x_i]} V(f, \sigma^i) \leq k < \infty. \quad \square$$

3.8 Věta. *Jestliže $f, g \in \mathbb{AC}[a, b]$, pak také*

$$|f|, f + g, fg, \max\{f, g\}, \min\{f, g\} \in \mathbb{AC}[a, b].$$

Je-li navíc $|f(x)| > 0$ na $[a, b]$, pak také $\frac{1}{f} \in \mathbb{AC}[a, b]$.

D ů k a z. Nechť $f, g \in \mathbb{AC}[a, b]$.

a) Pro libovolná $x, y \in [a, b]$ platí $|f(x)| \leq |f(x) - f(y)| + |f(y)|$. Tudíž

$$|f(x) - f(y)| \geq ||f(x)| - |f(y)||$$

a

$$\sum_{j=1}^m ||f(\beta_j)| - |f(\alpha_j)|| \leq \sum_{j=1}^m |f(\beta_j) - f(\alpha_j)|.$$

Odtud okamžitě plyne, že také $|f| \in \mathbb{AC}[a, b]$.

b) Druhé a třetí tvrzení, tj. $f + g \in \mathbb{AC}[a, b]$ a $fg \in \mathbb{AC}[a, b]$, plynou z nerovností

$$|(f(x) + g(x)) - (f(y) + g(y))| \leq |f(x) - f(y)| + |g(x) - g(y)|$$

a

$$|f(x)g(x) - f(y)g(y)| \leq \|f\| |g(x) - g(y)| + \|g\| |f(x) - f(y)|.$$

c) Protože pro libovolné $x \in [a, b]$ máme

$$\max\{f(x), g(x)\} = \frac{1}{2}(f(x) + g(x) + |f(x) - g(x)|)$$

a

$$\min\{f(x), g(x)\} = \frac{1}{2}(f(x) + g(x) - |f(x) - g(x)|),$$

platí v důsledku a) a b) také

$$\max\{f, g\} \in \mathbb{AC}[a, b] \quad \text{a} \quad \min\{f, g\} \in \mathbb{AC}[a, b].$$

d) Konečně, je-li navíc $|f(x)| > 0$ pro $x \in [a, b]$, pak existuje $\mu > 0$ takové, že $|f(x)| \geq \mu$ platí pro $x \in [a, b]$, a tudíž také

$$\left| \frac{1}{f(x)} - \frac{1}{f(y)} \right| \leq \frac{|f(x) - f(y)|}{\mu^2}.$$

Nyní už je snadné ukázat, že $\frac{1}{f} \in \mathbb{AC}[a, b]$. □

3.9 Věta. *Funkce $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ je absolutně spojitá na intervalu $[a, b]$ právě tehdy, když existují funkce f_1 a f_2 neklesající a absolutně spojitě na $[a, b]$ a takové, že $f = f_1 - f_2$ na intervalu $[a, b]$.*

D ů k a z . a) Nechť $f = f_1 - f_2$ na $[a, b]$, kde f_1, f_2 jsou absolutně spojitě a neklesající na $[a, b]$. Pak podle věty 3.8 je také f absolutně spojitá na $[a, b]$.

b) Nechť $f \in \mathbb{AC}[a, b]$. Podle vět 3.7 a 2.14 existují funkce f_1, f_2 neklesající na $[a, b]$ takové, že $f = f_1 - f_2$. Podle důkazu věty 2.14 můžeme položit

$$f_1(x) = \text{var}_a^x f \quad \text{a} \quad f_2(x) = f_1(x) - f(x) \quad \text{pro } x \in [a, b].$$

Vzhledem k větě 3.8 stačí dokázat, že f_1 je absolutně spojitá na $[a, b]$. Předpokládejme, že je dáno $\varepsilon > 0$, a nechť $\delta > 0$ je takové, že

$$\sum_{j=1}^m |f(b_j) - f(a_j)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

platí pro každý systém intervalů $\{[a_j, b_j] : j = 1, 2, \dots, m\}$ splňující (3.1).

Nechť $[\alpha_j, \beta_j]$, $j=1, 2, \dots, n$, je libovolný systém intervalů splňující (3.3), v němž $m = n$. Pro každé $j = 1, 2, \dots, n$ zvolme dělení $\sigma^j = \{\sigma_0^j, \sigma_1^j, \dots, \sigma_{n_j}^j\}$ intervalu $[\alpha_j, \beta_j]$. Potom

$$\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^{n_j} (\sigma_i^j - \sigma_{i-1}^j) = \sum_{j=1}^n [\beta_j - \alpha_j] < \delta,$$

a tudíž

$$\sum_{j=1}^n V(f, \sigma^j) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^{n_j} |f(\sigma_i^j) - f(\sigma_{i-1}^j)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Odtud už plyne, že

$$\sum_{j=1}^n (f_1(\beta_j) - f_1(\alpha_j)) = \sum_{j=1}^n \text{var}_{\alpha_j}^{\beta_j} f = \sum_{j=1}^n \left(\sup_{\sigma^j \in \mathcal{D}_{[\alpha_j, \beta_j]}} V(f, \sigma^j) \right) \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Tím je důkaz věty dokončen. \square

3.2 Absolutně spojité funkce a Lebesgueův integrál

Připomeňme, že podle věty 2.30 každá funkce s konečnou variací na intervalu $[a, b]$ má pro s.v. $x \in [a, b]$ konečnou derivaci $f'(x)$. Podle věty 3.7 má tedy stejnou vlastnost i každá funkce, která je absolutně spojitá na $[a, b]$. Ve zbývajících částech této kapitoly připomeneme některé další základní vlastnosti derivací funkcí absolutně spojitých a souvislost mezi absolutní spojitostí a neurčitým Lebesgueovým integrálem. V případech, kdy se důkazy nebo jejich části opírají o teorii míry v rozsahu přesahujícím rámec tohoto textu, důkazy, resp. jejich příslušné části neuvádíme a pouze odkazujeme na dostupnou literaturu. Integrálem se v tomto odstavci rozumí integrál Lebesgueův.

Podle následující věty jsou derivace funkcí s konečnou variací (a tedy tím spíše i funkcí absolutně spojitých) lebesgueovsky integrovatelné. Její důkaz podstatně využívá řady poznatků teorie míry a Lebesgueovy integrace, které se nevejdou do tohoto textu. Pro úplný důkaz tedy odkazujeme na příslušnou literaturu (viz např. [15, věta 91], [16, věta VI.4.1], resp. [33, Theorem 22.7]).

3.10 Věta. *Má-li funkce $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ konečnou variaci na $[a, b]$, pak je její derivace f' lebesgueovsky integrovatelná na $[a, b]$.*

Je-li navíc f neklesající na $[a, b]$, pak platí nerovnost

$$0 \leq \int_a^b f'(x) \, dx \leq f(b) - f(a). \quad (3.8)$$

Nyní ukážeme, že neurčitý integrál integrovatelné funkce je absolutně spojitý.

3.11 Věta. *Jestliže $g \in \mathbb{L}^1[a, b]$ a $f(x) = \int_a^x g(t) \, dt$ pro $x \in [a, b]$, pak je funkce f absolutně spojitá na intervalu $[a, b]$.*

D ů k a z. Nechť $g \in \mathbb{L}^1[a, b]$. Buď dáno $\varepsilon > 0$. Potom existuje $\delta > 0$ takové, že

$$\sum_{j=1}^m \int_{a_j}^{b_j} |g(x)| \, dx < \varepsilon$$

platí pro každý systém intervalů $\{[a_j, b_j] \subset [a, b] : j = 1, 2, \dots, m\}$ splňující (3.1) (viz např. [16, věta V.5.5] nebo [15, věta 51] – tato vlastnost se obvykle nazývá absolutní spojitost Lebesgueova integrálu).

Máme tedy

$$\sum_{j=1}^m |f(b_j) - f(a_j)| = \sum_{j=1}^m \left| \int_{a_j}^{b_j} g(t) \, dt \right| \leq \sum_{j=1}^m \int_{a_j}^{b_j} |g(t)| \, dt < \varepsilon.$$

To znamená, že $f \in \mathbb{AC}[a, b]$. □

3.12 Cvičení. Dokažte, že funkce $f(x) = \sqrt{|x|}$ je absolutně spojitá na intervalu $[-1, 1]$, přičemž f není lipschitzovská na $[-1, 1]$. (Návod: f je na $[-1, 1]$ neurčitým Lebesgueovým integrálem lebesgueovsky integrovatelné funkce a současně $f'(0-) = -\infty$ a $f'(0+) = \infty$.)

Další tvrzení se týká derivování neurčitých integrálů integrovatelných funkcí.

3.13 Věta. Jestliže $g \in \mathbb{L}^1[a, b]$ a

$$f(x) = \int_a^x g(t) \, dt \quad \text{pro } x \in [a, b],$$

potom $f'(x) = g(x)$ pro s.v. $x \in [a, b]$.

Důkaz se opírá o řadu výsledků teorie míry, které nejsou do tohoto textu zařazeny. Odkazujeme tedy čtenáře na důkazy např. v [16, věta VI.3.1] nebo [33, Theorem 23.4]. □

Nechť je dána funkce $g \in \mathbb{L}^1[a, b]$. Podle vět 3.11 a 3.13 je její neurčitý Lebesgueův integrál f absolutně spojitý na $[a, b]$ a platí $f' = g$ s.v. na $[a, b]$. Chceme ukázat, že f je absolutně spojitá na $[a, b]$ tehdy a jen tehdy, když f je neurčitým integrálem nějaké lebesgueovsky integrovatelné funkce. Pro důkaz takového tvrzení je klíčové následující tvrzení známé jako Rieszovo lemma.

3.14 Lemma (RIESZ). Nechť $f \in \mathbb{C}[a, b]$ a

$$E = \{x \in (a, b) : \exists \xi \in (x, b) \text{ takové, že } f(\xi) > f(x)\}.$$

Potom je množina E otevřená a je sjednocením nejvýše spočetného systému po dvou disjunktních otevřených intervalů (a_k, b_k) , přičemž pro každý z nich platí $f(a_k) \leq f(b_k)$.

Důkaz je založen mj. na známém faktu, že každá neprázdná otevřená množina je sjednocením nejvýše spočetného systému po dvou disjunktních otevřených intervalů (viz např. [14, věta 69]). Podrobný důkaz Rieszova lemmatu lze nalézt např.

v monografii [16] v odstavci VI.1.2 věnovaném důkazu Lebesgueovy věty o derivaci funkce s konečnou variací (naše věta 2.30). \square

3.15 Poznámka. Zobecnění Rieszova lemmatu na případ, kdy funkce f může být jen regulovaná, bylo dokázáno v [46, lemma XIII.3.5].

3.16 Lemma. *Jestliže $f \in \mathbb{A}\mathbb{C}[a, b]$ je neklesající na $[a, b]$ a $f'(x) = 0$ pro s.v. $x \in [a, b]$, pak f je konstantní na $[a, b]$.*

Důkaz. Vzhledem ke své monotónnosti funkce f zobrazuje interval $[a, b]$ na interval $[f(a), f(b)]$. Dokážeme, že $f(a) = f(b)$.

Nechť je dáno $\varepsilon > 0$ a nechť $\delta > 0$ přísluší k tomuto ε podle lemmatu 3.6.

Označme Z množinu všech $x \in [a, b]$, pro které platí $f'(x) = 0$. Podle předpokladu má její doplněk $[a, b] \setminus Z$ nulovou míru ($\mu([a, b] \setminus Z) = 0$). To znamená, že existuje konečný nebo spočetný systém $\{(\sigma_j, \beta_j) : j \in \mathbb{K}\}$ splňující (3.7) a

$$[a, b] \setminus Z \subset \bigcup_{j \in \mathbb{K}} (\sigma_j, \beta_j).$$

Obraz $f([a, b] \setminus Z)$ množiny $[a, b] \setminus Z$ je tedy obsažen ve sjednocení otevřených intervalů $\{(f(\sigma_j), f(\beta_j)) : j \in \mathbb{K}\}$. Protože podle lemmatu 3.6 platí (3.6), plyne odtud, že množina $f([a, b] \setminus Z)$ má nulovou míru, tj.

$$\mu(f([a, b] \setminus Z)) = 0. \quad (3.9)$$

Nyní, nechť $x \in Z$. Potom je $f'(x) = 0$. Pro dané ε tedy existuje $\Delta > 0$ takové, že

$$\frac{f(t) - f(x)}{t - x} < \varepsilon \quad \text{pro každé } t \text{ takové, že } 0 < |t - x| < \Delta.$$

Odtud plyne, že

$$\varepsilon x - f(x) < \varepsilon t - f(t) \quad \text{platí pro každé } t \in (x, x + \Delta).$$

Podle Rieszova lemmatu 3.14, které použijeme na funkci $\varepsilon x - f(x)$ na místě $f(x)$, je tedy množina Z obsažena ve sjednocení konečného nebo spočetného systému disjunktních intervalů $\{(a_k, b_k) \subset [a, b] : k \in \mathbb{K}\}$, přičemž platí

$$\varepsilon a_k - f(a_k) \leq \varepsilon b_k - f(b_k) \quad \text{pro každé } k \in \mathbb{K}$$

neboli

$$f(b_k) - f(a_k) \leq \varepsilon (b_k - a_k) \quad \text{pro každé } k \in \mathbb{K},$$

a tudíž

$$\sum_{k \in \mathbb{K}} [f(b_k) - f(a_k)] \leq \varepsilon \sum_{k \in \mathbb{K}} [b_k - a_k] \leq \varepsilon (b - a).$$

Odtud už vidíme, že množina $f(Z)$ má také nulovou míru, tj.

$$\mu(f(Z)) = 0. \quad (3.10)$$

Podle (3.9) a (3.10) má interval $[f(a), f(b)] = f(Z) \cup (f([a, b] \setminus Z))$ nulovou délku, tj. (vzhledem k monotónnosti funkce f) máme $f(a) = f(x) = f(b)$ pro každé $x \in (a, b)$. \square

3.17 Věta. Funkce $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ je absolutně spojitá na $[a, b]$ právě tehdy, když

$$f(x) - f(a) = \int_a^x g(t) dt \quad \text{pro } x \in [a, b] \quad (3.11)$$

pro nějakou funkci $g \in \mathbb{L}^1[a, b]$. Potom je $f' = g$ s.v. na $[a, b]$.

Důkaz. a) Nechť $g \in \mathbb{L}^1[a, b]$ a

$$f(x) = f(a) + \int_a^x g(t) dt \quad \text{pro } x \in [a, b].$$

Potom podle věty 3.11 je f absolutně spojitá na $[a, b]$ a podle věty 3.13 je $f' = g$ s.v. na $[a, b]$.

b) Předpokládejme zprvu, že funkce $f \in \mathbb{AC}[a, b]$ je neklesající na $[a, b]$. Podle vět 3.7 a 3.10 je $f' \in \mathbb{L}^1[a, b]$. Položme

$$h(x) = \int_a^x f'(t) dt \quad \text{a} \quad g(x) = f(x) - h(x) \quad \text{pro } x \in [a, b].$$

Ukážeme, že také funkce g je neklesající na $[a, b]$. Vskutku, podle věty 3.10 pro libovolné body $x, y \in [a, b]$ takové, že $x \leq y$, máme

$$\begin{aligned} g(y) - g(x) &= (f(y) - h(y)) - (f(x) - h(x)) \\ &= (f(y) - f(x)) - \int_x^y f'(t) dt \geq 0. \end{aligned}$$

Dále podle věty 3.11 je funkce h absolutně spojitá na $[a, b]$ a podle věty 3.13 je $h' = f'$ s.v. na $[a, b]$. To znamená, že $g' = (f - h)' = 0$ s.v. na $[a, b]$. Podle lemmatu 3.16 je proto funkce g konstantní na $[a, b]$. Máme tedy

$$g(x) = f(x) - h(x) = f(a) - h(a) = f(a) \quad \text{pro } x \in [a, b]$$

neboli

$$f(x) = f(a) + h(x) = f(a) + \int_a^x f(t)' dt \quad \text{pro } x \in [a, b],$$

a tudíž (3.11) platí pro každou funkci $f \in \mathbb{A}\mathbb{C}[a, b]$, která je neklesající na $[a, b]$.

V obecném případě $f \in \mathbb{A}\mathbb{C}[a, b]$ existují podle věty 3.9 funkce f_1, f_2 absolutně spojité na $[a, b]$, neklesající na $[a, b]$ a takové, že $f = f_1 - f_2$ na $[a, b]$. Máme tedy

$$\begin{aligned} f(x) &= f_1(x) - f_2(x) = \left(f_1(a) + \int_a^x f_1'(t) dt \right) - \left(f_2(a) + \int_a^x f_2'(t) dt \right) \\ &= f(a) + \int_a^x f'(t) dt \quad \text{pro } x \in [a, b]. \end{aligned}$$

Důkaz je dokončen. □

3.18 Cvičení. (i) Dokažte následující tvrzení:

Jestliže $f \in \mathbb{A}\mathbb{C}[a, b]$, pak je $f' = 0$ s.v. na $[a, b]$ tehdy a jen tehdy, když je konstantní na $[a, b]$. (Srovnejte s poznámkou 2.31.)

(ii) Je známo, že je-li f absolutně spojitá na $[a, b]$ a $v(x) = \text{var}_a^x f$, pak platí $v' = |f'|$ s.v. na $[a, b]$ (viz [15, Věta 118]). Na základě tohoto faktu dokažte, že $\text{var}_a^b f = \int_a^b |f'(x)| dx$ pro každou funkci f absolutně spojitou na $[a, b]$.

3.3 Lebesgueův rozklad funkcí s konečnou variací

Víme již (viz větu 2.39 a poznámku 2.40), že každou funkci s konečnou variací na $[a, b]$ můžeme rozložit na součet funkce spojité a funkce skokové resp. na rozdíl dvou funkcí neklesajících na $[a, b]$ (viz větu 2.14). Další možnost rozkladu funkcí s konečnou variací nabízí následující věta.

3.19 Věta (LEBESGUEŮV ROZKLAD FUNKCE S KONEČNOU VARIACÍ). *Pro každou funkci $f \in \mathbb{B}\mathbb{V}[a, b]$ existují absolutně spojitá funkce f^{AC} , singulární spojitá funkce f^{SC} a skoková funkce f^{B} takové, že*

$$f = f^{\text{AC}} + f^{\text{SC}} + f^{\text{B}} \quad \text{na } [a, b].$$

Jestliže $f = f_1 + f_2 + f_3$, kde funkce f_1 je absolutně spojitá na $[a, b]$, funkce f_2 je singulární a spojitá na $[a, b]$ a funkce f_3 je skoková funkce na $[a, b]$, pak jsou funkce $f^{\text{AC}} - f_1$, $f^{\text{SC}} - f_2$ a $f^{\text{B}} - f_3$ konstantní na $[a, b]$.

D ů k a z . a) Podle věty 2.39 existuje skoková funkce f^B taková, že funkce $f^C = f - f^B$ je spojitá na $[a, b]$, a vzhledem k větě 3.10 je $f' \in \mathbb{L}^1[a, b]$. Položme

$$f^{AC}(x) = \int_a^x f'(t) dt \quad \text{a} \quad f^{SC}(x) = f^C(x) - f^{AC}(x) \quad \text{pro } x \in [a, b].$$

Podle věty 2.37 je $(f^B)' = 0$ s.v. na $[a, b]$ a podle věty 3.13 máme $(f^{AC})' = f'$ s.v. na $[a, b]$. To znamená, že

$$(f^{SC})' = f' - (f^{AC})' - (f^B)' = 0 \quad \text{s.v. na } [a, b].$$

b) Nechť $f = f_1 + f_2 + f_3$, kde $f_1 \in \mathbb{A}C[a, b]$, f_2 je singulární a spojitá na $[a, b]$ a $f_3 \in \mathbb{B}[a, b]$. Podle věty 2.39 jsou rozdíly $(f^{AC} + f^{SC}) - (f_1 + f_2)$ a $f^B - f_3$ konstantní na $[a, b]$. Protože $f^{AC} + f^{SC} + f^B = f_1 + f_2 + f_3$, znamená to, že existuje $c \in \mathbb{R}$ tak, že $(f^{AC} + f^{SC}) - (f_1 + f_2) = f_3 - f^B = c$. Tudíž

$$(f^{AC} - f_1) = c - (f^{SC} - f_2) \quad \text{a} \quad (f^{AC} - f_1)' = 0 \quad \text{s.v. na } [a, b].$$

Protože obě funkce f^{AC} i f_1 jsou absolutně spojitě na intervalu $[a, b]$, plyne odtud podle věty 3.17 (viz též cvičení 3.21), že také rozdíl $f^{AC} - f_1$ je konstantní na $[a, b]$. Tím jsme dokončili důkaz. \square

3.20 Definice. Jestliže $f \in \mathbb{B}V[a, b]$, pak funkce f^{AC} , resp. f^{SC} , resp. f^B z věty 3.19 nazýváme *absolutně spojitá část*, resp. *spojitá singulární část*, resp. *skoková část* funkce f .

3.21 Cvičení. Dokažte následující tvrzení:

Pro každou funkci $f \in \mathbb{B}V[a, b]$ a každé $x \in [a, b]$ platí

$$f^{AC}(x) - f^{AC}(a) = \int_a^x f'(t) dt.$$

Kapitolu uzavřeme ještě jedním doplňkem k větě 3.19.

3.22 Věta. *Je-li $f \in \mathbb{B}V[a, b]$ neklesající na $[a, b]$, pak jsou neklesající na $[a, b]$ i funkce f^{AC} , f^{SC} , a f^B z věty 3.19.*

D ů k a z . Nechť $f \in \mathbb{B}V[a, b]$ je neklesající na $[a, b]$ a funkce f^{AC} , f^{SC} , f^B jsou přiřazeny funkci f podle věty 3.19. Dále nechť $\{w_k\}$ je množina bodů nespojitosti funkce f a x, y je libovolná dvojice bodů z $[a, b]$ taková, že $x \leq y$.

Protože f je neklesající na $[a, b]$, máme

$$\Delta^+ f(t) \geq 0 \quad \text{a} \quad \Delta^- f(s) \geq 0 \quad \text{pro } t \in [a, b), \quad s \in (a, b],$$

a proto

$$f^B(y) - f^B(x) = \sum_{x < w_k \leq y} \Delta^- f(w_k) + \sum_{x \leq w_k < y} \Delta^+ f(w_k) \geq 0.$$

Skoková část f^{B} funkce f je tedy neklesající na $[a, b]$.

Označme dále symbolem g spojitou část funkce f , tj. $g = f - f^{\text{B}}$. Podle důsledku 2.27 máme

$$f^{\text{B}}(y) - f^{\text{B}}(x) \leq \text{var}_x^y f = f(y) - f(x),$$

a tudíž

$$g(y) - g(x) = (f(y) - f(x)) - (f^{\text{B}}(y) - f^{\text{B}}(x)) \geq 0.$$

Spojité část funkce f je tedy neklesající na $[a, b]$.

Pro s.v. $t \in [a, b]$ je

$$f'(t) = \lim_{s \rightarrow t} \frac{f(s) - f(t)}{s - t} \in \mathbb{R}.$$

Protože je f neklesající na $[a, b]$, platí $f'(t) \geq 0$ pro s.v. $t \in [a, b]$. Podle důkazu věty 3.19 tedy dostaneme

$$f^{\text{AC}}(y) - f^{\text{AC}}(x) = \int_x^y f'(t) \, dt \geq 0, \text{ jakmile } x, y \in [a, b] \text{ a } x \leq y.$$

To znamená, že f^{AC} je neklesající na $[a, b]$.

Podle věty 2.37 je $(f^{\text{B}})' = 0$ s.v. na $[a, b]$, a tudíž

$$g' = f' - (f^{\text{B}})' = f' \quad \text{s.v. na } [a, b].$$

Odtud použitím (3.8) a důkazu věty 3.19 odvodíme, že platí

$$g(y) - g(x) \geq \int_x^y g'(t) \, dt = \int_x^y f'(t) \, dt = f^{\text{AC}}(y) - f^{\text{AC}}(x)$$

neboli

$$\begin{aligned} f^{\text{SC}}(y) - f^{\text{SC}}(x) &= (g(y) - f^{\text{AC}}(y)) - (g(x) - f^{\text{AC}}(x)) \\ &= (g(y) - g(x)) - (f^{\text{AC}}(y) - f^{\text{AC}}(x)) \geq 0. \end{aligned}$$

Spojité singulární část f^{SC} funkce f je tedy také neklesající na $[a, b]$. Tím je důkaz dokončen. \square

Další podrobnosti o funkcích absolutně spojitých lze nalézt v monografiích V. Jarníka *Diferenciální počet II* [14, v.9], *Integrální počet II* [15, v.5], A. N. Kolmogorova a S. V. Fomina *Základy teorie funkcí a funkcionální analýzy* [16, Sec. 33.2] a Š. Schwabika *Integrace v \mathbb{R} (Kurzweilova teorie)* [46, XIII.4] a ve skriptech [33] J. Lukeše a J. Malého *Measure and Integral*.

Regulované funkce

4.1 Definice. Funkce $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ se nazývá *regulovaná* na $[a, b]$, jestliže pro každé $t \in (a, b)$ a každé $s \in [a, b)$ existují konečné limity

$$f(t-) = \lim_{\tau \rightarrow t-} f(\tau) \text{ a } f(s+) = \lim_{\tau \rightarrow s+} f(\tau),$$

tj. má-li funkce f na intervalu $[a, b]$ nespojitosti nejvýše 1. druhu. Množinu funkcí regulovaných na $[a, b]$ značíme $\mathbb{G}[a, b]$.

4.2 Poznámka. Zřejmě platí $\mathbb{BV}[a, b] \cup \mathbb{C}[a, b] \subset \mathbb{G}[a, b]$, $\mathbb{G}[a, b] \setminus \mathbb{C}[a, b] \neq \emptyset$ a $\mathbb{G}[a, b] \setminus \mathbb{BV}[a, b] \neq \emptyset$.

Následující tvrzení plyne okamžitě z lemmatu 2.22.

4.3 Věta. Každá funkce regulovaná na $[a, b]$ má na $[a, b]$ nejvýše spočetně mnoho bodů nespojitosti. \square

4.4 Věta. Jestliže posloupnost $\{f_n\}$ regulovaných funkcí konverguje stejnoměrně na intervalu $[a, b]$ k funkci f , potom $f \in \mathbb{G}[a, b]$.

D ů k a z. Nechť $x \in [a, b)$ a nechť $\{x_k\} \subset (x, b)$ je libovolná posloupnost taková, že $x_k > x$ pro všechna $k \in \mathbb{N}$ a $x_k \rightarrow x$ pro $k \rightarrow \infty$. Nechť je dáno libovolné $\varepsilon > 0$. Zvolme $n_0 \in \mathbb{N}$ a $k_0 \in \mathbb{N}$ tak, aby platilo

$$\|f - f_{n_0}\| < \frac{\varepsilon}{3} \text{ a } |f_{n_0}(x_k) - f_{n_0}(x_\ell)| < \frac{\varepsilon}{3} \text{ pro všechna } k, \ell \geq k_0.$$

Potom budeme mít pro všechna $k, \ell \geq k_0$

$$\begin{aligned} & |f(x_k) - f(x_\ell)| \\ & \leq |f(x_k) - f_{n_0}(x_k)| + |f_{n_0}(x_k) - f_{n_0}(x_\ell)| + |f_{n_0}(x_\ell) - f(x_\ell)| < \varepsilon, \end{aligned}$$

tj. existuje konečná limita $f(x+) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k)$. Podobně bychom ukázali, že pro každé $x \in (a, b]$ existuje konečná limita $f(x-)$. \square

Připomeňme si nyní několik pojmů z matematické analýzy.

4.5 Definice. Nechť $\mathbb{K} \subset \mathbb{N}$. Systém $\mathcal{J} = \{J_k : k \in \mathbb{K}\}$ podmnožin J_k intervalu $[a, b]$ se nazývá *pokrytí intervalu* $[a, b]$, jestliže $[a, b] = \bigcup_{k \in \mathbb{K}} J_k$. Řekneme, že

systém \mathcal{J} je *otevřené pokrytí* intervalu $[a, b]$, jestliže jsou všechny jeho prvky otevřené množiny v $[a, b]$. (Intervaly typu $[a, c)$ a $(d, b]$, kde $c \in (a, b)$ a $d \in [a, b)$ jsou otevřené v $[a, b]$.) Jestliže nějaká část \mathcal{M} pokrytí \mathcal{J} intervalu $[a, b]$ je sama také jeho pokrytím, říkáme, že \mathcal{M} je *podpokrytím* pokrytí \mathcal{J} .

Fundamentální význam v matematice má následující tvrzení. Jeho důkaz lze nalézt např. v [14, věta 70]. (Připomeňme ovšem, že interval $[a, b]$ předpokládáme stále ohraničený.)

4.6 Věta (HEINOVA-BORELOVA VĚTA). *Z libovolného otevřeného pokrytí intervalu $[a, b]$ lze vybrat jeho konečné podpokrytí.*

4.7 Definice. Pro funkci $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, interval $J \subset [a, b]$ a dělení $\sigma \in \mathcal{D}[a, b]$ definujeme

$$\omega_J(f) = \sup_{x', x'' \in J} |f(x') - f(x'')| \text{ a } \omega_\sigma(f) = \max_{i=1,2,\dots,m} \omega_{(\sigma_{i-1}, \sigma_i)}(f).$$

Číslo $\omega_J(f)$ bývá nazýváno *modul oscilace funkce f na intervalu J* .

Stěžejním tvrzením této kapitoly je následující věta.

4.8 Věta. *Následující tři tvrzení jsou ekvivalentní:*

- (i) $f \in \mathbb{G}[a, b]$.
- (ii) Existuje posloupnost $\{f_n\} \subset \mathbb{S}[a, b]$ (jednoduchých skokových funkcí), která konverguje stejnoměrně k f na $[a, b]$.
- (iii) Pro každé $\varepsilon > 0$ existuje dělení $\sigma \in \mathcal{D}[a, b]$ takové, že $\omega_\sigma(f) < \varepsilon$.

D ů k a z . a) Implikace (ii) \implies (i) je dokázána větou 4.4.

b) Předpokládejme, že platí (i), a nechť je dáno libovolné $\varepsilon > 0$. Potom pro každé $x \in [a, b]$ existuje $\delta(x) > 0$ takové, že platí

$$x - \delta(x) > a \text{ pro všechna } x \in (a, b), \quad x + \delta(x) < b \text{ pro všechna } x \in (a, b)$$

a

$$\left. \begin{aligned} \omega_{(a, a + \delta(a))}(f) < \varepsilon, \quad \omega_{(b - \delta(b), b)}(f) < \varepsilon, \\ \omega_{(x - \delta(x), x)}(f) < \varepsilon, \quad \omega_{(x, x + \delta(x))}(f) < \varepsilon \text{ pro všechna } x \in (a, b). \end{aligned} \right\} \quad (4.1)$$

Intervaly $[a, a + \delta(a)]$, $(x - \delta(x), x + \delta(x))$, $x \in (a, b)$, $(b - \delta(b), b]$ tvoří otevřené pokrytí intervalu $[a, b]$, ze kterého lze podle Heiny-Borelovy věty 4.6 vybrat pokrytí konečné, tj. konečný systém intervalů

$$[x_0, x_0 + \delta(x_0)], (x_i - \delta(x_i), x_i + \delta(x_i)), i = 1, 2, \dots, m-1, (x_m - \delta(x_m), x_m],$$

takový, že $a = x_0 < x_1 < \dots < x_m = b$ a

$$[x_0, x_0 + \delta(x_0)] \cup \bigcup_{i=1}^{m-1} (x_i - \delta(x_i), x_i + \delta(x_i)) \cup (x_m - \delta(x_m), x_m] = [a, b].$$

Zvolme σ_i , $i = 1, 2, \dots, m$, tak, aby platilo

$$\sigma_i \in (x_i - \delta(x_i), x_{i-1} + \delta(x_{i-1})) \cap (x_{i-1}, x_i) \text{ pro } i = 1, 2, \dots, m.$$

a označme $\sigma = \{x_0, \sigma_1, x_1, \dots, x_{m-1}, \sigma_m, x_m\}$. Podle (4.1) máme

$$\omega_{(x_i - \delta(x_i), x_i)}(f) < \varepsilon \text{ a } \omega_{(x_j, x_j + \delta(x_j))}(f) < \varepsilon$$

pro $i = 1, 2, \dots, m$ a $j = 0, 1, \dots, m-1$. Tudíž

$$\omega_{(x_0, \sigma_1)}(f) \leq \omega_{(x_0, x_0 + \delta(a))}(f) < \varepsilon, \quad \omega_{(\sigma_m, b)}(f) \leq \omega_{(x_m - \delta(x_m), x_m)}(f) < \varepsilon,$$

$$\omega_{(\sigma_i, x_i)}(f) \leq \omega_{(x_i - \delta(x_i), x_i)}(f) < \varepsilon, \quad \omega_{(x_i, \sigma_{i+1})}(f) \leq \omega_{(x_i, x_i + \delta(x_i))}(f) < \varepsilon$$

pro $i = 1, 2, \dots, m$, tj. $\omega_{\sigma}(f) < \varepsilon$.

c) Předpokládejme, že platí (iii). Nechť je dáno $\varepsilon > 0$ a nechť

$$\sigma = \{\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_m\} \in \mathcal{D}[a, b]$$

je dělení $[a, b]$ takové, že $\omega_{\sigma}(f) < \varepsilon$. Pro každé $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ zvolme libovolně $\xi_i \in (\sigma_{i-1}, \sigma_i)$ a definujme

$$g_{\varepsilon}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{pro } x \in \sigma, \\ f(\xi_i) & \text{pro } x \in (\sigma_{i-1}, \sigma_i). \end{cases}$$

Pro každé $x \in [a, b]$ máme $|f(x) - g_{\varepsilon}(x)| \leq \varepsilon$, a tudíž také $\|f - g_{\varepsilon}\| < \varepsilon$. Jestliže tedy pro každé $n \in \mathbb{N}$ definujeme $f_n = g_{1/n}$, bude $f_n \in \mathbb{S}[a, b]$ pro každé $n \in \mathbb{N}$ a $f_n \rightrightarrows f$ na $[a, b]$ pro $n \rightarrow \infty$. \square

4.9 Důsledek. Každá funkce regulovaná na $[a, b]$ je na $[a, b]$ ohraničená.

D ů k a z. Podle tvrzení (iii) z věty 4.8 existuje dělení $\sigma = \{\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_m\}$ intervalu $[a, b]$ takové, že

$$|f(x)| \leq \left| f\left(\frac{\sigma_{j-1} + \sigma_j}{2}\right) \right| + 1 \quad \text{pro } x \in (\sigma_{j-1}, \sigma_j), \quad j \in \{1, 2, \dots, m\}.$$

Odtud plyne, že $|f(x)| \leq M$ pro všechna $x \in [a, b]$, kde

$$M = \max \left\{ |f(a)|, |f(b)|, \left| f\left(\frac{\sigma_{j-1} + \sigma_j}{2}\right) \right| + 1, |f(\sigma_j)| : j = 1, 2, \dots, m \right\} < \infty. \quad \square$$

4.10 Důsledek. Pro každé $\varepsilon > 0$ existuje nejvýše konečně mnoho $x \in [a, b]$ takových, že platí

$$|\Delta^+ f(x)| > \varepsilon \quad \text{nebo} \quad |\Delta^- f(x)| > \varepsilon.$$

D ů k a z. Podle tvrzení (iii) z věty 4.8 ke každému $\varepsilon > 0$ můžeme najít dělení $\sigma = \{\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_m\}$ intervalu $[a, b]$ takové, že

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon \quad \text{pro } x, y \in (\sigma_{j-1}, \sigma_j), \quad j \in \{1, 2, \dots, m\}.$$

Speciálně $|\Delta^+ f(x)| = |f(x+) - f(x)| \leq \varepsilon$ a $|\Delta^- f(x)| = |f(x) - f(x-)| \leq \varepsilon$ pro všechna $x \in [a, b] \setminus \sigma$. Platí tedy tvrzení tohoto důsledku. \square

4.11 Věta. $\mathbb{G}[a, b]$ je Banachův prostor vzhledem k normě $\|f\|_{\mathbb{G}} = \|f\| = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$.

D ů k a z . Předpokládejme, že posloupnost $\{f_n\} \subset \mathbb{G}[a, b]$ je cauchyovská v prostoru $\mathbb{G}[a, b]$. Jako v částech a) a b) důkazu věty 2.20 můžeme dokázat, že existuje funkce $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ taková, že $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\| = 0$. Podle věty 4.4 je $f \in \mathbb{G}[a, b]$ a tím je věta dokázána. \square

4.12 Poznámky.

- (i) Podle definice 2.33 je $f \in \mathbb{S}[a, b]$ právě tehdy, když existuje dělení σ intervalu $[a, b]$ takové, že f je konstantní na každém podintervalu (σ_{j-1}, σ_j) . Každá funkce z $\mathbb{S}[a, b]$ je konečná lineární kombinace funkcí tvaru $\chi_{(\alpha, \beta)}$ a $\chi_{[\tau]}$, kde (α, β) může být libovolný podinterval v $[a, b]$ a τ může být libovolný bod z $[a, b]$. Platí ovšem $\chi_{(\alpha, \beta)} = \chi_{(\alpha, b]} - \chi_{[\beta, b]}$ pro libovolná $\alpha, \beta \in [a, b]$, $\alpha < \beta$ a $\chi_{[\tau]} = \chi_{[\tau, b]} - \chi_{(\tau, b]}$ pro každé $\tau \in [a, b]$.

Tudíž $f \in \mathbb{S}[a, b]$ tehdy a jen tehdy, když f je konečná lineární kombinace charakteristických funkcí intervalů $[\tau, b]$, $(\tau, b]$, $\tau \in [a, b]$ a charakteristické funkce jednobodového intervalu $[b]$, tj.

$$\mathbb{S}[a, b] = \text{Lin}\left(\chi_{[\tau, b]}, \chi_{(\tau, b]}, \tau \in [a, b), \chi_{[b]}\right),$$

kde $\text{Lin}(M)$ značí lineární obal množiny M . Podobně bychom ukázali, že je také

$$\mathbb{S}[a, b] = \text{Lin}\left(\chi_{[a, \tau]}, \chi_{[a, \tau)}, \tau \in (a, b], \chi_{[a]}\right).$$

- (ii) Množina $\mathbb{S}[a, b]$ je podle tvrzení (ii) věty 4.8 hustá v $\mathbb{G}[a, b]$, tj. $\overline{\mathbb{S}[a, b]} = \mathbb{G}[a, b]$, kde $\overline{\mathbb{S}[a, b]}$ značí uzávěr $\mathbb{S}[a, b]$ v $\mathbb{G}[a, b]$.

4.13 Cvičení. Nechť $h(x) = 1$, je-li $x = 1/k$ pro nějaké $k \in \mathbb{N}$ a $h(x) = 0$ pro ostatní $x \in [0, 1]$. Rozhodněte, zda je funkce h regulovaná na $[a, b]$.

4.14 Lemma. Nechť $\{f_n\} \subset \mathbb{G}[a, b]$ a $f_n \rightrightarrows f$ na $[a, b]$. Potom platí též

$$f_n(x-) \rightrightarrows f(x-) \text{ a } f_n(x+) \rightrightarrows f(x+) \text{ na } [a, b],$$

kde $f(a-) = f(a)$, $f(b+) = f(b)$ a $f_k(a-) = f_k(a)$, $f_k(b+) = f_k(b)$ pro $k \in \mathbb{N}$.

D ů k a z . Pro $n \in \mathbb{N}$ položme

$$\tilde{f}_n(x) = \begin{cases} f_n(x+), & \text{když } x \in [a, b), \\ f_n(b), & \text{když } x = b \end{cases}$$

a

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x+), & \text{když } x \in [a, b), \\ f(b), & \text{když } x = b. \end{cases}$$

Nechť je dáno $\varepsilon > 0$. Existuje $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ takové, že je $|f_n(t) - f(t)| < \varepsilon$ pro každé $n \geq n_\varepsilon$ a každé $t \in [a, b]$. Odtud ovšem limitním přechodem $t \rightarrow x+$ dostaneme,

že také pro každé $x \in [a, b)$ a každé $n \geq n_\varepsilon$ platí

$$|\tilde{f}_n(x) - \tilde{f}(x)| = \lim_{t \rightarrow x^+} |f_n(t) - f(t)| \leq \varepsilon,$$

tj.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|\tilde{f}_n - \tilde{f}\| = 0 \text{ neboli } f_n(x+) \rightrightarrows f(x+) \text{ na } [a, b].$$

Podobně bychom ukázali, že platí i $f_n(x-) \rightrightarrows f(x-)$ na $[a, b]$. \square

Ve zbývajících částech kapitoly uvedeme několik tvrzení, které budou později (zejména v kapitolách 6 a 7) užitečné. Nejprve shrneme důsledky lemmatu 4.14 pro některé důležité podmnožiny prostoru $\mathbb{G}[a, b]$.

4.15 Důsledky. Množiny

$$\left. \begin{aligned} \mathbb{G}_L[a, b] &= \{f \in \mathbb{G}[a, b] : f(x-) = f(x) \text{ pro } x \in (a, b)\}, \\ \tilde{\mathbb{G}}_L[a, b] &= \{f \in \mathbb{G}[a, b] : f(x-) = f(x) \text{ pro } x \in (a, b)\}, \\ \mathbb{G}_R[a, b] &= \{f \in \mathbb{G}[a, b] : f(x+) = f(x) \text{ pro } x \in (a, b)\}, \\ \tilde{\mathbb{G}}_R[a, b] &= \{f \in \mathbb{G}[a, b] : f(x+) = f(x) \text{ pro } x \in [a, b)\}, \\ \mathbb{G}_{reg}[a, b] &= \{f \in \mathbb{G}[a, b] : f(x-) + f(x+) = 2f(x) \text{ pro } x \in (a, b)\}, \\ \tilde{\mathbb{G}}_{reg}[a, b] &= \{f \in \mathbb{G}[a, b] : f(a+) = f(a), f(b-) = f(b) \\ &\quad f(x-) + f(x+) = 2f(x) \text{ pro } x \in (a, b)\} \end{aligned} \right\} \quad (4.2)$$

jsou uzavřené v $\mathbb{G}[a, b]$, a tudíž jsou to také Banachovy prostory vzhledem k operacím a normě indukovaným z $\mathbb{G}[a, b]$.

4.16 Poznámka. Jestliže regulovaná funkce f splňuje na intervalu (a, b) podmínku $f(x-) + f(x+) = 2f(x)$, říkáme, že f je *regulární* na (a, b) . O funkcích z prostoru $\tilde{\mathbb{G}}_{reg}[a, b]$ pak říkáme, že jsou regulární na uzavřeném intervalu $[a, b]$.

4.17 Lemma.

$$\begin{aligned} \overline{\mathbb{G}_L[a, b] \cap \mathbb{S}[a, b]} &= \mathbb{G}_L[a, b], & \overline{\tilde{\mathbb{G}}_L[a, b] \cap \mathbb{S}[a, b]} &= \tilde{\mathbb{G}}_L[a, b], \\ \overline{\mathbb{G}_R[a, b] \cap \mathbb{S}[a, b]} &= \mathbb{G}_R[a, b], & \overline{\tilde{\mathbb{G}}_R[a, b] \cap \mathbb{S}[a, b]} &= \tilde{\mathbb{G}}_R[a, b], \\ \overline{\mathbb{G}_{reg}[a, b] \cap \mathbb{S}[a, b]} &= \mathbb{G}_{reg}[a, b], & \overline{\tilde{\mathbb{G}}_{reg}[a, b] \cap \mathbb{S}[a, b]} &= \tilde{\mathbb{G}}_{reg}[a, b]. \end{aligned}$$

Důk a z. Dokážeme pouze první a poslední tvrzení. Zbývajících vztahy se dokážou analogicky.

a) Nechť $f \in \mathbb{G}_L[a, b]$ a $\varepsilon > 0$. Podle věty 4.8 (ii) existuje $\varphi \in \mathbb{S}[a, b]$ takové, že

$$|f(x) - \varphi(x)| \leq \|f - \varphi\| < \varepsilon \quad \text{pro } x \in [a, b]. \quad (4.3)$$

Dále pro každé $x \in (a, b)$ existuje $\delta(x) > 0$ takové, že $x - \delta(x) > a$ a

$$|f(x) - f(t)| = |f(x-) - f(t)| < \varepsilon \quad \text{pro } t \in (x - \delta(x), x).$$

Pro každé $x \in (a, b)$ a $t \in (x - \delta(x), x]$ tedy máme

$$|\varphi(x) - \varphi(t)| \leq |\varphi(x) - f(x)| + |f(x) - f(t)| + |f(t) - \varphi(t)| < 3\varepsilon,$$

tj.

$$|\varphi(x) - \varphi(x-)| \leq 3\varepsilon.$$

Položme

$$\tilde{\varphi}(x) = \begin{cases} \varphi(x) & \text{pro } x = a \text{ nebo } x = b, \\ \varphi(x-) & \text{pro } x \in (a, b). \end{cases}$$

Potom $\tilde{\varphi} \in \mathbb{G}_L[a, b] \cap \mathbb{S}[a, b]$,

$$|f(x) - \tilde{\varphi}(x)| = |f(x) - \varphi(x)| < \varepsilon, \quad \text{když } x = a \text{ nebo } x = b,$$

a

$$\begin{aligned} &|f(x) - \tilde{\varphi}(x)| \\ &\leq |f(x) - \varphi(x)| + |\varphi(x) - \varphi(x-)| < 4\varepsilon, \quad \text{když } x \in (a, b). \end{aligned}$$

Odtud už plyne, že množina $\mathbb{G}_L[a, b] \cap \mathbb{S}[a, b]$ je hustá v $\mathbb{G}_L[a, b]$.

b) Nechť $f \in \mathbb{G}_{\text{reg}}[a, b]$. Nechť je dáno $\varepsilon > 0$ a funkce $\varphi \in \mathbb{S}[a, b]$ je taková, že platí (4.3). Potom musí být také

$$\left. \begin{aligned} \text{a} \quad &|f(x-) - \varphi(x-)| \leq \varepsilon \quad \text{pro } x \in [a, b], \\ &|f(x+) - \varphi(x+)| \leq \varepsilon \quad \text{pro } x \in (a, b]. \end{aligned} \right\} \quad (4.4)$$

Položme

$$\tilde{\varphi}(x) = \begin{cases} \varphi(a), & \text{když } x = a, \\ \frac{1}{2}(\varphi(x+) + \varphi(x-)), & \text{když } x \in (a, b), \\ \varphi(b), & \text{když } x = b. \end{cases} \quad (4.5)$$

Potom $\tilde{\varphi} \in \mathbb{S}[a, b] \cap \mathbb{G}_{\text{reg}}[a, b]$. Dále vzhledem k (4.4) a (4.5),

$$\begin{aligned} |f(x) - \tilde{\varphi}(x)| &= \left| \frac{1}{2} [f(x+) + f(x-)] - \frac{1}{2} [\varphi(x+) + \varphi(x-)] \right| \\ &\leq \frac{1}{2} \left(|f(x+) - \varphi(x+)| + |f(x-) - \varphi(x-)| \right) \leq \varepsilon \end{aligned}$$

když $x \in (a, b)$. Konečně, podle (4.3) a (4.5) máme

$$|f(x) - \tilde{\varphi}(x)| = |f(x) - \varphi(x)| < \varepsilon, \quad \text{když } x = a \text{ nebo } x = b.$$

Odtud už plyne, že platí $\overline{\mathbb{G}_{\text{reg}}[a, b] \cap \mathbb{S}[a, b]} = \mathbb{G}_{\text{reg}}[a, b]$. □

4.18 Lemma.

$$\begin{aligned} \mathbb{G}_{\text{L}}[a, b] \cap \mathbb{S}[a, b] &= \text{Lin}\left(1, \chi_{(\tau, b]}, \tau \in [a, b), \chi_{[b]}\right), \\ \tilde{\mathbb{G}}_{\text{L}}[a, b] \cap \mathbb{S}[a, b] &= \text{Lin}\left(\chi_{[a, \tau]}, \tau \in [a, b]\right), \\ \mathbb{G}_{\text{R}}[a, b] \cap \mathbb{S}[a, b] &= \text{Lin}\left(1, \chi_{[a]}, \chi_{[a, \tau)}, \tau \in (a, b]\right), \\ \tilde{\mathbb{G}}_{\text{R}}[a, b] \cap \mathbb{S}[a, b] &= \text{Lin}\left(\chi_{[\tau, b]}, \tau \in [a, b]\right), \\ \mathbb{G}_{\text{reg}}[a, b] \cap \mathbb{S}[a, b] &= \text{Lin}\left(1, \chi_{(a, b)}, \frac{1}{2} \chi_{[\tau]} + \chi_{(\tau, b]}, \tau \in (a, b), \chi_{[b]}\right), \\ \tilde{\mathbb{G}}_{\text{reg}}[a, b] \cap \mathbb{S}[a, b] &= \text{Lin}\left(1, \frac{1}{2} \chi_{[\tau]} + \chi_{(\tau, b]}, \tau \in (a, b)\right). \end{aligned}$$

D ů k a z. První tvrzení je obsaženo v poznámce 4.12 (i). Dokážeme ještě např. předposlední z uvedených relací.

Nechť tedy $f \in \mathbb{S}[a, b] \cap \mathbb{G}_{\text{reg}}[a, b]$. Potom existují

$$m \in \mathbb{N}, \quad c_0, c_1, \dots, c_{m+1} \in \mathbb{R} \quad \text{a} \quad \sigma = \{\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_m\} \in \mathcal{D}[a, b]$$

takové, že

$$f(x) = \begin{cases} c_0, & \text{když } x = a, \\ c_j, & \text{když } x \in (\sigma_{j-1}, \sigma_j) \text{ pro nějaké } j = 1, 2, \dots, m, \\ \frac{c_j + c_{j+1}}{2}, & \text{když } x = \sigma_j \text{ pro nějaké } j = 1, 2, \dots, m-1, \\ c_{m+1}, & \text{když } x = b, \end{cases}$$

tj.

$$\left. \begin{aligned} f(x) &= c_0 \chi_{[a]}(x) + \sum_{j=1}^m c_j \chi_{(\sigma_{j-1}, \sigma_j)}(x) \\ &+ \frac{1}{2} \left(\sum_{j=1}^{m-1} (c_j + c_{j+1}) \chi_{[\sigma_j]}(x) \right) + c_{m+1} \chi_{[b]}(x) \text{ pro } x \in [a, b]. \end{aligned} \right\} \quad (4.6)$$

Pravou stranu vztahu (4.6) můžeme upravit takto

$$\begin{aligned}
 f &= c_0 \chi_{[a,b]} - c_0 \chi_{(a,b)} + \sum_{j=1}^m c_j \chi_{(\sigma_{j-1},b]} - \sum_{j=1}^{m-1} c_j \chi_{[\sigma_j,b]} - c_m \chi_{[b]} \\
 &\quad + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{m-1} c_j \chi_{[\sigma_j]} + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{m-1} c_{j+1} \chi_{[\sigma_j]} + c_{m+1} \chi_{[b]} \\
 &= c_0 \chi_{[a,b]} - c_0 \chi_{(a,b)} + \sum_{j=1}^m c_j \chi_{(\sigma_{j-1},b]} - \sum_{j=1}^{m-1} c_j (\chi_{(\sigma_j,b]} + \chi_{[\sigma_j]}) \\
 &\quad + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{m-1} c_j \chi_{[\sigma_j]} + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{m-1} c_{j+1} \chi_{[\sigma_j]} + (c_{m+1} - c_m) \chi_{[b]} \\
 &= c_0 \chi_{[a,b]} - c_0 \chi_{(a,b)} + \sum_{j=0}^{m-1} c_{j+1} \chi_{(\sigma_j,b]} - \sum_{j=1}^{m-1} c_j \chi_{(\sigma_j,b]} \\
 &\quad - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{m-1} c_j \chi_{[\sigma_j]} + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{m-1} c_{j+1} \chi_{[\sigma_j]} + (c_{m+1} - c_m) \chi_{[b]} \\
 &= c_0 \chi_{[a,b]} + (c_1 - c_0) \chi_{(a,b]} + \sum_{j=1}^{m-1} (c_{j+1} - c_j) \left(\chi_{(\sigma_j,b]} + \frac{1}{2} \chi_{[\sigma_j]} \right) \\
 &\quad + (c_{m+1} - c_m) \chi_{[b]} \\
 &= d_0 \chi_{[a,b]} + d_1 \chi_{(a,b]} + \sum_{j=2}^m d_j \left(\chi_{(\sigma_{j-1},b]} + \frac{1}{2} \chi_{[\sigma_{j-1}]} \right) + d_{m+1} \chi_{[b]},
 \end{aligned}$$

kde

$$d_0 = c_0, \quad d_j = c_j - c_{j-1} \text{ pro } j = 1, 2, \dots, m+1. \quad (4.7)$$

Máme tedy $f \in \text{Lin}\left(1, \chi_{(a,b]}, \frac{1}{2} \chi_{[\tau]} + \chi_{(\tau,b]}, \tau \in (a, b), \chi_{[b]}\right)$. Navíc vztahy (4.7) určují vzájemně jednoznačnou korespondenci mezi vektory $(c_0, c_1, \dots, c_m, c_{m+1})$ a $(d_0, d_1, \dots, d_m, d_{m+1})$. Tudíž

$$\mathbb{G}_{\text{reg}}[a, b] \cap \mathbb{S}[a, b] = \text{Lin}\left(1, \chi_{(a,b]}, \frac{1}{2} \chi_{[\tau]} + \chi_{(\tau,b]}, \tau \in (a, b), \chi_{[b]}\right). \quad \square$$

Další podrobnosti týkající se regulovaných funkcí lze najít zejména v monografii *Volterra Stieltjes-Integral Equations* [12, sec.3] Ch. Hönlga. Užitečné speciální dodatky (např. charakterizace prekompaktních množin v prostoru $\mathbb{G}[a, b]$, zobecnění Hellyovy věty o výběru) jsou obsaženy také v práci D. Fraňkové [6].

Riemannův-Stieltjesův integrál

Odpověď na některé úlohy zmíněné v úvodní kapitole dává integrál Riemannův-Stieltjesův, který je přirozeným zobecněním známého integrálu Riemannova.

5.1 Definice a základní vlastnosti

Připomeňme (viz Úmluvy a označení (iii)), že množinu $\sigma = \{\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_m\}$ bodů intervalu $[a, b]$ nazýváme *dělením intervalu* $[a, b]$, jestliže platí

$$a = \sigma_0 < \sigma_1 < \dots < \sigma_m = b.$$

Množinu všech dělení intervalu $[a, b]$ značíme $\mathcal{D}[a, b]$,

$$|\sigma| = \max_{j=1,2,\dots,\nu(\sigma)} (\sigma_j - \sigma_{j-1})$$

a $\nu(\sigma)$ je počet podintervalů generovaných dělením σ (zde $\nu(\sigma) = m$). Říkáme, že σ' je *zjemnění* σ , jestliže $\sigma' \supset \sigma$.

5.1 Definice. Dvojici $(\sigma, \xi) \in \mathcal{D}[a, b] \times \mathbb{R}^{\nu(\sigma)}$ nazveme *značeným dělením* intervalu $[a, b]$, jestliže platí

$$\sigma_{j-1} \leq \xi_j \leq \sigma_j \quad \text{pro všechna } j = 1, 2, \dots, \nu(\sigma).$$

$\mathcal{T}[a, b]$ je množina všech značených dělení intervalu $[a, b]$. Říkáme také, že ξ_j je *značka* podintervalu $[\sigma_{j-1}, \sigma_j]$ a ξ je *vektor značek*.

Pro dané dělení $\sigma \in \mathcal{D}[a, b]$ značíme symbolem $\tau(\sigma)$ množinu všech $\xi \in \mathbb{R}^{\nu(\sigma)}$ takových, že $(\sigma, \xi) \in \mathcal{T}[a, b]$.

Abychom zabránili záměně s elementy množin ρ, σ, \dots či vektorů ξ, η, \dots , budeme posloupnosti dělení, resp. značených dělení zapisovat jako např. $\{\sigma^n\}$, resp. (ρ^n, η^n) . Záměna s mocninami zde zajisté nehrozí.

5.2 Definice. Pro dané funkce $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ a značené dělení (σ, ξ) intervalu $[a, b]$ definujeme

$$S_{f\Delta g}(\sigma, \xi; [a, b]) := \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} f(\xi_j) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})].$$

Nebude-li hrozit nedorozumění, budeme psát krátce $S(\sigma, \xi; [a, b])$, resp. $S(\sigma, \xi)$ místo $S_{f\Delta g}(\sigma, \xi; [a, b])$.

5.3 Definice. Nechť $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

(i) Řekneme, že existuje *Riemannův-Stieltjesův* (δ) -integrál (krátce (δ) RS-integrál) funkce f vzhledem k funkci g

$$(\delta) \int_a^b f(x) d[g(x)] \quad (\text{značíme též } (\delta) \int_a^b f dg)$$

a má hodnotu $I \in \mathbb{R}$, jestliže

$$\left. \begin{aligned} &\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \\ &((\sigma, \xi) \in \mathcal{T}[a, b] \text{ a } |\sigma| < \delta) \implies |S(\sigma, \xi) - I| < \varepsilon. \end{aligned} \right\} \quad (5.1)$$

(ii) Řekneme, že existuje *Riemannův-Stieltjesův* (σ) -integrál (krátce (σ) RS-integrál) funkce f vzhledem k funkci g

$$(\sigma) \int_a^b f(x) d[g(x)] \quad (\text{značíme též } (\sigma) \int_a^b f dg)$$

a má hodnotu $I \in \mathbb{R}$, jestliže

$$\left. \begin{aligned} &\forall \varepsilon > 0 \exists \sigma_\varepsilon \in \mathcal{D}[a, b]: \\ &((\sigma, \xi) \in \mathcal{T}[a, b] \text{ a } \sigma \supset \sigma_\varepsilon) \implies |S(\sigma, \xi) - I| < \varepsilon. \end{aligned} \right\} \quad (5.2)$$

(iii) Jestliže $c \in [a, b]$ a funkce f, g jsou definovány v bodě c , klademe

$$(\delta) \int_c^c f dg = (\sigma) \int_c^c f dg = 0.$$

Existuje-li integrál $(\delta) \int_a^b f dg$, pak definujeme $(\delta) \int_b^a f dg = -(\delta) \int_a^b f dg$ a existuje-li integrál $(\sigma) \int_a^b f dg$, definujeme $(\sigma) \int_b^a f dg = -(\sigma) \int_a^b f dg$.

5.4 Poznámka. Pojem (δ) RS-integrálu odpovídá původní Stieltjesově definici, zatímco (σ) RS-integrál bývá někdy nazýván též *Mooreův-Pollardův* integrál.

Klasický Riemannův integrál je speciálním případem (δ) RS-integrálu, pokud $g(x) \equiv x$ pro $x \in [a, b]$.

Vyskytne-li se v některých tvrzeních pojem RS-integrál bez rozlišení, zda se jedná o (δ) RS-integrál či o (σ) RS-integrál, bude to znamenat, že dané tvrzení platí pro oba pojmy. V takových a dalších případech, kdy nehrozí nedorozumění, také nepřipojujeme symboly (δ) či (σ) k symbolům integrálů. Funkce f v integrálu $\int_a^b f dg$ se nazývá *integrand*, zatímco funkce g se nazývá *integrátor*.

5.5 Cvičení. Dokažte, že pro oba typy RS-integrálu platí:

(i) je-li funkce g konstantní na $[a, b]$, pak $\int_a^b f dg = 0$ pro libovolnou funkci f definovanou na $[a, b]$,

(ii) je-li funkce f konstantní na $[a, b]$, pak $\int_a^b f \, dg = f(a) [g(b) - g(a)]$ pro libovolnou funkci g definovanou na $[a, b]$.

Z definice 5.3 také snadno usoudíme, že (δ) RS-integrál je speciálním případem (σ) RS-integrálu.

5.6 Věta. Je-li $(\delta) \int_a^b f \, dg = I \in \mathbb{R}$, pak platí také $(\sigma) \int_a^b f \, dg = I$.

Důkaz. Pro každá dvě dělení $\sigma', \sigma'' \in \mathcal{D}[a, b]$ taková, že σ'' je zjemnění σ' , platí $|\sigma''| \leq |\sigma'|$. Věta je tedy přímým důsledkem definice 5.3. \square

5.7 Poznámka. Budiž dáno libovolné $\delta_0 > 0$. Potom v definici 5.1 (i) můžeme podmínku (5.1) nahradit následující trochu zeslabenou podmínkou

$$\left. \begin{aligned} \forall \varepsilon > 0 \exists \delta \in (0, \delta_0) : \\ \left((\sigma, \xi) \in \mathcal{S}[a, b] \text{ a } |\sigma| < \delta \right) \implies |S(\sigma, \xi) - I| < \varepsilon. \end{aligned} \right\} \quad (5.1')$$

Podobně, je-li dáno $\sigma_0 \in \mathcal{D}[a, b]$, můžeme v definici 5.3 (ii) podmínku (5.2) nahradit podmínkou

$$\left. \begin{aligned} \forall \varepsilon > 0 \exists \sigma_\varepsilon \in \mathcal{D}[a, b] : \\ \sigma_\varepsilon \supset \sigma_0 \text{ a } \left((\sigma, \xi) \in \mathcal{S}[a, b] \text{ a } \sigma \supset \sigma_\varepsilon \right) \implies |S(\sigma, \xi) - I| < \varepsilon. \end{aligned} \right\} \quad (5.2')$$

5.8 Cvičení. Rozmyslete si podrobně, proč platí tvrzení uvedená v poznámce 5.7.

5.9 Příklad. Nechť $a = -1$, $b = 1$ a

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{když } x \leq 0, \\ 1, & \text{když } x > 0 \end{cases} \quad \text{a} \quad g(x) = \begin{cases} 1, & \text{když } x < 0, \\ 0, & \text{když } x \geq 0. \end{cases}$$

Položme $\sigma_0 = \{-1, 0, 1\}$. Potom pro každé dělení $\sigma \in \mathcal{D}[-1, 1]$, které je zjemněním σ_0 (a tedy $0 \in \sigma$), a každé $\xi \in \tau(\sigma)$ máme

$$S(\sigma, \xi) = f(\xi_k) [g(0) - g(\sigma_{k-1})] + f(\xi_{k+1}) [g(\sigma_{k+1}) - g(0)] = 0,$$

kde $0 = \sigma_k$, $\xi_k \in [\sigma_{k-1}, 0]$, $\xi_{k+1} \in [0, \sigma_{k+1}]$ a tedy

$$f(\xi_k) = 0 \quad \text{a} \quad g(\sigma_{k+1}) - g(0) = 0.$$

Vzhledem ke druhé části poznámky 5.7 vidíme, že $(\sigma) \int_{-1}^1 f \, dg = 0$.

Na druhou stranu, pro každé značené dělení (σ, ξ) intervalu $[-1, 1]$ takové, že $0 \notin \sigma$, tj. $\sigma_{k-1} < 0 < \sigma_k$ pro nějaké $k \in \mathbb{N}$, platí

$$S(\sigma, \xi) = f(\xi_k) [g(\sigma_k) - g(\sigma_{k-1})] = -f(\xi_k) = - \begin{cases} 0, & \text{když } \xi_k \leq 0, \\ 1, & \text{když } \xi_k > 0. \end{cases}$$

Odtud je zřejmé, že $(\delta) \int_{-1}^1 f \, dg$ nemůže existovat.

Následující dvě lemmata platí pro oba typy RS-integrálů a jsou přímými důsledky definice 5.3.

5.10 Lemma. (i) *Jestliže existuje integrál $\int_a^b f \, dg$, pak platí*

$$\left| \int_a^b f \, dg \right| \leq \|f\| \operatorname{var}_a^b g.$$

(ii) *Jestliže navíc $g \in \mathbb{BV}[a, b]$ a existuje integrál $\int_a^b f(x) \, d[\operatorname{var}_a^x g]$, pak platí*

$$\left| \int_a^b f \, dg \right| \leq \int_a^b |f(x)| \, d[\operatorname{var}_a^x g] \leq \|f\| \operatorname{var}_a^b g.$$

5.11 Poznámka. Uvidíme později (viz důsledek 5.42), že je-li f ohraničená na $[a, b]$, pak pro oba typy RS-integrálů platí, že z existence integrálu $\int_a^b f \, dg$ už plyne, že také integrál $\int_a^b f(x) \, d[\operatorname{var}_a^x g]$ existuje.

5.12 Lemma. *Nechť $f, f_1, f_2, g, g_1, g_2: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ a nechť existují integrály:*

$$\int_a^b f_1 \, dg, \int_a^b f_2 \, dg, \int_a^b f \, dg_1 \text{ a } \int_a^b f \, dg_2.$$

Potom pro libovolná $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ platí

$$\int_a^b (c_1 f_1 + c_2 f_2) \, dg = c_1 \int_a^b f_1 \, dg + c_2 \int_a^b f_2 \, dg$$

$$\int_a^b f \, d[c_1 g_1 + c_2 g_2] = c_1 \int_a^b f \, dg_1 + c_2 \int_a^b f \, dg_2. \quad \square$$

5.13 Cvičení. (i) *Dokažte lemmata 5.10 a 5.12.*

Dokažte, že následující tvrzení platí pro oba typy RS-integrálů:

(ii) *Jestliže $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ je neklesající na $[a, b]$ a $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ je taková, že existuje integrál $\int_a^b f \, dg$, pak*

$$\left(\inf_{x \in [a, b]} f(x) \right) [g(b) - g(a)] \leq \int_a^b f \, dg \leq \left(\sup_{x \in [a, b]} f(x) \right) [g(b) - g(a)].$$

(iii) *Definice 5.3 je korektní v tom smyslu, že určuje hodnotu integrálu jednoznačně. Jinak řečeno, jestliže $I_1 \in \mathbb{R}$ a $I_2 \in \mathbb{R}$ splňují (5.1) (s I_1 , resp. I_2 na místě I), pak musí být $I_1 = I_2$ (a podobně pro (5.2)).*

Oba pojmy RS-integrálu představují jakési zobecněné limity posloupnosti integrálních součtů $S(\sigma, \xi)$ vzhledem k značeným dělením. Nepřekvapí tedy, že platí následující tvrzení analogická klasické Bolzanově- Cauchyově podmínce.

5.14 Věta (BOLZANOVA-CAUCHYOVA PODMÍNKA).

Pro dané funkce $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ existuje $(\delta) \int_a^b f \, d g$ právě tehdy, když je splněna následující podmínka

$$\left. \begin{aligned} & \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 : \\ & \left((\sigma, \xi), (\tilde{\sigma}, \tilde{\xi}) \in \mathcal{T} [a, b], |\sigma| < \delta_\varepsilon \text{ a } |\tilde{\sigma}| < \delta_\varepsilon \right) \\ & \implies |S(\sigma, \xi) - S(\tilde{\sigma}, \tilde{\xi})| < \varepsilon. \end{aligned} \right\} \quad (5.3)$$

Podobně integrál $(\sigma) \int_a^b f \, d g$ existuje právě tehdy, když platí

$$\left. \begin{aligned} & \forall \varepsilon > 0 \exists \sigma_\varepsilon \in \mathcal{D} [a, b] : \\ & \left((\sigma, \xi), (\tilde{\sigma}, \tilde{\xi}) \in \mathcal{T} [a, b], \sigma \supset \sigma_\varepsilon \text{ a } \tilde{\sigma} \supset \sigma_\varepsilon \right) \\ & \implies |S(\sigma, \xi) - S(\tilde{\sigma}, \tilde{\xi})| < \varepsilon. \end{aligned} \right\} \quad (5.4)$$

Důkaz. Nutnost splnění uvedených podmínek pro existenci příslušných integrálů je zřejmá z definice 5.3.

Dokážeme, že podmínka (5.4) zaručuje existenci integrálu $(\sigma) \int_a^b f \, d g$. Nechť tedy platí (5.4). Potom existuje posloupnost $\{(\sigma^k, \xi^k)\}$ značených dělení intervalu $[a, b]$ taková, že

$$|S(\sigma, \xi) - S(\sigma^k, \xi^k)| < \frac{1}{k} \quad \text{pro každé } \sigma \supset \sigma^k \text{ a } \xi \in \tau(\sigma) \quad (5.5)$$

a přitom současně

$$\sigma^k \subset \sigma^\ell \text{ a } |S(\sigma^k, \xi^k) - S(\sigma^\ell, \xi^\ell)| < \frac{1}{k} \quad \text{pro každé } k \in \mathbb{N} \text{ a } \ell \geq k. \quad (5.6)$$

Posloupnost $\{S(\sigma^k, \xi^k)\}$ je cauchyovská posloupnost reálných čísel a existuje tedy reálné číslo $I \in \mathbb{R}$ takové, že

$$\lim_{k \rightarrow \infty} S(\sigma^k, \xi^k) = I.$$

Nyní, nechť je dáno $\varepsilon > 0$. Zvolme k_ε tak, aby bylo současně

$$\frac{1}{k_\varepsilon} < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{a} \quad |S(\sigma^{k_\varepsilon}, \xi^{k_\varepsilon}) - I| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (5.7)$$

Potom, díky (5.5) a (5.7), odvodíme, že

$$|S(\sigma, \xi) - I| \leq |S(\sigma, \xi) - S(\sigma^{k_\varepsilon}, \xi^{k_\varepsilon})| + |S(\sigma^{k_\varepsilon}, \xi^{k_\varepsilon}) - I| < \varepsilon$$

platí pro každé $\sigma \supset \sigma^{k_\varepsilon}$ a $\xi \in \tau(\sigma)$. To znamená, že $I = (\sigma) \int_a^b f \, d g$.

Podobně bychom dokázali, že podmínka (5.3) implikuje existenci integrálu
 $(\delta) \int_a^b f \, d g.$ □

5.15 Cvičení. (i) Dokažte větu 5.14 pro (δ) RS-integrály.

(ii) Dokažte, že podmínky (5.3), resp. (5.4) jsou ekvivalentní s podmínkami :

$$\left. \begin{aligned} \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 : \\ \left((\sigma', \xi'), (\sigma'', \xi'') \in \mathcal{T}[a, b], |\sigma'| < \delta_\varepsilon, \sigma'' \supset \sigma' \right) \\ \implies |S(\sigma', \xi') - S(\sigma'', \xi'')| < \varepsilon \end{aligned} \right\} \quad (5.3')$$

resp.

$$\left. \begin{aligned} \forall \varepsilon > 0 \exists \sigma_\varepsilon \in \mathcal{D}[a, b] : \\ \left((\sigma', \xi'), (\sigma'', \xi'') \in \mathcal{T}[a, b], \sigma'' \supset \sigma' \supset \sigma_\varepsilon \right) \\ \implies |S(\sigma', \xi') - S(\sigma'', \xi'')| < \varepsilon. \end{aligned} \right\} \quad (5.4')$$

(Návod: necht' $\sigma, \rho \in \mathcal{D}[a, b]$ a $\sigma' = \sigma \cup \rho$, pak $\sigma' \in \mathcal{D}[a, b]$, $\sigma' \supset \sigma$, $\sigma' \supset \rho$ a
 $|S(\sigma, \xi) - S(\rho, \eta)| \leq |S(\sigma, \xi) - S(\sigma', \xi')| + |S(\sigma', \xi') - S(\rho, \eta)|$
 pro libovolná $\xi \in \tau(\sigma)$, $\eta \in \tau(\rho)$ a $\xi' \in \tau(\sigma')$.)

Následující věta je přímým důsledkem věty 5.14. Platí ve stejném znění pro oba typy RS-integrálů.

5.16 Věta. *Jestliže existuje integrál $\int_a^b f \, d g$ a jestliže $[c, d] \subset [a, b]$, pak existuje také integrál $\int_c^d f \, d g$.*

D ů k a z . Předpokládejme, že integrál $(\sigma) \int_a^b f \, d g$ existuje. Podle věty 5.14 existuje dělení $\sigma_\varepsilon \in \mathcal{D}[a, b]$ takové, že

$$|S(\sigma, \xi) - S(\sigma', \xi')| < \varepsilon \quad (5.8)$$

platí pro všechna značená dělení $(\sigma, \xi), (\sigma', \xi') \in \mathcal{T}[a, b]$ taková, že $\sigma \supset \sigma_\varepsilon$ a $\sigma' \supset \sigma_\varepsilon$. Vzhledem k tvrzení obsaženém v poznámce 5.7, můžeme předpokládat, že $\{c, d\} \subset \sigma_\varepsilon$ a můžeme tedy rozložit σ_ε tak, že bude

$$\sigma_\varepsilon = \rho^- \cup \rho_\varepsilon \cup \rho^+, \text{ kde } \rho^- \in \mathcal{D}[a, c], \rho_\varepsilon \in \mathcal{D}[c, d], \rho^+ \in \mathcal{D}[d, b].$$

Nyní, necht' $\rho, \rho' \in \mathcal{D}[c, d]$, $\rho \supset \rho_\varepsilon$, $\rho' \supset \rho_\varepsilon$ a $(\rho, \eta), (\rho', \eta') \in \mathcal{T}[c, d]$. Definujme

$$\sigma = \rho^- \cup \rho \cup \rho^+, \eta = (\eta^-, \eta, \eta^+) \text{ a } \sigma' = \rho^- \cup \rho' \cup \rho^+, (\eta^-, \eta', \eta^+),$$

kde η^-, η^+ jsou takové vektory, že $(\rho^-, \eta^-) \in \mathcal{T}[a, c]$ a $(\rho^+, \eta^+) \in \mathcal{T}[d, b]$. Zřejmě je $(\sigma, \xi), (\sigma', \xi') \in \mathcal{T}[a, b]$, $\sigma \supset \sigma_\varepsilon$, $\sigma' \supset \sigma_\varepsilon$,

$$S(\sigma, \xi) = S(\rho^-, \eta^-) + S(\rho, \eta) + S(\rho^+, \eta^+)$$

a

$$S(\sigma', \xi') = S(\rho^-, \eta^-) + S(\rho', \eta') + S(\rho^+, \eta^+).$$

Podle (5.8) tedy máme $|S(\rho, \eta) - S(\rho', \eta')| = |S(\sigma, \xi) - S(\sigma', \xi')| < \varepsilon$ a odtud podle věty 5.14 plyne existence integrálu $(\sigma) \int_c^d f \, dg$.

Důkaz tvrzení věty pro (δ) RS-integrál se provede analogicky a je ponechán čtenáři jako cvičení. \square

5.17 Cvičení. Dokažte větu 5.16 pro (δ) RS-integrály.

Také následující tvrzení platí ve stejné podobě pro oba typy RS-integrálu.

5.18 Věta. Jestliže existuje integrál $\int_a^b f \, dg$ a $c \in [a, b]$, pak existují také integrály $\int_a^c f \, dg$ a $\int_c^b f \, dg$ a platí $\int_a^b f \, dg = \int_a^c f \, dg + \int_c^b f \, dg$.

Důkaz. Je-li $c = a$ nebo $c = b$, je tvrzení věty triviální. Nechť je tedy $c \in (a, b)$. Dále předpokládejme, že existuje integrál $(\sigma) \int_a^b f \, dg$. Potom existence integrálů

$(\sigma) \int_a^c f \, dg$ a $(\sigma) \int_c^b f \, dg$ je zaručena větou 5.16.

Nechť $\varepsilon > 0$. Zvolme značená dělení $(\sigma', \xi') \in \mathcal{T}[a, c]$ a $(\sigma'', \xi'') \in \mathcal{T}[c, b]$ tak, aby platilo

$$\left. \begin{aligned} & \left| S(\sigma', \xi') - \int_a^c f \, dg \right| + \left| S(\sigma'', \xi'') - \int_c^b f \, dg \right| \\ & \qquad \qquad \qquad + \left| S(\sigma, \xi) - \int_a^b f \, dg \right| < \varepsilon, \end{aligned} \right\} \quad (5.9)$$

kde $\sigma = \sigma' \cup \sigma'' \in \mathcal{D}[a, b]$ a $\xi = (\xi', \xi'') \in \tau(\sigma)$.

Zřejmě platí $S(\sigma, \xi) = S(\sigma', \xi') + S(\sigma'', \xi'')$. Tudíž

$$\begin{aligned} & \left| \int_a^b f \, dg - \int_a^c f \, dg - \int_c^b f \, dg \right| \\ & \leq \left| \int_a^b f \, dg - S(\sigma, \xi) \right| + \left| S(\sigma, \xi) - S(\sigma', \xi') - S(\sigma'', \xi'') \right| \\ & \quad + \left| S(\sigma', \xi') - \int_a^c f \, dg \right| + \left| S(\sigma'', \xi'') - \int_c^b f \, dg \right| < \varepsilon. \end{aligned}$$

Protože $\varepsilon > 0$ bylo libovolné, důkaz je dokončen. \square

5.19 Cvičení. Rozmyslete si, proč z existence integrálů

$$\int_a^b f \, dg, \quad \int_a^c f \, dg, \quad \int_c^b f \, dg$$

plyne existence značených dělení $(\sigma', \xi') \in \mathcal{T}[a, c]$ a $(\sigma'', \xi'') \in \mathcal{T}[c, b]$ takových, že platí (5.9).

Implikace obrácená ke tvrzení věty 5.18 se pro (σ) RS-integrál dokáže snadno.

5.20 Věta. Jestliže $c \in [a, b]$ a jestliže existují integrály

$$I_1 = (\sigma) \int_a^c f \, dg \quad a \quad I_2 = (\sigma) \int_c^b f \, dg,$$

pak existuje také integrál $I = (\sigma) \int_a^b f \, dg$ a platí $I = I_1 + I_2$.

D ů k a z . Buď dáno $\varepsilon > 0$. Zvolme dělení $\sigma'_\varepsilon \in \mathcal{D}[a, c]$ a $\sigma''_\varepsilon \in \mathcal{D}[c, b]$ tak, aby platilo

$$|S(\sigma', \xi') - I_1| < \varepsilon \quad \text{pro } (\sigma', \xi') \in \mathcal{T}[a, c] \text{ takové, že } \sigma' \supset \sigma'_\varepsilon,$$

a

$$|S(\sigma'', \xi'') - I_2| < \varepsilon \quad \text{pro } (\sigma'', \xi'') \in \mathcal{T}[c, b] \text{ takové, že } \sigma'' \supset \sigma''_\varepsilon.$$

Nyní, nechť $\sigma_\varepsilon = \sigma'_\varepsilon \cup \sigma''_\varepsilon$. Protože $c \in \sigma_\varepsilon$, každé značené dělení (σ, ξ) intervalu $[a, b]$ splňující $\sigma \supset \sigma_\varepsilon$ můžeme rozdělit

$$\sigma = \sigma' \cup \sigma'' \quad a \quad \xi = (\xi', \xi'')$$

tak, že bude platit

$$(\sigma', \xi') \in \mathcal{T}[a, c], \quad (\sigma'', \xi'') \in \mathcal{T}[c, b], \quad \sigma' \supset \sigma'_\varepsilon \quad a \quad \sigma'' \supset \sigma''_\varepsilon.$$

Navíc $S(\sigma, \xi) = S(\sigma', \xi') + S(\sigma'', \xi'')$. Vzhledem k definici σ'_ε a σ''_ε , tedy pro každé $(\sigma, \xi) \in \mathcal{T}[a, b]$, kde $\sigma \supset \sigma_\varepsilon$, máme

$$|S(\sigma, \xi) - (I_1 + I_2)| \leq |S(\sigma', \xi') - I_1| + |S(\sigma'', \xi'') - I_2| < 2\varepsilon,$$

tj. dokázali jsme tvrzení věty. □

5.21 Poznámka. Aby mohlo platit analogické tvrzení také pro (δ) RS-integrál, je třeba přidat předpoklad o pseudoaditivitě funkcí f, g v bodě c , viz cvičení 5.34.

Pro existenci (δ) RS-integrálu máme také následující přirozenou a lépe ověřitelnou nutnou a postačující podmínku.

5.22 Věta. Pro dané funkce $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrál $(\delta) \int_a^b f \, dg$ existuje právě tehdy, když pro každou posloupnost $\{(\sigma^n, \xi^n)\} \subset \mathcal{T}[a, b]$ značených dělení intervalu $[a, b]$ takovou, že $\lim_{n \rightarrow \infty} |\sigma^n| = 0$, má posloupnost $\{S(\sigma^n, \xi^n)\}$ konečnou limitu.

Důkaz. Nutnost uvedené podmínky je zřejmá. Zbývá dokázat její postačitelnost.

Předpokládejme tedy, že limita $\lim_{n \rightarrow \infty} S(\sigma^n, \xi^n)$ existuje (a je konečná) pro každou posloupnost $\{(\sigma^n, \xi^n)\} \subset \mathcal{T}[a, b]$ takovou, že $\lim_{n \rightarrow \infty} |\sigma^n| = 0$.

Nechť existují dvě posloupnosti značených dělení $\{(\sigma^n, \xi^n)\} \subset \mathcal{T}[a, b]$ a $\{(\tilde{\sigma}^n, \tilde{\xi}^n)\} \subset \mathcal{T}[a, b]$ takové, že $\lim_{n \rightarrow \infty} |\sigma^n| = \lim_{n \rightarrow \infty} |\tilde{\sigma}^n| = 0$ a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S(\sigma^n, \xi^n) = I \in \mathbb{R} \quad \text{a} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S(\tilde{\sigma}^n, \tilde{\xi}^n) = \tilde{I} \in \mathbb{R}.$$

Sestavme nyní novou posloupnost

$$\{S(\rho^n, \eta^n)\} = \left\{ S(\sigma^1, \xi^1), S(\tilde{\sigma}^1, \tilde{\xi}^1), S(\sigma^2, \xi^2), S(\tilde{\sigma}^2, \tilde{\xi}^2), \dots \right\}$$

Podle našeho předpokladu má také posloupnost $\{S(\rho^n, \eta^n)\}$ konečnou limitu $J \in \mathbb{R}$, a protože obsahuje obě posloupnosti

$$\{S(\sigma^n, \xi^n)\} \quad \text{a} \quad \{S(\tilde{\sigma}^n, \tilde{\xi}^n)\},$$

musí platit $I = \tilde{I} = J$. To znamená, že hodnota limity

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} S(\sigma^n, \xi^n)$$

nezávisí na volbě posloupnosti $\{(\sigma^n, \xi^n)\}$ značených dělení intervalu $[a, b]$, pro kterou platí $\lim_{n \rightarrow \infty} |\sigma^n| = 0$.

Nyní, nechť $\{(\sigma^n, \xi^n)\} \subset \mathcal{T}[a, b]$ je libovolná posloupnost taková, že

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |\sigma^n| = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S(\sigma^n, \xi^n) = I \in \mathbb{R},$$

a nechť $(\delta) \int_a^b f \, dg \neq I$. Pak existuje $\tilde{\varepsilon} > 0$ takové, že pro každé $k \in \mathbb{N}$ lze najít $(\sigma^{n_k}, \xi^{n_k}) \in \mathcal{T}[a, b]$, pro něž platí $|\sigma^{n_k}| < 1/k$ a $|S(\sigma^{n_k}, \xi^{n_k}) - I| > \tilde{\varepsilon}$. Našli jsme podposloupnost $\{(\sigma^{n_k}, \xi^{n_k}) : k \in \mathbb{N}\} \subset \mathcal{T}[a, b]$ posloupnosti $\{(\sigma^n, \xi^n)\}$ takovou, že $\lim_{k \rightarrow \infty} |\sigma^{n_k}| = 0$ a přitom neplatí $\lim_{k \rightarrow \infty} S(\sigma^{n_k}, \xi^{n_k}) = I$. To je ale spor s naším předpokladem. Platí tedy $(\delta) \int_a^b f \, dg = I$. Důkaz věty je dokončen. \square

Nyní naznačíme, jakou roli hrají v teorii Stieltjesova integrálu ohraničené funkce. Následující tvrzení platí pro oba typy RS-integrálů.

5.23 Věta. *Nechť existuje integrál $\int_a^b f \, dg$. Potom je buď to g konstantní na $[a, b]$,*

nebo je f ohraničená na množině $[a, b] \setminus A$, kde A značí sjednocení všech podintervalů $[a, b]$ otevřených v $[a, b]$, na kterých je funkce g konstantní.¹

Důkaz. Podle věty 5.6 stačí dokázat tvrzení věty pro (σ) integrál.

Nechť g není konstantní na $[a, b]$ a f není ohraničená na $B = [a, b] \setminus A$. Pak je množina B neprázdná a existuje posloupnost $\{x_n\} \subset B$ taková, že

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n)| = \infty.$$

Nechť x^* je libovolný hromadný bod posloupnosti $\{x_n\}$ v intervalu $[a, b]$. Předpokládejme, že $x^* \in (a, b)$. Potom alespoň jedna z množin $\{x_n\} \cap [a, x^*)$ nebo $\{x_n\} \cap (x^*, b]$ (v případě, že je $x^* < b$) musí mít nekonečně mnoho prvků. Nechť je to například množina $\{x_n\} \cap [a, x^*)$. Potom můžeme z posloupnosti $\{x_n\}$ vybrat rostoucí podposloupnost $\{x_{n_k}\} \subset [a, x^*)$ takovou, že platí $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x^*$ a

$\lim_{k \rightarrow \infty} |f(x_{n_k})| = \infty$. Speciálně pro každé $K > 0$ existuje $k_0 \in \mathbb{N}$ takové, že

$$|f(x_{n_p})| > K \quad \text{pro každé } p \geq k_0. \quad (5.10)$$

Na druhou stranu, podle vět 5.14 a 5.16 existuje dělení σ^* intervalu $[a, x^*]$ takové, že je

$$|S(\tilde{\sigma}, \tilde{\xi}) - S(\sigma, \xi)| < 1 \quad (5.11)$$

pro všechna značená dělení (σ, ξ) , $(\tilde{\sigma}, \tilde{\xi})$ intervalu $[a, x^*]$ taková, že je $\sigma \supset \sigma^*$ a $\tilde{\sigma} \supset \sigma^*$. Nechť $\sigma^* = \{\tau_0, \tau_1, \dots, \tau_m\}$.

Protože $\{x_{n_k}\} \cap A = \emptyset$ a $x_{n_k} \in (\tau_{m-1}, x^*)$ pro všechna k dostatečně velká, není g konstantní na (τ_{m-1}, x^*) . Existuje tedy bod $t^* \in (\tau_{m-1}, x^*)$ takový, že je $g(t^*) \neq g(x^*)$.

Nyní, nechť $\sigma_j = \tau_j$ pro $j = 1, 2, \dots, m-1$, $\sigma_m = t^*$, $\sigma_{m+1} = x^*$ a

$$\sigma = \{\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_{m+1}\}.$$

Potom $\sigma \in \mathcal{D}[a, x^*]$ a $\sigma \supset \sigma^*$. Dále nechť $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{m+1})$ je libovolný vektor značek takový, že $(\sigma, \xi) \in \mathcal{T}[a, x^*]$ a nechť $k_0 \in \mathbb{N}$ je takové, že platí (5.10) pro

$$K = |f(\xi_{m+1})| + \frac{1}{|g(x^*) - g(t^*)|}.$$

Konečně, zvolme $p \geq k_0$ tak, aby $x_{n_p} \in (t^*, x^*)$, a položme $\tilde{\sigma} = \sigma$, $\tilde{\xi}_{m+1} = x_{n_p}$ a $\tilde{\xi} = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m, \tilde{\xi}_{m+1})$. Potom $(\tilde{\sigma}, \tilde{\xi}) \in \mathcal{T}[a, x^*]$ a $\tilde{\sigma} \supset \sigma^*$.

Pro takto konstruovaná rozšířená dělení (σ, ξ) , $(\tilde{\sigma}, \tilde{\xi})$ intervalu $[a, x^*]$ platí

¹ Otevřeným podintervalem v $[a, b]$ zde rozumíme také celý interval $[a, b]$ a intervaly tvaru $[a, c)$, $(d, b]$, kde $c \in (a, b]$ a $d \in [a, b)$ mohou být libovolné.

$$\begin{aligned}
|S(\tilde{\sigma}, \tilde{\xi}) - S(\sigma, \xi)| &= |f(\xi_{m+1}) - f(x_{n_p})| |g(x^*) - g(t^*)| \\
&\geq (|f(x_{n_p})| - |f(\xi_{m+1})|) |g(x^*) - g(t^*)| \\
&> (K - |f(\xi_{m+1})|) |g(x^*) - g(t^*)| = 1,
\end{aligned}$$

což je ve sporu s (5.11).

Podobně bychom dovedli ke sporu předpoklad, že f není ohraničená na B , i v případech, kdy množina $\{x_n\} \cap [a, x^*)$ má konečně mnoho prvků nebo $x^* = a$. \square

5.24 Poznámka. (i) Nechť $f \in \mathbb{G}[a, b]$, $x_0 \in (a, b)$, $c, d \in \mathbb{R}$ a $g(x) = c$ pro $x \in [a, x_0)$, $g(x_0) = (c + d)/2$, $g(x) = d$ pro $x \in (x_0, d]$. Dále nechť $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ má jednostranné limity $f(x_0-), f(x_0+) \in \mathbb{R}$.

Pro $n \in \mathbb{N}$ uvažujme posloupnost dělení $\{\sigma^n\}$ intervalu $[a, b]$ takových, že $|\sigma^n| \rightarrow 0$, přičemž pro každé $n \in \mathbb{N}$ existuje k_n , pro které platí $\sigma_{k_n-1}^n < x_0 < \sigma_{k_n}^n$. Dále nechť vektory značek θ^n , η^n a ζ^n jsou takové, že pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí

$$\begin{aligned}
(\sigma^n, \theta^n), (\sigma^n, \eta^n), (\sigma^n, \zeta^n) &\in \mathcal{T}[a, b], \\
\theta_{k_n}^n &= x_0, \sigma_{k_n-1}^n \leq \eta_{k_n}^n < x_0 \quad \text{a} \quad x_0 < \zeta_{k_n}^n \leq \sigma_{k_n}^n.
\end{aligned}$$

Potom dostaneme $S(\sigma^n, \theta^n) = f(x_0)(d - c)$, $S(\sigma^n, \eta^n) = f(\eta_{k_n}^n)(d - c)$ a $S(\sigma^n, \zeta^n) = f(\zeta_{k_n}^n)(d - c)$ pro každé $n \in \mathbb{N}$. Tudíž

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} S(\sigma^n, \theta^n) &= f(x_0)(d - c), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S(\sigma^n, \eta^n) = f(x_0-)(d - c), \\
\lim_{n \rightarrow \infty} S(\sigma^n, \zeta^n) &= f(x_0+)(d - c).
\end{aligned}$$

Odtud plyne, že k tomu, aby každá posloupnost $S(\sigma^n, \xi^n)$ taková, že

$$(\sigma^n, \xi^n) \in \mathcal{T}[a, b] \quad \text{a} \quad |\sigma^n| \rightarrow 0,$$

konvergovala pro $n \rightarrow \infty$ k nějaké konečné (a jednoznačně určené) hodnotě I , je nutné, aby platilo

$$\text{buď} \quad g(x_0-) = c = g(x_0) = d = g(x_0+), \quad \text{nebo} \quad f(x_0-) = f(x_0) = f(x_0+).$$

Vzhledem k větě 5.22 lze tedy očekávat, že pro existenci integrálu $(\delta) \int_a^b f \, d g$ bude nutné, aby funkce f a g neměly žádný společný bod nespojitosti.

(ii) Nyní, nechť $\sigma_0 \in \mathcal{D}[a, b]$ je libovolné dělení obsahující x_0 . Pro každé jeho zjemnění σ potom existuje $k = k(\sigma)$ takové, že $x_0 = \sigma_k$. Máme

$$S(\sigma, \xi) = \begin{cases} (f(\xi_{k-1}) + f(\xi_k)) \frac{d-c}{2}, & \text{jestliže } \xi_{k-1} < x_0 < \xi_k, \\ (f(x_0) + f(\xi_k)) \frac{d-c}{2}, & \text{jestliže } \xi_{k-1} = x_0 < \xi_k, \\ (f(\xi_{k-1}) + f(x_0)) \frac{d-c}{2}, & \text{jestliže } \xi_{k-1} < x_0 = \xi_k, \\ f(x_0)(d-c), & \text{jestliže } \xi_{k-1} = x_0 = \xi_k. \end{cases}$$

Bude-li tedy funkce f regulovaná na $[a, b]$, bude množina \mathcal{Q} hromadných bodů množiny $\{S(\sigma, \xi) : (\sigma, \xi) \in \mathcal{T}[a, b] \text{ a } \sigma \supset \sigma_0\}$ nejvýše čtyřbodová:

$$\mathcal{Q} = \left\{ (f(x_0-) + f(x_0+)) \frac{d-c}{2}, (f(x_0) + f(x_0+)) \frac{d-c}{2}, \right. \\ \left. (f(x_0-) + f(x_0)) \frac{d-c}{2}, 2f(x_0) \frac{d-c}{2} \right\},$$

kde $\frac{d-c}{2} = \Delta^+g(x_0) = \Delta^-g(x_0)$. Pro existenci integrálu $(\sigma) \int_a^b f dg$ je ovšem nutné, aby se množina \mathcal{Q} redukovala na jednobodovou množinu. Snadno nahlédneme, že toto nastane právě tehdy, když pro funkce f a g bude platit současně

$$\Delta^+f(x_0) \Delta^+g(x_0) = 0 \quad \text{a} \quad \Delta^-f(x_0) \Delta^-g(x_0) = 0.$$

5.2 Podmínka pseudoaditivity a její důsledky

Podrobněji vyjasnit vzájemný vztah mezi (δ) RS a (σ) RS-integrálem umožní pojem *pseudoaditivity*.

5.25 Definice. Řekneme, že funkce $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ splňují v bodě $x \in (a, b)$ podmínku pseudoaditivity, jestliže

$$\left. \begin{array}{l} \text{pro každé } \varepsilon > 0 \text{ existuje } \delta_\varepsilon > 0 \text{ takové, že je-li} \\ \delta', \delta'' \in (0, \delta_\varepsilon), \xi \in [x - \delta', x + \delta''], \xi' \in [x - \delta', x] \text{ a } \xi'' \in [x, x + \delta''], \\ \text{pak platí} \\ |f(\xi) [g(x + \delta'') - g(x - \delta')] - f(\xi') [g(x) - g(x - \delta')] \\ - f(\xi'') [g(x + \delta'') - g(x)]| < \varepsilon. \end{array} \right\} \text{(PA)}$$

5.26 Poznámka. Použití podmínky (PA) může být někdy pohodlnější, pokud ji přeformulujeme do následující ekvivalentní podoby:

$$\left. \begin{array}{l} \text{pro každé } \varepsilon > 0 \text{ existuje } \delta_\varepsilon > 0 \text{ takové, že je-li} \\ x' \in (x - \delta_\varepsilon, x), x'' \in (x, x + \delta_\varepsilon), \xi \in [x', x''], \xi' \in [x', x] \text{ a } \xi'' \in [x, x''], \\ \text{pak platí} \\ |f(\xi) [g(x'') - g(x')] - f(\xi') [g(x) - g(x')] - f(\xi'') [g(x'') - g(x)]| < \varepsilon. \end{array} \right\} \text{(PA')}$$

5.27 Příklad. Nechť

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{když } x \leq 0, \\ 1, & \text{když } x > 0 \end{cases} \quad \text{a} \quad g(x) = \begin{cases} 1, & \text{když } x \leq 0, \\ 0, & \text{když } x > 0 \end{cases}$$

a $x' < 0 < x''$, $\xi \in [x', x'']$, $\xi' \in [x', 0]$ a $\xi'' \in [0, x'']$. Potom

$$\begin{aligned} & |f(\xi) [g(x'') - g(x')] - f(\xi') [g(0) - g(x')] - f(\xi'') [g(x'') - g(0)]| \\ &= |f(\xi) - f(\xi'')| = 1 \end{aligned}$$

vždy, když bude $\xi \leq 0$ a $\xi'' > 0$. Vidíme, že funkce f , g nespĺňujú podmínku (PA) v bodě 0.

5.28 Lemma. Jestliže funkce $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ splňují v bodě $x \in (a, b)$ podmínku pseudoadditivity, pak alespoň jedna z funkcí f, g je v bodě x spojitá.

Na druhou stranu, je-li jedna z funkcí f, g spojitá v bodě x a druhá je ohraničená na jeho okolí, pak funkce f, g splňují podmínku pseudoadditivity v bodě x .

Důkaz. a) Nechť f, g splňují podmínku (PA') pseudoadditivity v bodě x . Dosaďme-li $\xi = \xi'$, dostaneme

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0:$$

$$\begin{aligned} & (x' \in (x - \delta_\varepsilon, x), x'' \in (x, x + \delta_\varepsilon), \xi' \in [x', x], \xi'' \in [x, x'']) \\ & \implies |f(\xi') - f(\xi'')| |g(x'') - g(x)| < \varepsilon. \end{aligned}$$

Odtud je zřejmé, že není-li funkce g v bodě x spojitá zprava, musí být v bodě x spojitá funkce f . Podobně, položíme-li v (PA') $\xi = \xi''$, dokážeme, že není-li g spojitá zleva v x , musí být f spojitá v x .

b) Nechť

$$x \in (a, b), x' \in [a, x), x'' \in (x, b], \xi \in [x', x''], \xi' \in [x', x] \quad \text{a} \quad \xi'' \in [x, x''].$$

Potom

$$\begin{aligned} & |f(\xi) [g(x'') - g(x')] - f(\xi') [g(x) - g(x')] - f(\xi'') [g(x'') - g(x)]| \\ &= |(f(\xi) - f(\xi')) (g(x) - g(x')) - (f(\xi'') - f(\xi)) (g(x'') - g(x))| \\ &\leq |f(\xi) - f(\xi')| |g(x) - g(x')| + |f(\xi'') - f(\xi)| |g(x'') - g(x)| \\ &\leq (|f(\xi) - f(x)| + |f(x) - f(\xi')|) |g(x) - g(x')| \\ &\quad + (|f(\xi'') - f(x)| + |f(x) - f(\xi)|) |g(x'') - g(x)|. \end{aligned}$$

Odtud už plyne, že platí i druhé tvrzení lemmatu. □

5.29 Lemma. *Nechť $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ a nechť existuje integrál $(\delta) \int_a^b f \, d g$. Potom dvojice f, g splňuje v každém bodě $x \in (a, b)$ podmínku pseudoaditivivity.*

D ů k a z. Předpokládejme, že integrál $(\delta) \int_a^b f \, d g$ existuje a přitom v nějakém bodě $x \in (a, b)$ neplatí (PA'). To znamená, že existuje $\varepsilon > 0$ takové, že pro každé $\delta > 0$ lze najít body

$$x' \in (x - \delta, x), \quad x'' \in (x, x + \delta), \quad \eta \in [x', x''], \quad \eta' \in [x', x] \quad \text{a} \quad \eta'' \in [x, x'']$$

takové, že

$$|f(\eta) [g(x'') - g(x')] - f(\eta') [g(x) - g(x')] - f(\eta'') [g(x'') - g(x)]| \geq \varepsilon. \quad (5.12)$$

Buď dáno libovolné $\delta > 0$. Nechť $(\sigma, \xi) \in \mathcal{D}[a, b]$ je takové, že $\nu(\sigma) = m$, $|\sigma| < \delta$ a pro nějaké $k \in \{1, 2, \dots, m\}$ je $\sigma_{k-1} = x' < x < x'' = \sigma_k$ a $\xi_k = \eta$. Definujme $\tilde{\sigma} = \sigma \cup \{x\}$ a $\tilde{\xi} = (\xi_1, \dots, \xi_{k-1}, \eta', \eta'', \xi_{k+1}, \dots, \xi_m)$. Podle (5.12) máme

$$\begin{aligned} & |S(\sigma, \xi) - S(\tilde{\sigma}, \tilde{\xi})| \\ &= |f(\xi_k) [g(\sigma_k) - g(\sigma_{k-1})] \\ &\quad - f(\eta') [g(x) - g(\sigma_{k-1})] - f(\eta'') [g(\sigma_k) - g(x)]| \\ &= |f(\eta) [g(x'') - g(x')] - f(\eta') [g(x) - g(x')] - f(\eta'') [g(x'') - g(x)]| \geq \varepsilon. \end{aligned}$$

To znamená, že není splněna podmínka (5.3'), a tudíž podle věty 5.14 a cvičení 5.15 (ii) neexistuje integrál $(\delta) \int_a^b f \, d g$. □

Následující tvrzení je důsledkem věty 5.14 a lemat 5.28 a 5.29.

5.30 Věta. *Nechť $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ a nechť existuje integrál $(\delta) \int_a^b f \, d g$. Potom v každém bodě $x \in (a, b)$ je alespoň jedna z funkcí f, g spojitá.*

Víme, že (δ) RS-integrál je speciálním případem (σ) RS-integrálu (viz větu 5.6). Na druhou stranu, jak ukáže následující věta, pojem pseudoaditivivity nám poskytuje možnost objasnit i vztah mezi těmito integrály v opačném směru.

5.31 Věta. *Nechť $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Potom integrál $(\delta) \int_a^b f \, d g$ existuje právě tehdy, když existuje integrál $(\sigma) \int_a^b f \, d g$ a funkce f, g splňují podmínku pseudoaditivivity v každém bodě $x \in (a, b)$.*

D ů k a z. Předpokládejme nejprve, že existuje $(\delta) \int_a^b f \, d g$. Podle věty 5.6 potom

existuje i $(\sigma) \int_a^b f \, d g$ a má stejnou hodnotu. Dále podle lematu 5.29 musí funkce f, g splňovat podmínku pseudoaditivity v každém bodě $x \in (a, b)$. Stačí tedy dokázat, že když existuje integrál $(\sigma) \int_a^b f \, d g$ a funkce f, g splňují podmínku pseudoaditivity v každém bodě $x \in (a, b)$, pak existuje i integrál $(\delta) \int_a^b f \, d g$.

Předpokládejme tedy, že integrál $(\sigma) \int_a^b f \, d g = I$ existuje a že funkce f, g splňují podmínku pseudoaditivity v každém bodě $x \in (a, b)$. Nechť je dáno $\varepsilon > 0$ a nechť dělení $\sigma_\varepsilon = \{s_0, s_1, \dots, s_r\} \in \mathcal{D}[a, b]$ je takové, že $r \geq 2$ a platí

$$|S(\rho, \eta) - I| < \varepsilon, \quad \text{jakmile } \rho \supset \sigma_\varepsilon \text{ a } \eta \in \tau(\rho). \quad (5.13)$$

Označme

$$\delta_* := \min\{s_i - s_{i-1} : i = 1, 2, \dots, r\}. \quad (5.14)$$

Protože funkce f, g splňují podmínku pseudoaditivity na (a, b) , nutně existuje $\delta_\varepsilon \in (0, \delta_*)$ takové, že pro každé $i = 1, 2, \dots, r-1$ platí

$$\left. \begin{array}{l} |f(\xi) [g(s''_i) - g(s'_i)] \\ \quad - f(\xi') [g(s_i) - g(s'_i)] - f(\xi'') [g(s''_i) - g(s_i)]| < \frac{\varepsilon}{r-1} \\ \text{pro } s'_i \in (s_i - \delta_\varepsilon, s_i), s''_i \in (s_i, s_i + \delta_\varepsilon), \\ \xi \in [s'_i, s''_i], \xi' \in [s'_i, s_i], \xi'' \in [s_i, s''_i]. \end{array} \right\} (5.15)$$

Nechť $(\sigma, \xi) \in \mathcal{T}[a, b]$, $\sigma = \{\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_m\}$ a $|\sigma| < \delta_\varepsilon$.

Podle (5.14) je pro každé $j \in \{1, 2, \dots, m\}$ množina $(\sigma_{j-1}, \sigma_j) \cap \sigma_\varepsilon$ buď jednobodová, nebo prázdná. Nechť

$$\begin{aligned} U_1 &\text{ je množina těch } j \in \{1, 2, \dots, m\}, \text{ pro která } (\sigma_{j-1}, \sigma_j) \cap \sigma_\varepsilon = \emptyset, \\ U_2 &= \{1, 2, \dots, m\} \setminus U_1. \end{aligned}$$

Potom pro každé $j \in U_2$ existuje právě jedno $i(j) \in \{1, 2, \dots, r-1\}$ takové, že $s_{i(j)} \in (\sigma_{j-1}, \sigma_j)$. Počet prvků množiny U_2 tedy není větší než $r-1$.

Položme nyní $\rho = \sigma \cup \sigma_\varepsilon$. Potom

$$|\rho| < \delta_\varepsilon < \delta_* \quad (5.16)$$

a pro každé $j \in U_1$ existuje právě jedno $k(j) \in \{1, 2, \dots, \nu(\rho)\}$ takové, že

$$[\rho_{k(j)-1}, \rho_{k(j)}] = [\sigma_{j-1}, \sigma_j]. \quad (5.17)$$

Pokud $j \in U_2$, pak existuje právě jedno $\ell(j) \in \{1, 2, \dots, \nu(\rho) - 1\}$ takové, že

$$\rho_{\ell(j)-1} = \sigma_{j-1}, \quad \rho_{\ell(j)} = s_{i(j)}, \quad \rho_{\ell(j)+1} = \sigma_j. \quad (5.18)$$

Zvolme vektor $\boldsymbol{\eta}$ tak, aby bylo $(\boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{\eta}) \in \mathcal{T}[a, b]$ a

$$\eta_{k(j)} = \xi_j, \quad \text{když } j \in U_1, \quad (5.19)$$

a porovnejme integrální součty $S(\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\xi})$ a $S(\boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{\eta})$. Máme

$$S(\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\xi}) = \sum_{j \in U_1} f(\xi_j) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})] + \sum_{j \in U_2} f(\xi_j) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})].$$

Nechť $V_1 = \{k(j) : j \in U_1\}$ a $V_2 = \{1, 2, \dots, \nu(\boldsymbol{\rho})\} \setminus V_1$. Pak podle (5.17)–(5.19)

$$\begin{aligned} S(\boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{\eta}) &= \sum_{k \in V_1} f(\eta_k) [g(\rho_k) - g(\rho_{k-1})] + \sum_{k \in V_2} f(\eta_k) [g(\rho_k) - g(\rho_{k-1})] \\ &= \sum_{j \in U_1} f(\eta_{k(j)}) [g(\rho_{k(j)}) - g(\rho_{k(j)-1})] + \sum_{k \in V_2} f(\eta_k) [g(\rho_k) - g(\rho_{k-1})] \\ &= \sum_{j \in U_1} f(\xi_j) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})] \\ &\quad + \sum_{j \in U_2} [f(\eta_{\ell(j)}) [g(\rho_{\ell(j)}) - g(\rho_{\ell(j)-1})] + f(\eta_{\ell(j)+1}) [g(\rho_{\ell(j)+1}) - g(\rho_{\ell(j)})]] \\ &= \sum_{j \in U_1} f(\xi_j) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})] \\ &\quad + \sum_{j \in U_2} [f(\eta_{\ell(j)}) [g(s_{i(j)}) - g(\sigma_{j-1})] + f(\eta_{\ell(j)+1}) [g(\sigma_j) - g(s_{i(j)})]]. \end{aligned}$$

Tudíž

$$\begin{aligned} S(\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\xi}) - S(\boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{\eta}) &= \sum_{j \in U_2} f(\xi_j) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})] \\ &\quad - \sum_{j \in U_2} [f(\eta_{\ell(j)}) [g(s_{i(j)}) - g(\sigma_{j-1})] + f(\eta_{\ell(j)+1}) [g(\sigma_j) - g(s_{i(j)})]], \end{aligned}$$

tj. $|S(\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\xi}) - S(\boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{\eta})| \leq \sum_{j \in U_2} |W_j|$, kde

$$\begin{aligned} W_j &= f(\xi_j) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})] \\ &\quad - f(\eta_{\ell(j)}) [g(s_{i(j)}) - g(\sigma_{j-1})] - f(\eta_{\ell(j)+1}) [g(\sigma_j) - g(s_{i(j)})]. \end{aligned}$$

Připomeňme, že vzhledem k (5.16) a (5.18) máme

$$\begin{aligned} [\sigma_{j-1}, \sigma_j] &\subset (s_{i(j)} - \delta_\varepsilon, s_{i(j)} + \delta_\varepsilon), \quad \xi_j \in [\sigma_{j-1}, \sigma_j], \\ \eta_{\ell(j)} &\in [\sigma_{j-1}, s_{i(j)}], \quad \eta_{\ell(j)+1} \in [s_{i(j)}, \sigma_j]. \end{aligned}$$

Podle (5.15) je tedy $|W_j| < \frac{\varepsilon}{r-1}$ pro každé $j \in U_2$, a tudíž (také díky tomu, že

počet elementů množiny U_2 není větší než $r - 1$) dostáváme, že

$$|S(\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\xi}) - S(\boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{\eta})| \leq \sum_{j \in U_2} |W_j| < \varepsilon.$$

Konečně, vzhledem k (5.13) a vzhledem k definici $\boldsymbol{\rho}$, platí

$$|S(\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\xi}) - I| \leq |S(\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\xi}) - S(\boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{\eta})| + |S(\boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{\eta}) - I| < 2\varepsilon.$$

Dokázali jsme tedy, že $(\delta) \int_a^b f \, dg = I$. □

5.32 Důsledek. *Nechť $(\sigma) \int_a^b f \, dg = I \in \mathbb{R}$ a nechť v každém bodě intervalu (a, b) je alespoň jedna z funkcí $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ spojitá a druhá je ohraničená na jeho okolí. Potom je také $(\delta) \int_a^b f \, dg = I$.*

Důkazu. Podle lemmatu 5.28 splňují funkce f, g podmínku pseudoaditivitu v každém bodě $x \in (a, b)$, a tudíž podle věty 5.31 existuje také $(\delta) \int_a^b f \, dg$ a platí

$$(\delta) \int_a^b f \, dg = (\sigma) \int_a^b f \, dg. \quad \square$$

5.33 Poznámka. Speciálně jestliže $g(x) \equiv x$ a f je ohraničená na $[a, b]$ (tj. pro Riemannův integrál), jsou definice integrálů $(\delta) \int_a^b f(x) \, dx$ a $(\sigma) \int_a^b f(x) \, dx$ ekvivalentní.

5.34 Cvičení. Dokažte tvrzení:

Nechť $c \in [a, b]$, $(\delta) \int_a^c f \, dg = I_1 \in \mathbb{R}$ a $(\delta) \int_c^b f \, dg = I_2 \in \mathbb{R}$ a nechť f, g splňují podmínku pseudoaditivitu v c . Potom integrál $I = (\delta) \int_a^b f \, dg$ existuje a platí $I = I_1 + I_2$.

(Návod: využijte věty 5.20 a 5.31.)

5.3 Absolutní integrovatelnost

Nyní uvedeme další potřebný pomocný pojem.

5.35 Definice. Nechť $-\infty < c < d < \infty$ a $f, g: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$. Potom definujeme

$$\mathfrak{S}_{f\Delta g}[c, d] = \{|S_{f\Delta g}(\boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{\eta}) - S_{f\Delta g}(\boldsymbol{\rho}', \boldsymbol{\eta}')| : (\boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{\eta}), (\boldsymbol{\rho}', \boldsymbol{\eta}') \in \mathcal{T}[c, d]\}$$

a

$$\omega(S_{f\Delta g}; [c, d]) = \sup \mathfrak{S}_{f\Delta g}[c, d]. \quad (5.20)$$

Platí následující modifikace Bolzanových-Cauchyových podmínek.

5.36 Věta. *Nechť $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Potom :*

$$(i) \text{ Integrál } (\delta) \int_a^b f \, d g \text{ existuje tehdy a jen tehdy, když platí}$$

$$\left. \begin{array}{l} \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0: \\ \left(\sigma \in \mathcal{D}[a, b] \text{ a } |\sigma| < \delta_\varepsilon \right) \implies \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \omega(S_{f\Delta g}; [\sigma_{j-1}, \sigma_j]) < \varepsilon. \end{array} \right\} (5.21)$$

$$(ii) \text{ Integrál } (\sigma) \int_a^b f \, d g \text{ existuje tehdy a jen tehdy, když platí}$$

$$\left. \begin{array}{l} \forall \varepsilon > 0 \exists \sigma_\varepsilon \in \mathcal{D}[a, b]: \\ \left(\sigma \in \mathcal{D}[a, b] \text{ a } \sigma \supset \sigma_\varepsilon \right) \implies \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \omega(S_{f\Delta g}; [\sigma_{j-1}, \sigma_j]) < \varepsilon. \end{array} \right\} (5.22)$$

D ů k a z. a) Ukážeme, že podmínka (5.21) je ekvivalentní s Bolzanovou-Cauchyovou podmínkou pro existenci (δ) RS-integrálu.

α) Předpokládejme, že platí (5.3). Nechť $\tilde{\varepsilon} > 0$ je dáno, $\varepsilon = \tilde{\varepsilon}/2$ a nechť δ_ε je určeno podmínkou (5.3). Mějme dělení σ intervalu $[a, b]$ takové, že $|\sigma| < \delta_\varepsilon$. Označme $m = \nu(\sigma)$ a pro každé $j \in \{1, 2, \dots, m\}$ vyberme značená dělení $(\sigma^j, \xi^j), (\tilde{\sigma}^j, \tilde{\xi}^j) \in \mathcal{T}[\sigma_{j-1}, \sigma_j]$ tak, aby platilo

$$\omega(S_{f\Delta g}, [\sigma_{j-1}, \sigma_j]) < S_{f\Delta g}(\sigma^j, \xi^j) - S_{f\Delta g}(\tilde{\sigma}^j, \tilde{\xi}^j) + \frac{\varepsilon}{m}. \quad (5.23)$$

Definujme

$$\rho = \bigcup_{j=1}^m \sigma^j, \quad \tilde{\rho} = \bigcup_{j=1}^m \tilde{\sigma}^j, \quad \eta = (\xi^1, \xi^2, \dots, \xi^m) \text{ a } \tilde{\eta} = (\tilde{\xi}^1, \tilde{\xi}^2, \dots, \tilde{\xi}^m).$$

Potom

$$(\rho, \eta) \in \mathcal{T}[a, b], \quad (\tilde{\rho}, \tilde{\eta}) \in \mathcal{T}[a, b], \quad |\rho| < \delta_\varepsilon \text{ a } |\tilde{\rho}| < \delta_\varepsilon.$$

Tudíž podle (5.3) a (5.23) dostáváme

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^m \omega(S_{f\Delta g}; [\sigma_{j-1}, \sigma_j]) &< \sum_{j=1}^m [S_{f\Delta g}(\sigma^j, \xi^j) - S_{f\Delta g}(\tilde{\sigma}^j, \tilde{\xi}^j) + \frac{\varepsilon}{m}] \\ &= S_{f\Delta g}(\rho, \eta) - S_{f\Delta g}(\tilde{\rho}, \tilde{\eta}) + \varepsilon < 2\varepsilon = \tilde{\varepsilon}. \end{aligned}$$

Protože $\tilde{\varepsilon} > 0$ mohlo být libovolné, plyne odtud, že podmínka (5.21) je splněna.

β) Pro důkaz obrácené implikace předpokládejme, že platí (5.21). Dokážeme, že potom je splněna podmínka (5.3').

Mějme $\varepsilon > 0$. Nechť δ_ε je určeno podmínkou (5.21) a značená dělení $(\sigma, \xi), (\tilde{\sigma}, \tilde{\xi})$ intervalu $[a, b]$ jsou taková, že $|\sigma| < \delta_\varepsilon$ a $\tilde{\sigma} \supset \sigma$. Označme $m = \nu(\sigma)$. Pak pro každé $j \in \{1, 2, \dots, m\}$ existuje $(\sigma^j, \xi^j) \in \mathcal{T}[\sigma_{j-1}, \sigma_j]$ takové, že

$$\tilde{\sigma} = \bigcup_{j=1}^m \sigma^j, \quad \tilde{\xi} = (\xi^1, \xi^2, \dots, \xi^m).$$

Díky předpokladu (5.21) a s přihlédnutím k (5.20) dostaneme

$$\begin{aligned} & |S_{f\Delta g}(\sigma, \xi) - S_{f\Delta g}(\tilde{\sigma}, \tilde{\xi})| \\ & \leq \sum_{j=1}^m |f(\xi_j) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})] - S_{f\Delta g}(\sigma^j, \xi^j)| \\ & \leq \sum_{j=1}^m \omega(S_{f\Delta g}; [\sigma_{j-1}, \sigma_j]) < \varepsilon. \end{aligned}$$

Platí tedy (5.3').

b) Analogicky by se dokázala ekvivalence podmínky (5.22) s Bolzanovou-Cauchyovou podmínkou pro existenci (σ) RS-integrálu. Podrobný důkaz je ponechán čtenáři jako cvičení. \square

5.37 Cvičení. Dokažte tvrzení věty 5.36 pro (σ) RS-integrály.

5.38 Lemma. *Nechť $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ a $[c, d] \subset [a, b]$. Potom*

$$\omega_{[c,d]}(f) |g(d) - g(c)| \leq \omega(S_{f\Delta g}; [c, d]) \leq \omega_{[c,d]}(f) \text{var}_c^d g. \quad (5.24)$$

D ů k k a z. a) Nechť $\sigma = \rho = \{c, d\}$, $\xi, \eta \in [c, d]$ a $\xi = (\xi)$, $\eta = (\eta)$. Potom $(\sigma, \xi), (\rho, \eta) \in \mathcal{T}[c, d]$ a $|f(\xi) - f(\eta)| |g(d) - g(c)| \in \mathfrak{S}_{f\Delta g}([c, d])$ a tudíž

$$\omega_{[c,d]}(f) |g(d) - g(c)| \leq \sup \mathfrak{S}_{f\Delta g}[c, d] = \omega(S_{f\Delta g}; [c, d]).$$

b) Na druhou stranu, jestliže $(\rho, \eta), (\tau, \theta) \in \mathcal{T}[c, d]$ a položíme-li $\sigma = \rho \cup \tau$, bude $\sigma \in \mathcal{D}[c, d]$ a

$$|S_{f\Delta g}(\rho, \eta) - S_{f\Delta g}(\tau, \theta)| = \left| \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} (f(\eta'_j) - f(\theta'_j)) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})] \right|,$$

kde $\eta'_j = \eta_k$ když $[\sigma_{j-1}, \sigma_j] \subset [\rho_{k-1}, \rho_k]$ a $\theta'_j = \theta_k$ když $[\sigma_{j-1}, \sigma_j] \subset [\tau_{k-1}, \tau_k]$. Odtud dostáváme dále

$$\begin{aligned} |S_{f\Delta g}(\rho, \eta) - S_{f\Delta g}(\tau, \theta)| & \leq \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} |f(\eta'_j) - f(\theta'_j)| |g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})| \\ & \leq \omega_{[c,d]}(f) V(g, \sigma) \leq \omega_{[c,d]}(f) \text{var}_c^d g, \end{aligned}$$

neboli

$$\omega(S_{f\Delta g}; [c, d]) = \sup \mathfrak{S}_{f\Delta g}[c, d] \leq \omega_{[c,d]}(f) \text{var}_c^d g.$$

Dokázali jsme platnost nerovností (5.24). \square

5.39 Poznámka. Je-li $\text{var}_c^d g = \infty$, pak je ovšem druhá z nerovností v (5.24) triviální.

Následující tvrzení poskytuje další nutné a postačující podmínky pro existenci obou typů RS-integrálů.

5.40 Věta. *Nechť $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $g \in \mathbb{BV}[a, b]$ a $v(x) = \text{var}_a^x g$ pro $x \in [a, b]$. Potom:*

- (i) *Integrál $(\sigma) \int_a^b f dg$ existuje tehdy a jen tehdy, když existuje integrál $(\sigma) \int_a^b f dv$.*
(ii) *Je-li f ohraničená na $[a, b]$, pak integrál $(\delta) \int_a^b f dg$ existuje tehdy a jen tehdy, když existuje integrál $(\delta) \int_a^b f dv$.*

D ů k a z. a) Pro každý interval $[c, d] \subset [a, b]$ máme $\text{var}_c^d v = v(d) - v(c)$. Tudíž podle lemmatu 5.38 musí platit

$$\sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \omega_{[\sigma_{j-1}, \sigma_j]}(f) [v(\sigma_j) - v(\sigma_{j-1})] = \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \omega(S_{f \Delta v}; [\sigma_{j-1}, \sigma_j])$$

pro libovolné dělení $\sigma \in \mathcal{D}[a, b]$. Podle lemmatu 5.38 tedy dále dostáváme

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \omega(S_{f \Delta g}; [\sigma_{j-1}, \sigma_j]) &\leq \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \omega_{[\sigma_{j-1}, \sigma_j]}(f) \text{var}_{\sigma_{j-1}}^{\sigma_j} g \\ &= \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \omega_{[\sigma_{j-1}, \sigma_j]}(f) [v(\sigma_j) - v(\sigma_{j-1})] = \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \omega(S_{f \Delta v}; [\sigma_{j-1}, \sigma_j]). \end{aligned}$$

Nerovnost

$$\sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \omega(S_{f \Delta g}; [\sigma_{j-1}, \sigma_j]) \leq \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \omega(S_{f \Delta v}; [\sigma_{j-1}, \sigma_j])$$

tedy platí pro každé dělení $\sigma \in \mathcal{D}[a, b]$. Pomocí věty 5.36 nyní už snadno dokážeme, že z existence integrálu $\int_a^b f dv$ plyne existence integrálu $\int_a^b f dg$ (a to pro oba typy RS-integrálu).

b) Předpokládejme, že existuje integrál $(\sigma) \int_a^b f dg$. Dokážeme, že pak existuje také integrál $(\sigma) \int_a^b f dv$.

Buď dáno $\varepsilon > 0$. Podle věty 5.36 existuje dělení $\sigma_\varepsilon \in \mathcal{D}[a, b]$ takové, že

$$\sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \omega(S_{f \Delta g}; [\sigma_{j-1}, \sigma_j]) < \varepsilon \tag{5.25}$$

platí pro každé jeho zjemnění $\sigma \supset \sigma_\varepsilon$. Zřejmě můžeme též předpokládat, že také

$$0 \leq \text{var}_a^b g - V(g, \sigma) < \varepsilon \quad (5.26)$$

platí pro každé dělení σ takové, že $\sigma \supset \sigma_\varepsilon$. (Zdůvodněte!)

Nechť $\sigma \in \mathcal{D}[a, b]$ a $\sigma \supset \sigma_\varepsilon$. Potom podle lemmatu 5.38 máme

$$\sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \omega(S_f \Delta v; [\sigma_{j-1}, \sigma_j]) \leq \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \omega_{[\sigma_{j-1}, \sigma_j]}(f) \text{var}_{\sigma_{j-1}}^{\sigma_j} g$$

a dále, podle (5.25), (5.26) a lemmatu 5.38

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \omega(S_f \Delta v; [\sigma_{j-1}, \sigma_j]) &\leq \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \omega_{[\sigma_{j-1}, \sigma_j]}(f) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})] \\ &\quad + \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \omega_{[\sigma_{j-1}, \sigma_j]}(f) (\text{var}_{\sigma_{j-1}}^{\sigma_j} g - [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})]) \\ &< \varepsilon + \omega_{[a,b]}(f) (\text{var}_a^b g - V(g, \sigma)) < \varepsilon (1 + \omega_{[a,b]}(f)). \end{aligned}$$

Podle věty 5.36 můžeme tedy uzavřít, že existuje integrál $(\sigma) \int_a^b f \, d v$.

c) Zbývá dokázat, že je-li funkce f ohraničená na $[a, b]$, pak z existence integrálu $(\delta) \int_a^b f \, d g$ plyne, že existuje také integrál $(\delta) \int_a^b f \, d v \in \mathbb{R}$.

Nechť je tedy f ohraničená na $[a, b]$ a nechť existuje integrál $(\delta) \int_a^b f \, d g$. Potom podle vět 5.6 a 5.30 existuje $(\sigma) \int_a^b f \, d g$ a funkce f, g nemají společný bod nespojitosti v (a, b) . Dále podle lemmatu 2.24 také funkce f, v nemají společný bod nespojitosti v (a, b) . Konečně, protože podle části b) tohoto důkazu existuje integrál $(\sigma) \int_a^b f \, d v$, existence integrálu $(\delta) \int_a^b f \, d v$ plyne z důsledku 5.32. (Protože $g \in \mathbb{BV}[a, b]$, jsou funkce g i v ohraničené na $[a, b]$.) \square

5.41 Věta. *Nechť $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $g \in \mathbb{BV}[a, b]$ a existuje integrál $\int_a^b f \, d g$. Potom existuje také integrál $\int_a^b |f| \, d g$.*

D ů k a z. Podle věty 2.14 a lemmatu 5.12 se můžeme omezit na případ, že g je neklesající na $[a, b]$. Potom je $\text{var}_c^d g = g(d) - g(c)$ pro libovolná $c, d \in [a, b]$

taková, že $c \leq d$. Podle lemmatu 5.38 tedy pro libovolné dělení $\sigma \in \mathcal{D}[a, b]$ platí

$$\sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \omega(S_{f\Delta g}; [\sigma_{j-1}, \sigma_j]) = \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \omega_{[\sigma_{j-1}, \sigma_j]}(f) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})]$$

a

$$\sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \omega(S_{|f|\Delta g}; [\sigma_{j-1}, \sigma_j]) = \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \omega_{[\sigma_{j-1}, \sigma_j]}(|f|) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})].$$

Na druhou stranu, zřejmě

$$||f(x)| - |f(y)|| \leq |f(x) - f(y)| \quad \text{pro libovolná } x, y \in [a, b].$$

Máme tedy $\omega_{[c,d]}(|f|) \leq \omega_{[c,d]}(f)$ pro libovolný interval $[c, d] \subset [a, b]$. Tudíž

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \omega(S_{|f|\Delta g}; [\sigma_{j-1}, \sigma_j]) &= \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \omega_{[\sigma_{j-1}, \sigma_j]}(|f|) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})] \\ &\leq \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \omega_{[\sigma_{j-1}, \sigma_j]}(f) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})] = \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \omega(S_{f\Delta g}; [\sigma_{j-1}, \sigma_j]). \end{aligned}$$

Tvrzení věty nyní už plyne okamžitě z věty 5.36. □

Přímým důsledkem lemmatu 5.10 a vět 5.40 a 5.41 je následující tvrzení.

5.42 Důsledek. *Nechť $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $g \in \mathbb{BV}[a, b]$ a $v(x) = \text{var}_a^x g$ pro $x \in [a, b]$. Potom:*

(i) *Jestliže existuje integrál $(\sigma) \int_a^b f \, dg$, pak existuje také $(\sigma) \int_a^b |f| \, dv$ a platí*

$$\left| (\sigma) \int_a^b f \, dg \right| \leq (\sigma) \int_a^b |f| \, dv \leq \|f\| \text{var}_a^b g.$$

(ii) *Jestliže existuje integrál $(\delta) \int_a^b f \, dg$ a funkce f je ohraničená na $[a, b]$, pak existuje také integrál $(\delta) \int_a^b |f| \, dv$ a platí*

$$\left| (\delta) \int_a^b f \, dg \right| \leq (\delta) \int_a^b |f| \, dv \leq \|f\| \text{var}_a^b g. \quad \square$$

5.4 Substituce

Všechna tvrzení tohoto odstavce platí ve stejném znění pro oba typy RS-integrálu. Začneme dalším důsledkem definice 5.35.

5.43 Lemma. *Jestliže existuje integrál $\int_a^b f \, dg$ a (σ, ξ) je libovolné značené dělení intervalu $[a, b]$, pak platí*

$$\left| \int_a^b f \, dg - S(\sigma, \xi) \right| \leq \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \omega(S_{f\Delta g}; [\sigma_{j-1}, \sigma_j]). \quad (5.27)$$

Důkaz. Označme $m = \nu(\sigma)$. Buď dáno $\varepsilon > 0$. Nezávisle na tom, o jaký typ RS-integrálu se jedná, můžeme zvolit značené dělení $(\tilde{\sigma}, \tilde{\xi}) \in \mathcal{T}[a, b]$ tak, aby bylo $\tilde{\sigma} \supset \sigma$ a

$$\left| \int_a^b f \, dg - S(\tilde{\sigma}, \tilde{\xi}) \right| < \varepsilon.$$

Protože $\tilde{\sigma}$ je zjemněním σ , můžeme ho rozdělit tak, že bude

$$\tilde{\sigma} = \bigcup_{j=1}^m \tilde{\sigma}^j, \quad \text{kde } \tilde{\sigma}^j \in \mathcal{D}[\sigma_{j-1}, \sigma_m] \text{ pro } j = 1, 2, \dots, m.$$

Podobně $\tilde{\xi} = (\tilde{\xi}^1, \tilde{\xi}^2, \dots, \tilde{\xi}^j)$, kde $\tilde{\xi}^j$ jsou reálné vektory takové, že $(\tilde{\sigma}^j, \tilde{\xi}^j) \in \mathcal{T}[\sigma_{j-1}, \sigma_j]$ pro $j = 1, 2, \dots, m$.

Máme tedy

$$\begin{aligned} & \left| \int_a^b f \, dg - S(\sigma, \xi) \right| \\ & \leq \left| \int_a^b f \, dg - S(\tilde{\sigma}, \tilde{\xi}) \right| + \left| S(\tilde{\sigma}, \tilde{\xi}) - S(\sigma, \xi) \right| \\ & < \varepsilon + \sum_{j=1}^m |f(\xi_j) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})] - S(\tilde{\sigma}^j, \tilde{\xi}^j)| \\ & < \varepsilon + \sum_{j=1}^m \omega(S_{f\Delta g}; [\sigma_{j-1}, \sigma_j]). \end{aligned}$$

Protože $\varepsilon > 0$ bylo libovolné, znamená to, že platí (5.27). \square

5.44 Důsledek. *Jestliže integrál $\int_a^b f \, dg$ existuje a $[c, d] \subset [a, b]$, pak pro každé $\xi \in [c, d]$ platí*

$$\left| \int_c^d f \, dg - f(\xi) [g(d) - g(c)] \right| \leq \omega(S_{f\Delta g}; [c, d]).$$

Následující speciální forma věty o substituci je také důsledkem lemmatu 5.43.

5.45 Věta (SUBSTITUCE). *Nechť $f, g, h: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, přičemž f je ohraničená na intervalu $[a, b]$ a integrál $\int_a^b g \, dh$ existuje. Potom jeden z integrálů*

$$\int_a^b f(x) \, d\left[\int_a^x g \, dh\right] \quad \text{a} \quad \int_a^b f g \, dh$$

existuje (má konečnou hodnotu) právě tehdy, když existuje i ten druhý. V takovém případě pak platí

$$\int_a^b f(x) \, d\left[\int_a^x g \, dh\right] = \int_a^b f g \, dh. \quad (5.28)$$

Důkaz z. Nejprve si všimněme, že z existence integrálu $\int_a^b g \, dh$ plyne, že funkce

$$w: x \in [a, b] \rightarrow w(x) = \int_a^x g \, dh$$

je definována na celém intervalu $[a, b]$ a má konečné hodnoty pro každé $x \in [a, b]$ (viz větu 5.16).

Pro libovolné značené dělení (σ, ξ) intervalu $[a, b]$ máme

$$\begin{aligned} & |S_{fg\Delta h}(\sigma, \xi) - S_{f\Delta w}(\sigma, \xi)| \\ &= \left| \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} f(\xi_j) g(\xi_j) [h(\sigma_j) - h(\sigma_{j-1})] - \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} f(\xi_j) [w(\sigma_j) - w(\sigma_{j-1})] \right| \\ &\leq \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} |f(\xi_j)| \left| g(\xi_j) [h(\sigma_j) - h(\sigma_{j-1})] - \int_{\sigma_{j-1}}^{\sigma_j} g \, dh \right| \\ &\leq \|f\| \left(\sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \left| g(\xi_j) [h(\sigma_j) - h(\sigma_{j-1})] - \int_{\sigma_{j-1}}^{\sigma_j} g \, dh \right| \right). \end{aligned}$$

Podle důsledku 5.44 dostáváme dále

$$|S_{fg\Delta h}(\sigma, \xi) - S_{f\Delta w}(\sigma, \xi)| \leq \|f\| \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \omega(S_{g\Delta h}; [\sigma_{j-1}, \sigma_j]).$$

Odtud podle věty 5.36 už plyne relace (5.28). (Přesvědčte se, že důkaz opravdu umíte dokončit.) \square

Položíme-li ve větě 5.45 $h(t) \equiv t$, dostaneme následující tvrzení.

5.46 Důsledek. Je-li f ohraničená na $[a, b]$, $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ je riemannovsky integrovatelná na $[a, b]$ a $p(x) = \int_a^x g(t) \, dt$, pak jeden z integrálů

$$\int_a^b f \, d p \quad \text{a} \quad \int_a^b f(x) g(x) \, dx$$

existuje právě tehdy, když existuje i ten druhý. V takovém případě pak platí

$$\int_a^b f \, d p = \int_a^b f(x) g(x) \, dx.$$

5.47 Věta (DRUHÁ O SUBSTITUCI). *Předpokládejme, že funkce $\phi: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ je ryze monotónní a spojitá na $[\alpha, \beta]$ a zobrazuje $[\alpha, \beta]$ na interval $[a, b]$. Potom pro libovolné funkce $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ platí:*

$$\begin{aligned} & \text{existuje-li } \int_a^b f(x) \, d[g(x)], \text{ existuje také } \int_\alpha^\beta f(\phi(x)) \, d[g(\phi(x))] \\ & \text{a} \\ & \pm \int_\alpha^\beta f(\phi(x)) \, d[g(\phi(x))] = \int_a^b f(x) \, d[g(x)], \end{aligned} \quad (5.29)$$

kde „+“ platí, je-li ϕ rostoucí a „-“ platí, je-li ϕ klesající.

Důkaz. Předpokládejme například, že ϕ je klesající. Potom $b = \phi(\alpha)$ a $a = \phi(\beta)$. Pro dané značené dělení (σ, ξ) intervalu $[\alpha, \beta]$ položeme

$$\rho_{\nu(\sigma)-j} = \phi(\sigma_j) \quad \text{a} \quad \eta_{\nu(\sigma)-j} = \phi(\xi_j) \quad \text{pro } j = 1, 2, \dots, \nu(\sigma).$$

Potom (ρ, η) , $\rho = \{\rho_0, \rho_1, \dots, \rho_{\nu(\sigma)}\}$, $\eta = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{\nu(\sigma)})$ je značené dělení intervalu $[a, b]$. Píšeme $\rho = \phi(\sigma)$ a $\eta = \phi(\xi)$. Zřejmě, je-li $\sigma \supset \sigma'$, pak je také $\phi(\sigma) \supset \phi(\sigma')$. Podobně, protože ϕ je stejnoměrně spojitá na $[\alpha, \beta]$, platí $|\phi(\sigma)| \rightarrow 0$, jakmile $|\sigma| \rightarrow 0$. Navíc

$$\sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} f(\phi(\xi_j)) [g(\phi(\sigma_j)) - g(\phi(\sigma_{j-1}))] = - \sum_{i=1}^{\nu(\rho)} f(\eta_j) [g(\rho_j) - g(\rho_{j-1})]$$

platí pro každé $(\sigma, \xi) \in \mathcal{T}[\alpha, \beta]$. Teď už zajisté každý čtenář, který pozorně prostudoval většinu důkazů této kapitoly, samostatně dokončí důkaz rovnosti (5.29) pro oba integrály (včetně případu, že ϕ je nerostoucí). \square

Další variantou věty o substituci je následující věta. Její důkaz můžeme ponechat čtenáři jako cvičení.

5.48 Věta. *Nechť funkce $\phi: [a, b] \rightarrow [\phi(a), \phi(b)]$ je rostoucí a spojitá na $[a, b]$, $\psi: [\phi(a), \phi(b)] \rightarrow [a, b]$ je inverzní k ϕ a nechť $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Pak existuje-li jeden z integrálů*

$$(\sigma) \int_a^b f(x) \, dx, \quad (\sigma) \int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f(\psi(x)) \, d[\psi(x)],$$

existuje i ten druhý a platí rovnost

$$(\sigma) \int_a^b f(x) \, dx = (\sigma) \int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f(\psi(x)) \, d[\psi(x)].$$

5.49 Cvičení. Dokažte větu 5.48. Zformulujte a dokažte analogické tvrzení pro (δ) RS-integrály.

5.5 Integrace per-partes

Následující tvrzení je zobecněním věty o integraci per-partes pro Riemannův integrál. Platí ve stejném znění pro oba typy RS-integrálu.

5.50 Věta (VĚTA O INTEGRACI PER-PARTES). *Existuje-li jeden z integrálů*

$$\int_a^b f \, dg, \quad \int_a^b g \, df,$$

existuje i druhý a platí

$$\int_a^b f \, dg + \int_a^b g \, df = f(b)g(b) - f(a)g(a). \quad (5.30)$$

D ů k a z. a) Buď dáno libovolné značené dělení (σ, ξ) intervalu $[a, b]$. Položme $m = \nu(\sigma)$. Přeargiováním členů v součtu $S_{f\Delta g}(\sigma, \xi)$ dostaneme

$$\begin{aligned} S_{f\Delta g}(\sigma, \xi) &= f(\xi_1)[g(\sigma_1) - g(a)] + f(\xi_2)[g(\sigma_2) - g(\sigma_1)] \\ &\quad + \cdots + f(\xi_m)[g(b) - g(\sigma_{m-1})] \\ &= -f(a)g(a) - [f(\xi_1) - f(a)]g(a) - [f(\xi_2) - f(\sigma_1)]g(\sigma_1) \\ &\quad - [f(\sigma_1) - f(\xi_1)]g(\sigma_1) - \cdots - [f(\xi_m) - f(\sigma_{m-1})]g(\sigma_{m-1}) \\ &\quad - [f(\sigma_{m-1}) - f(\xi_{m-1})]g(\sigma_{m-1}) \\ &\quad - [f(b) - f(\xi_m)]g(b) + f(b)g(b) \\ &= f(b)g(b) - f(a)g(a) - S_{g\Delta f}(\sigma', \xi') \end{aligned}$$

neboli

$$S_{f\Delta g}(\sigma, \xi) = f(b)g(b) - f(a)g(a) - S_{g\Delta f}(\sigma', \xi'), \quad (5.31)$$

kde

$$\begin{aligned} \sigma' &= \{a, \xi_1, \sigma_1, \xi_2, \sigma_2, \dots, \sigma_{m-1}, \xi_m, b\}, \\ \xi' &= (a, \sigma_1, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_2, \dots, \sigma_{m-1}, \sigma_{m-1}, b), \end{aligned}$$

$(\sigma', \xi') \in \mathcal{T}[a, b]$ a σ' je zjemněním σ . (Stane-li se, že $\xi_j = \sigma_{j-1}$, resp. $\xi_j = \sigma_j$ pro nějaké j , musíme ovšem tyto body ξ_j v σ' a jim odpovídající body v ξ' vynechat.)

b) Předpokládejme, že existuje integrál $(\sigma) \int_a^b g \, d f$.

Bud' dáno $\varepsilon > 0$. Zvolme dělení $\sigma_\varepsilon \in \mathcal{D}[a, b]$ tak, aby pro každé jeho zjemnění σ' a všechna příslušná značená dělení $(\sigma', \xi') \in \mathcal{T}[a, b]$ platilo

$$\left| S_{g\Delta f}(\sigma', \xi') - (\sigma) \int_a^b g \, d f \right| < \varepsilon.$$

Podle (5.31) pro každé $\sigma \supset \sigma_\varepsilon$ a příslušné značené dělení (σ, ξ) platí

$$\begin{aligned} S_{f\Delta g}(\sigma, \xi) - f(b)g(b) + f(a)g(a) + (\sigma) \int_a^b g \, d f \\ = (\sigma) \int_a^b g \, d f - S_{g\Delta f}(\sigma', \xi'), \end{aligned}$$

kde $\sigma' \supset \sigma \supset \sigma_\varepsilon$, a tudíž

$$\begin{aligned} \left| S_{f\Delta g}(\sigma, \xi) - f(b)g(b) + f(a)g(a) + (\sigma) \int_a^b g \, d f \right| \\ = \left| (\sigma) \int_a^b g \, d f - S_{g\Delta f}(\sigma', \xi') \right| < \varepsilon. \end{aligned}$$

Odtud plyne existence integrálu $(\sigma) \int_a^b f \, d g$ a relace (5.30). To, že z existence integrálu $(\sigma) \int_a^b f \, d g$ plyne existence integrálu $(\sigma) \int_a^b g \, d f$ a platí rovnost (5.30), by se dokazovalo analogicky.

c) Tvrzení věty pro (δ) RS-integrály plyne ze vztahu (5.31) podobně jako v druhé části důkazu pro (σ) RS-integrály a detailní důkaz můžeme nechat čtenáři jako cvičení. \square

5.51 Cvičení. Dokažte větu 5.50 pro (δ) RS-integrály.

5.6 Stejněměrná konvergence a existence integrálu

Až na větu 5.55 a cvičení 5.56 všechna tvrzení tohoto odstavce platí ve stejném znění pro oba typy RS-integrálu.

5.52 Věta. Necht' $g \in \mathbb{BV}[a, b]$, $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ je ohraničená a necht' posloupnost funkcí $f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, je taková, že integrál $\int_a^b f_n \, d g$ existuje pro každé

$n \in \mathbb{N}$ a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\| = 0. \quad (5.32)$$

Potom existuje také integrál $\int_a^b f \, dg$ a platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n \, dg = \int_a^b f \, dg. \quad (5.33)$$

Důk a z. a) Jestliže je $\text{var}_a^b g = 0$, pak podle lemmatu 2.13 musí být g konstantní na $[a, b]$ a tvrzení věty je evidentní. Předpokládejme tedy, že $\text{var}_a^b g > 0$.

Nechť je dáno $\varepsilon > 0$. Vzhledem k předpokladu (5.32) můžeme zvolit $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tak, aby platilo

$$n \geq n_\varepsilon \implies \left(\|f_n - f\| < \frac{\varepsilon}{\text{var}_a^b g} \right) \text{ a } \left(\|f_n\| < \|f\| + 1 \right). \quad (5.34)$$

Dále za našich předpokladů je podle lemmatu 5.10 (i)

$$\left| \int_a^b f_n \, dg \right| \leq \|f_n\| \text{var}_a^b g \leq (\|f\| + 1) \text{var}_a^b g$$

pro $n \geq n_\varepsilon$. Můžeme tedy vybrat rostoucí posloupnost $\{n_k\} \subset \mathbb{N}$ a $I \in \mathbb{R}$ tak, aby platilo

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^b f_{n_k} \, dg = I.$$

Speciálně existuje $k_\varepsilon \in \mathbb{N}$ takové, že

$$n_{k_\varepsilon} \geq n_\varepsilon \text{ a } \left| \int_a^b f_{n_{k_\varepsilon}} \, dg - I \right| < \varepsilon. \quad (5.35)$$

Dále nechť σ_ε je takové dělení intervalu $[a, b]$, že

$$\left((\sigma, \xi) \in \mathcal{T}[a, b] \text{ a } \sigma \supset \sigma_\varepsilon \right) \implies \left| S_{f_{n_{k_\varepsilon}} \Delta g}(\sigma, \xi) - \int_a^b f_{n_{k_\varepsilon}} \, dg \right| < \varepsilon. \quad (5.36)$$

Protože je $n_{k_\varepsilon} \geq n_\varepsilon$ (viz (5.35)), plyne z (5.34), že pro každé značené dělení (σ, ξ) , kde σ je zjemněním σ_ε , platí

$$\left| S_{f \Delta g}(\sigma, \xi) - S_{f_{n_{k_\varepsilon}} \Delta g}(\sigma, \xi) \right| \leq \|f - f_{n_{k_\varepsilon}}\| \text{var}_a^b g < \varepsilon.$$

Vzhledem k (5.35)–(5.36) tedy dostáváme

$$\begin{aligned} \left| S_{f \Delta g}(\sigma, \xi) - I \right| &\leq \left| S_{f \Delta g}(\sigma, \xi) - S_{f_{n_{k_\varepsilon}} \Delta g}(\sigma, \xi) \right| \\ &\quad + \left| S_{f_{n_{k_\varepsilon}} \Delta g}(\sigma, \xi) - \int_a^b f_{n_{k_\varepsilon}} \, dg \right| + \left| \int_a^b f_{n_{k_\varepsilon}} \, dg - I \right| < 3\varepsilon \end{aligned}$$

pro každé značené dělení (σ, ξ) , kde $\sigma \supset \sigma_\varepsilon$. Odtud okamžitě plyne, že platí

$$\int_a^b f \, dg = I.$$

Konečně, protože podle lemmat 5.10 a 5.12 máme

$$\left| \int_a^b f_n \, dg - \int_a^b f \, dg \right| \leq \|f_n - f\| (\text{var}_a^b g),$$

rovnost (5.33) nyní plyne z předpokladu (5.32). Důkaz byl proveden pro (σ) RS-integrál.

b) Důkaz pro (δ) RS-integrály je analogický a ponecháváme ho jako cvičení. \square

5.53 Cvičení. Dokažte tvrzení věty 5.52 pro (δ) RS-integrály.

5.54 Věta. *Nechť $f \in \mathbb{C}[a, b]$ a $g \in \mathbb{BV}[a, b]$. Potom existují oba integrály*

$$\int_a^b f \, dg \quad \text{a} \quad \int_a^b g \, df.$$

D ů k a z . Vzhledem ke větám 2.14, 5.6 a 5.50 a lemmatu 5.12 stačí dokázat existenci integrálu $(\delta) \int_a^b f \, dg$ pro případ, že g je neklesající na $[a, b]$.

Nechť je tedy f spojitá na $[a, b]$, g neklesající na $[a, b]$ a $\varepsilon > 0$ je dáno.

Je-li $g(b) = g(a)$, pak g je nutně konstantní na $[a, b]$, a tudíž $(\delta) \int_a^b f \, dg = 0$. Bez újmy na obecnosti můžeme tedy předpokládat, že $g(b) - g(a) > 0$. Dále využijeme toho, že každá funkce spojitá na kompaktním intervalu je na tomto intervalu také stejnoměrně spojitá. Existuje tedy $\delta_\varepsilon > 0$ takové, že

$$\left. \begin{aligned} |f(x) - f(y)| &< \frac{\varepsilon}{g(b) - g(a)} \\ \text{pro všechna } x, y \in [a, b] \text{ taková, že } |x - y| &< \delta_\varepsilon. \end{aligned} \right\} \quad (5.37)$$

Mějme dvě značená dělení $(\sigma, \xi), (\sigma', \xi')$ intervalu $[a, b]$ taková, že $|\sigma| < \delta_\varepsilon$ a $\sigma' \supset \sigma$. Ukážeme, že platí $|S(\sigma, \xi) - S(\sigma', \xi')| < \varepsilon$. Podle věty 5.14 to už bude znamenat, že existuje $(\delta) \int_a^b f \, dg$. (Viz také cvičení 5.15 (ii).)

Nechť $\nu(\sigma) = m$. Označme prvky dělení σ' a složky vektoru ξ' tak, že bude

$$\begin{aligned}\sigma' &= \{\sigma_0, \sigma_1^1, \dots, \sigma_{n_1-1}^1, \sigma_1, \sigma_1^2, \dots, \sigma_{m-1}, \sigma_1^m, \dots, \sigma_{n_m-1}^m, \sigma_m\}, \\ \xi' &= (\xi_1^1, \dots, \xi_{n_1}^1, \xi_1^2, \dots, \xi_1^m, \dots, \xi_{n_m}^m).\end{aligned}$$

Potom

$$S(\sigma, \xi) = \sum_{j=1}^m f(\xi_j) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})] = \sum_{j=1}^m f(\xi_j) \sum_{i=1}^{n_j} [g(\sigma_i^j) - g(\sigma_{i-1}^j)]$$

a

$$|S(\sigma, \xi) - S(\sigma', \xi')| \leq \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^{n_j} |f(\xi_j) - f(\xi_i^j)| [g(\sigma_i^j) - g(\sigma_{i-1}^j)],$$

kde klademe $\sigma_0^j = \sigma_{j-1}$ a $\sigma_{n_j}^j = \sigma_j$ pro $j = 1, 2, \dots, m$. Protože

$$|\xi_j - \xi_i^j| < |\sigma| < \delta_\varepsilon \text{ pro všechna } j \in \{1, 2, \dots, m\} \text{ a } i \in \{1, 2, \dots, n_j\},$$

odvodíme pomocí nerovnosti (5.37) vztah

$$\begin{aligned}|S(\sigma, \xi) - S(\sigma', \xi')| &< \frac{\varepsilon}{g(b) - g(a)} \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^{n_j} [g(\sigma_i^j) - g(\sigma_{i-1}^j)] \\ &= \frac{\varepsilon}{g(b) - g(a)} [g(b) - g(a)] = \varepsilon.\end{aligned}$$

□

5.55 Věta. (i) *Jestliže $f \in \mathbb{BV}[a, b]$ je zleva spojitá na intervalu $(a, b]$, pak pro každou funkci $g \in \mathbb{G}[a, b]$ zprava spojitou na intervalu $[a, b)$ existují oba integrály*

$$(\sigma) \int_a^b f dg \quad \text{a} \quad (\sigma) \int_a^b g df.$$

(ii) *Jestliže $f \in \mathbb{BV}[a, b]$ je zprava spojitá na intervalu $[a, b)$, pak pro každou funkci $g \in \mathbb{G}[a, b]$ zleva spojitou na intervalu $(a, b]$ existují oba integrály*

$$(\sigma) \int_a^b f dg \quad \text{a} \quad (\sigma) \int_a^b g df.$$

D ů k a z. Díky větě o integraci per-partes (věta 5.50) stačí v obou případech dokázat existenci integrálu $(\sigma) \int_a^b g df$.

Nechť $g \in \mathbb{G}[a, b]$ je zprava spojitá na intervalu $[a, b)$, tj. $g \in \widetilde{\mathbb{G}}_{\mathbb{R}}[a, b]$ (viz

(4.2)). Podle lemmat 4.17 a 4.18 máme

$$\widetilde{\mathcal{G}}_{\mathbb{R}}[a, b] = \overline{\widetilde{\mathcal{G}}_{\mathbb{R}}[a, b] \cap \mathbb{S}[a, b]} = \overline{\text{Lin}(\chi_{[\tau, b]}, \tau \in [a, b])}.$$

Podle lemmatu 5.12 a věty 5.52 tedy stačí dokázat, že integrál $(\sigma) \int_a^b g \, df$ existuje, jestliže $g = \chi_{[\tau, b]}$ pro nějaké $\tau \in [a, b]$.

Předpokládejme zprvu, že $g = \chi_{[\tau, b]}$ a $\tau \in (a, b]$. Potom (viz cvičení 5.5 (ii))

$$(\sigma) \int_{\tau}^b g \, df = f(b) - f(\tau).$$

Dále nechť je dáno libovolné značené dělení (σ, ξ) intervalu $[a, \tau]$. Označme $m = \nu(\sigma)$, pak

$$S(\sigma, \xi) = \begin{cases} 0 & \text{je-li } \xi_m < \tau, \\ f(\tau) - f(\sigma_{m-1}) & \text{je-li } \xi_m = \tau. \end{cases}$$

Díky spojitosti funkce f v bodě τ zleva můžeme tedy k danému $\varepsilon > 0$ vždy najít dělení σ_ε takové, že bude

$|S(\sigma, \xi)| < \varepsilon$ pro všechna $(\sigma, \xi) \in \mathcal{T}[a, \tau]$ taková, že $\sigma \supset \sigma_\varepsilon$, tj.

$$(\sigma) \int_a^{\tau} g \, df = 0 \quad \text{a} \quad (\sigma) \int_a^b g \, df = f(b) - f(\tau).$$

Je-li $g = \chi_{[a, b]}$ neboli $g = 1$ na $[a, b]$, pak je ovšem (viz cvičení 5.5 (ii))

$$\int_a^b g \, df = f(b) - f(a).$$

Tvrzení (i) platí. Druhé tvrzení by se dokazovalo podobně. □

5.56 Cvičení. (i) Pro oba typy RS-integrálu dokažte:

Jestliže $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ má konečnou variaci na $[a, b]$ a je spojitá na $[a, b]$, pak integrál $\int_a^b f \, dg$ existuje pro každou funkci g regulovanou na $[a, b]$.

(ii) Proveďte podrobný důkaz tvrzení (ii) věty 5.55.

5.57 Poznámka. Připomeňme ještě bez důkazu jeden ze známých zajímavých existenčních výsledků. Dokázal ho v roce 1936 jeden z klasiků teorie integrace L. C. Young (viz [64]).

Jestliže funkce $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ a $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ splňují podmínky

$$|f(x) - f(y)| \leq K |x - y|^\alpha \quad a \quad |g(x) - g(y)| \leq L |x - y|^\beta \quad \text{pro } x, y \in [a, b],$$

kde $K, L \in [0, \infty)$, $\alpha, \beta \in (0, \infty)$, $\alpha + \beta > 1$, pak existuje integrál $(\delta) \int_a^b f \, dg$.

5.7 Bodová konvergence

Důkaz věty o konvergenci posloupnosti integrálů $\int_a^b f_n \, dg$, ve které by nebyla nutná stejnoměrná konvergence $f_n \rightrightarrows f$, nám usnadní zavedení Darbouxových horních a dolních integrálů.

5.58 Definice. Nechť $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ je neklesající na $[a, b]$. Pro libovolné dělení σ intervalu $[a, b]$ a funkci $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ položme

$$\bar{S}_{f\Delta g}(\sigma) = \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \left(\sup_{x \in [\sigma_{j-1}, \sigma_j]} f(x) \right) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})]$$

$$\underline{S}_{f\Delta g}(\sigma) = \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \left(\inf_{x \in [\sigma_{j-1}, \sigma_j]} f(x) \right) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})]$$

a definujeme

$$\overline{\int_a^b} f \, dg = \inf \left\{ \bar{S}_{f\Delta g}(\sigma) : \sigma \in \mathcal{D}[a, b] \right\}$$

a

$$\underline{\int_a^b} f \, dg = \sup \left\{ \underline{S}_{f\Delta g}(\sigma) : \sigma \in \mathcal{D}[a, b] \right\}.$$

Veličiny $\overline{\int_a^b} f \, dg$ resp. $\underline{\int_a^b} f \, dg$ nazýváme *horní, resp. dolní integrál* f vzhledem ke g .

5.59 Lemma. Nechť $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ je neklesající na $[a, b]$ a $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Potom platí

$$\overline{\int_a^b} f \, dg = \underline{\int_a^b} f \, dg = I \in \mathbb{R} \tag{5.38}$$

právě tehdy, když $(\sigma) \int_a^b f \, dg = I$.

D ů k a z. a) Předpokládejme, že platí (5.38). Protože g je neklesající, plyne přímo z definice 5.58, že

$$\underline{S}_{f\Delta g}(\sigma) \leq S_{f\Delta g}(\sigma, \xi) \leq \overline{S}_{f\Delta g}(\sigma) \quad \text{pro } \sigma \in \mathcal{D}[a, b] \text{ a } \xi \in \tau(\sigma),$$

a

$$\tilde{\sigma} \supset \sigma \implies \left(\underline{S}_{f\Delta g}(\tilde{\sigma}) \geq \underline{S}_{f\Delta g}(\sigma) \text{ a } \overline{S}_{f\Delta g}(\tilde{\sigma}) \leq \overline{S}_{f\Delta g}(\sigma) \right).$$

Pomocí těchto základních faktů není obtížné ověřit (proved'te !), že pro každé $k \in \mathbb{N}$ existuje dělení $\sigma^k \in \mathcal{D}[a, b]$ takové, že nerovnosti

$$I - \frac{1}{k} < \underline{S}_{f\Delta g}(\sigma^k) \leq S_{f\Delta g}(\sigma^k, \xi^k) \leq \overline{S}_{f\Delta g}(\sigma^k) < I + \frac{1}{k}$$

platí pro každé $\xi^k \in \tau(\sigma^k)$. Pro dané $\varepsilon > 0$ zvolme $k_\varepsilon > \frac{1}{\varepsilon}$ a položme $\sigma_\varepsilon = \sigma^{k_\varepsilon}$. Potom bude pro každé $\sigma \supset \sigma_\varepsilon$ a $\xi \in \tau(\sigma)$ platit

$$I - \varepsilon < \underline{S}(\sigma^{k_\varepsilon}) \leq \underline{S}(\sigma) \leq S(\sigma, \xi) \leq \overline{S}(\sigma) \leq \overline{S}(\sigma^{k_\varepsilon}) < I + \varepsilon.$$

Odtud plyne rovnost $(\sigma) \int_a^b f \, dg = I$.

b) Předpokládejme nyní, že existuje $(\sigma) \int_a^b f \, dg$. Buď dáno $\varepsilon > 0$. Podle věty 5.14 existuje dělení σ takové, že nerovnost $|S_{f\Delta g}(\sigma, \xi) - S_{f\Delta g}(\sigma, \eta)| < \frac{\varepsilon}{2}$ neboli

$$\left| \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} (f(\xi_j) - f(\eta_j)) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})] \right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

platí pro jakákoliv $\xi, \eta \in \tau(\sigma)$. Přejdem k supremům a infimům na každém intervalu $[\sigma_{j-1}, \sigma_j]$ získáme nerovnost

$$\begin{aligned} 0 &\leq \overline{S}_{f\Delta g}(\sigma) - \underline{S}_{f\Delta g}(\sigma) \\ &= \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \left(\sup_{x \in [\sigma_{j-1}, \sigma_j]} f(x) - \inf_{x \in [\sigma_{j-1}, \sigma_j]} f(x) \right) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})] \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon. \end{aligned}$$

Odtud dostáváme $\int_a^b \overline{f} \, dg \leq \overline{S}_{f\Delta g}(\sigma) < \underline{S}_{f\Delta g}(\sigma) + \varepsilon \leq \int_a^b \underline{f} \, dg + \varepsilon$ a konečně

také $0 \leq \int_a^b \overline{f} \, dg - \int_a^b \underline{f} \, dg < \varepsilon$. Protože $\varepsilon > 0$ bylo libovolné, znamená to, že je

$$\int_a^b \overline{f} \, dg = \int_a^b \underline{f} \, dg. \text{ Podle první části důkazu tedy platí (5.38).} \quad \square$$

5.60 Poznámka. Jestliže $\int_a^{\overline{b}} f \, d g = \int_a^b f \, d g = I \in \mathbb{R}$, bývá jejich společná hodnota I nazývána *Darbouxův-Stieltjesův integrál*. Lemma 5.59 říká, že tento integrál je ekvivalentní se (σ) RS-integrálem.

Nyní dokážeme dvě hlavní věty tohoto odstavce: Osgoodovu větu o domínované konvergenci a Hellyovu větu o konvergenci. Obě tyto věty platí ve stejném znění pro oba typy RS-integrálů.

5.61 Věta (OSGOODOVA KONVERGENČNÍ VĚTA). *Předpokládejme, že funkce $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ a posloupnost $\{f_n\}$ funkcí definovaných na $[a, b]$ splňují*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \quad \text{a} \quad |f_n(x)| \leq M < \infty \quad \text{pro } x \in [a, b] \quad \text{a} \quad n \in \mathbb{N}. \quad (5.39)$$

Dále nechť funkce $g \in \mathbb{BV}[a, b]$ je taková, že integrály $\int_a^b f \, d g$ a $\int_a^b f_n \, d g$ existují pro libovolné $n \in \mathbb{N}$. Potom

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n \, d g = \int_a^b f \, d g. \quad (5.40)$$

Důkaz z. a) Podle důsledku 5.42 integrál $\int_a^b |f_n(x) - f(x)| \, d[\text{var}_a^x g]$ existuje pro každé $n \in \mathbb{N}$ a platí nerovnost

$$\left| \int_a^b f_n(x) \, d[g(x)] - \int_a^b f(x) \, d[g(x)] \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| \, d[\text{var}_a^x g]. \quad (5.41)$$

Stačí tedy dokázat, že tvrzení věty platí, jestliže funkce f_n jsou nezáporné, $f = 0$ a g je neklesající. K tomu potřebujeme následující tvrzení známé z teorie množin jako Arzelàovo lemma. Jeho důkaz lze nalézt např. v [11, lemma II.15.8].

Lemma. (ARZELÀ). *Nechť $\{ \{J_{k,j} : k \in \mathbb{N}, j \in U_k\} \}$ je posloupnost konečných množin podintervalů $[a, b]$ takových, že pro každé $k \in \mathbb{N}$ jsou intervaly z množiny $\{J_{k,j} : j \in U_k\}$ navzájem disjunktní a*

$$\sum_{j \in U_k} |J_{k,j}| > C > 0 \quad \text{pro každé } k \in \mathbb{N}.$$

Potom existují posloupnosti indexů $\{k_\ell\}$ a $\{j_\ell\}$ takové, že $j_\ell \in U_{k_\ell}$ pro každé $\ell \in \mathbb{N}$ a $\bigcap_{\ell \in \mathbb{N}} J_{k_\ell, j_\ell} \neq \emptyset$.

b) Předpokládejme tedy, že g je neklesající na $[a, b]$ a $\{f_n\}$ je posloupnost funkcí definovaných na $[a, b]$ a takových, že

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 \quad \text{a} \quad 0 \leq f_n(x) \leq M < \infty \quad \text{pro } x \in [a, b] \quad \text{a} \quad n \in \mathbb{N}.$$

Dokážeme, že musí platit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n \, dg = 0. \quad (5.42)$$

Důkaz provedeme sporem. Nechť tedy neplatí (5.42). Potom, vzhledem k lemmatu 5.59, existují $\varepsilon > 0$ a rostoucí posloupnost $\{n_k\}$ takové, že

$$\int_a^b f_{n_k} \, dg > \varepsilon \quad \text{pro všechna } k \in \mathbb{N}.$$

Vzhledem k definici 5.58 to znamená, že pro každé $k \in \mathbb{N}$ existuje $\sigma^k \in \mathcal{D}[a, b]$ takové, že $\underline{S}_k(\sigma^k) > \varepsilon$, kde značíme $\underline{S}_k(\sigma^k) = \underline{S}_{f_{n_k} \Delta g}(\sigma^k)$. Položme ještě $m_k = \nu(\sigma^k)$ a $\varphi_{k,j} = \inf_{x \in [\sigma_{j-1}^k, \sigma_j^k]} f_{n_k}(x)$ pro $k \in \mathbb{N}$ a $j \in \{1, 2, \dots, m_k\}$.

Pro dané $\eta > 0$ označme U_k množinu indexů j takových, že $\varphi_{k,j} > \eta$, zatímco $V_k = \{1, 2, \dots, m_k\} \setminus U_k$. Zřejmě

$$M \sum_{j \in U_k} [g(\sigma_j^k) - g(\sigma_{j-1}^k)] + \eta \sum_{j \in V_k} [g(\sigma_j^k) - g(\sigma_{j-1}^k)] > \varepsilon$$

neboli

$$M \sum_{j \in U_k} [g(\sigma_j^k) - g(\sigma_{j-1}^k)] > \varepsilon - \eta [g(b) - g(a)].$$

Pro $\eta = \frac{\varepsilon}{2[g(b) - g(a)]}$ dostaneme $\sum_{j \in U_k} [g(\sigma_j^k) - g(\sigma_{j-1}^k)] > \frac{\varepsilon}{2M} > 0$ neboli

$\sum_{j \in U_k} |J_{k,j}| > \frac{\varepsilon}{2M} > 0$, kde $J_{k,j} = [g(\sigma_{j-1}^k), g(\sigma_j^k)]$ pro $j \in U_k$. Podle Arzelàova

lemmatu tedy existují bod y_0 a posloupnosti $\{k_\ell\}$ a $\{j_\ell\}$ takové, že $j_\ell \in U_{k_\ell}$

pro každé $\ell \in \mathbb{N}$ a $y_0 \in \bigcap_{\ell \in \mathbb{N}} J_{k_\ell, j_\ell}$. To znamená, že $y_0 \in [g(\sigma_{j_\ell-1}^{k_\ell}), g(\sigma_{j_\ell}^{k_\ell})]$ pro

každé $\ell \in \mathbb{N}$. Protože g je neklesající na $[a, b]$, existuje právě jeden bod $x_0 \in [a, b]$ takový, že

$$y_0 \in [g(x_0-), g(x_0+)], \quad x_0 \in [\sigma_{j_\ell-1}^{k_\ell}, \sigma_{j_\ell}^{k_\ell}] \quad \text{a } j_\ell \in U_{k_\ell} \quad \text{pro každé } \ell \in \mathbb{N}.$$

Podle definice množin U_k to znamená, že $f_{n_{k_\ell}}(x_0) > \eta$ pro každé $\ell \in \mathbb{N}$. To ale není možné vzhledem k předpokladu $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$. Platí tedy (5.42).

c) Podle části b) tohoto důkazu a lemmatu 5.59 máme

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |f_n(x) - f(x)| \, d[\text{var}_a^x g] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) \, d[\text{var}_a^x g] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) \, d[g(x)] = 0, \end{aligned}$$

a tudíž ze vztahu (5.41) bezprostředně vyplývá, že platí také

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n \, d g = \int_a^b f \, d g.$$

Tím je důkaz dokončen. \square

Další věta o konvergenci posloupnosti integrálů $\left\{ \int_a^b f \, d g_n \right\}$ je doplňkem k větě Osgoodově. Z jejího důkazu bude zřejmé, že platí pro oba integrály.

5.62 Věta (HELLYOVA VĚTA O KONVERGENCI). *Nechť funkce $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ a posloupnost $\{g_n\} \subset \mathbb{BV}[a, b]$ jsou takové, že*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = g(x) \text{ pro } x \in [a, b] \text{ a } \text{var}_a^b g_n \leq \gamma < \infty.$$

Potom $\text{var}_a^b g \leq \gamma$ a $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f \, d g_n = \int_a^b f \, d g$ platí pro každou funkci f spojitou na $[a, b]$.

D ů k a z. Nechť f je spojitá na $[a, b]$. Podle věty 2.44 je $\text{var}_a^b g \leq \gamma$ a podle věty 5.54 existují všechny integrály $\int_a^b f \, d g_n$, $n \in \mathbb{N}$, a $\int_a^b f \, d g$.

Bud' dáno $\varepsilon > 0$. Ze spojitosti funkce f na $[a, b]$ plyne, že existuje dělení $\sigma = \{\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_m\} \in \mathcal{D}[a, b]$ takové, že pro každé $j \in \{1, 2, \dots, m\}$ platí

$$|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{3\gamma} \text{ pro všechny } x, y \in [\sigma_{j-1}, \sigma_j]. \quad (5.43)$$

Pro každé $n \in \mathbb{N}$ máme

$$\begin{aligned} & \sum_{j=1}^m \left(\int_{\sigma_{j-1}}^{\sigma_j} f(x) \, d[g_n(x)] - f(\sigma_j) \int_{\sigma_{j-1}}^{\sigma_j} d[g_n(x)] \right) \\ &= \sum_{j=1}^m \int_{\sigma_{j-1}}^{\sigma_j} (f(x) - f(\sigma_j)) \, d[g_n(x)], \end{aligned}$$

tj.

$$\begin{aligned} & \int_a^b f(x) \, d[g_n(x)] - S_{f \Delta g_n}(\sigma, \xi) \\ &= \sum_{j=1}^m \int_{\sigma_{j-1}}^{\sigma_j} (f(x) - f(\sigma_j)) \, d[g_n(x)], \end{aligned}$$

kde $\xi = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m)$. Pomocí (5.43) a lemmatu 5.10 tedy dostáváme

$$\left| \int_a^b f(x) \, d g_n(x) - S_{f \Delta g_n}(\sigma, \xi) \right| \leq \frac{\varepsilon}{3\gamma} \sum_{j=1}^m \text{var}_{\sigma_{j-1}}^{\sigma_j} g \leq \frac{\varepsilon}{3\gamma} \gamma = \frac{\varepsilon}{3}.$$

Podobně odvodíme i analogickou nerovnost s funkcí g na místě g_n , tj.

$$\left| \int_a^b f(x) d[g(x)] - S_{f \Delta g}(\sigma, \xi) \right| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Protože $g_n(x) \rightarrow g(x)$ pro každé $x \in [a, b]$, snadno ověříme také rovnost

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |S_{f \Delta g_n}(\sigma, \xi) - S_{f \Delta g}(\sigma, \xi)| = 0.$$

Existuje tedy $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že

$$|S_{f \Delta g_n}(\sigma, \xi) - S_{f \Delta g}(\sigma, \xi)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad \text{pro } n \geq n_0.$$

Pomocí posledních tří nerovností konečně dostaneme pro $n \geq n_0$

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f d g_n - \int_a^b f d g \right| &\leq \left| \int_a^b f d g_n - S_{f \Delta g_n}(\sigma, \xi) \right| \\ &+ |S_{f \Delta g_n}(\sigma, \xi) - S_{f \Delta g}(\sigma, \xi)| + \left| S_{f \Delta g}(\sigma, \xi) - \int_a^b f d g \right| < \varepsilon. \end{aligned}$$

Platí tedy $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f d g_n = \int_a^b f d g$. □

5.8 Další věty o existenci integrálu

Nejprve pomocí vět 5.36 a 5.40 a lemmatu 5.38 upřesníme pohled na roli ohraničených funkcí v teorii Stieltjesova integrálu, který nám poskytla věta 5.23. Následující tvrzení platí pro oba typy RS-integrálů.

5.63 Věta. *Nechť $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $g \in \mathbb{BV}[a, b]$ a necht' existuje $\int_a^b f d g$. Potom je buď to funkce f ohraničená na intervalu $[a, b]$, nebo existuje konečný systém bodů $\alpha_i, \beta_i \in [a, b]$, $i = 1, 2, \dots, k$, takových, že platí*

- (i) $a \leq \alpha_1 < \beta_1 \leq \alpha_2 < \beta_2 \leq \dots \leq \alpha_k < \beta_k \leq b$,
- (ii) funkce g je na každém intervalu $[\alpha_i, \beta_i]$, $i = 1, 2, \dots, k$, konstantní,
- (iii) funkce f je ohraničená na množině $[a, b] \setminus \bigcup_{i=1}^k [\alpha_i, \beta_i]$.

D ů k a z . a) Předpokládejme, že existuje integrál $(\sigma) \int_a^b f d g$ a že funkce f není ohraničená na $[a, b]$. Potom podle věty 5.40 existuje také integrál $(\sigma) \int_a^b f d v$, kde $v(x) = \text{var}_a^x g$ pro $x \in [a, b]$. Podle věty 5.36 a lemmatu 5.38 tedy existuje dělení $\sigma \in \mathcal{D}[a, b]$ takové, že

$$\sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \omega_{[\sigma_{j-1}, \sigma_j]}(f) [v(\sigma_j) - v(\sigma_{j-1})] = \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \omega(S_{f\Delta v}; [\sigma_{j-1}, \sigma_j]) < 1.$$

Speciálně pro každé $j = 1, 2, \dots, \nu(\sigma)$ musí platit

$$\omega_{[\sigma_{j-1}, \sigma_j]}(f) [v(\sigma_j) - v(\sigma_{j-1})] < 1. \quad (5.44)$$

Není-li f ohraničená na intervalu $[\sigma_{j-1}, \sigma_j]$, pak je ovšem

$$\omega_{[\sigma_{j-1}, \sigma_j]}(f) = \sup_{x', x'' \in [\sigma_{j-1}, \sigma_j]} |f(x') - f(x'')| = \infty$$

a (5.44) může platit jenom tehdy, když bude $0 = v(\sigma_j) - v(\sigma_{j-1}) = \text{var}_{\sigma_{j-1}g}^{\sigma_j}$. Podle lemmatu 2.13 to znamená, že funkce g musí být konstantní na intervalu $[\sigma_{j-1}, \sigma_j]$. Nyní, nechť \mathfrak{J} je množina všech intervalů $[\sigma_{j-1}, \sigma_j]$, na kterých je funkce f neohraničená (a tedy funkce g konstantní), a nechť k je počet prvků této množiny. Důkaz dokončíme, označíme-li krajní body intervalů z \mathfrak{J} symboly $\alpha_i, \beta_i, i = 1, 2, \dots, k$, tak, aby byly uspořádány jako v podmínce (i) a současně platilo $\mathfrak{J} = \{[\alpha_i, \beta_i] : i = 1, 2, \dots, k\}$.

b) Jestliže existuje $(\delta) \int_a^b f \, dg$, pak podle věty 5.6 existuje také $(\sigma) \int_a^b f \, dg$ a tvrzení věty plyne z první části důkazu. \square

5.64 Poznámka. Protože hodnota integrálu $\int_a^b f \, dg$ se nezmění, jestliže libovolně pozměníme hodnotu funkce f na intervalech, na kterých je g konstantní, vidíme z věty 5.63, že jestliže integrál $\int_a^b f \, dg$ existuje, pak vždy můžeme najít funkci \tilde{f} ohraničenou na $[a, b]$ a takovou, že $\int_a^b f \, dg = \int_a^b \tilde{f} \, dg$.

5.65 Věta. Jestliže integrál $\int_a^b f \, dg$ existuje pro každou funkci f spojitou na $[a, b]$, pak g má konečnou variaci na $[a, b]$.

Důkaz se opírá o následující dvě pomocná tvrzení.

Tvrzení 1. Je-li $a_n \geq 0$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$ a $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty$, pak existuje posloupnost $\{c_n\}$ taková, že platí

$$c_n > 0 \text{ pro všechna } n \in \mathbb{N}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0 \text{ a } \sum_{n=1}^{\infty} c_n a_n = \infty. \quad (5.45)$$

Důkaz z. Posloupnost $\{s_n\} = \left\{ \sum_{k=1}^n a_k \right\}$ je neklesající a platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \infty. \quad (5.46)$$

Speciálně pro dostatečně velká n ($n \geq n_0$) bude $s_n > 0$. Můžeme tudíž definovat

$$c_n = \begin{cases} 1 & \text{pro } n < n_0, \\ \frac{1}{s_n} & \text{pro } n \geq n_0. \end{cases}$$

Zřejmě je $c_n > 0$ pro každé $n \in \mathbb{N}$ a $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0$. Na druhou stranu, pro libovolná $m, n \in \mathbb{N}$, $m > n \geq n_0$ máme

$$\sum_{k=n}^m c_k a_k = \sum_{k=n}^m \frac{a_k}{s_k} \geq \frac{1}{s_m} \sum_{k=n}^m a_k = 1 - \frac{s_{n-1}}{s_m}.$$

Vzhledem k (5.46) pro každé $n \in \mathbb{N}$ existuje $m_n > n$ takové, že je $\frac{s_{n-1}}{s_{m_n}} < \frac{1}{2}$, tj.

$$\sum_{k=n}^{m_n} c_k a_k > \frac{1}{2}.$$

To ovšem znamená, že musí platit (5.45). □

Tvrzení 2. *Nechť $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in (a, b]$ a*

$$\text{var}_{x_0}^x g = \infty \quad \text{pro každé } x \in [a, x_0). \quad (5.47)$$

Potom existuje rostoucí posloupnost $\{x_k\}$ bodů v $[a, x_0)$ taková, že

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x_0 \quad \text{a} \quad \sum_{k=1}^{\infty} |g(x_{k+1}) - g(x_k)| = \infty. \quad (5.48)$$

D ů k a z. $\alpha)$ Nejprve dokážeme, že platí

$$\sup\{\text{var}_y^x g : x \in (y, x_0)\} = \infty \quad \text{pro každé } y \in [a, x_0). \quad (5.49)$$

Předpokládejme opak. Nechť tedy existují $M \in [0, \infty)$ a $y \in [a, x_0)$ takové, že

$$\sup\{\text{var}_y^x g : x \in (y, x_0)\} \leq M. \quad (5.50)$$

Položme $\widetilde{M} = M + |g(x_0) - g(y)|$. Potom, vzhledem k (5.47), existuje dělení $y = y_0 < y_1 < \dots < y_m = x_0$ intervalu $[y, x_0]$ takové, že

$$\sum_{j=1}^m |g(y_j) - g(y_{j-1})| > 3\widetilde{M}.$$

Protože je

$$|g(x_0) - g(y_{m-1})| \leq |g(x_0) - g(y)| + |g(y) - g(y_{m-1})| \leq \widetilde{M},$$

máme

$$\sum_{j=1}^{m-1} |g(y_j) - g(y_{j-1})| > 2\widetilde{M},$$

a tedy $\text{var}_y^{y^{m-1}} g > 2\widetilde{M}$, což je ve sporu s (5.50). Platí tedy (5.49).

β) Zkonstruujeme hledanou posloupnost. Položme $u_1 = a$ a zvolme $u_2 \in (a, x_0)$ tak, aby platilo $u_2 > x_0 - 1$ a $\text{var}_{u_1}^{u_2} g > 1$. Máme-li body $u_1, u_2, \dots, u_\ell \in [a, x_0)$ takové, že platí $u_\ell \in (u_{\ell-1}, x_0) \cap (x_0 - \frac{1}{\ell-1}, x_0)$ a $\text{var}_{u_{\ell-1}}^{u_\ell} g > 1$, pak najdeme $u_{\ell+1}$ tak, aby platilo $u_{\ell+1} \in (u_\ell, x_0) \cap (x_0 - \frac{1}{\ell}, x_0)$ a $\text{var}_{u_\ell}^{u_{\ell+1}} g > 1$. Posloupnost $\{u_\ell\}$ je zřejmě rostoucí a

$$\lim_{\ell \rightarrow \infty} u_\ell = x_0. \quad (5.51)$$

Podle definice variace, pro každé $\ell \in \mathbb{N}$ existuje dělení $\sigma^\ell = \{\sigma_0^\ell, \sigma_1^\ell, \dots, \sigma_{m_\ell}^\ell\}$ intervalu $[u_\ell, u_{\ell+1}]$ takové, že platí

$$\sum_{j=1}^{m_\ell} |g(\sigma_j^\ell) - g(\sigma_{j-1}^\ell)| > 1.$$

Potom

$$\sum_{\ell=1}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^{m_\ell} |g(\sigma_j^\ell) - g(\sigma_{j-1}^\ell)| \right) \geq \sum_{\ell=1}^{\infty} 1 = \infty. \quad (5.52)$$

Přecházejme nyní prvky množin σ^ℓ , $\ell \in \mathbb{N}$, do posloupnosti $\{x_k\}$ tak, aby platilo

$$\begin{aligned} & x_{k+1} = \sigma_{j+1}^\ell \quad \text{je-li } x_k = \sigma_j^\ell \quad \text{a } j < m_\ell - 1 \\ \text{a} \\ & x_{k+1} = \sigma_0^{\ell+1} \quad \text{je-li } x_k = \sigma_{m_\ell-1}^\ell. \end{aligned}$$

Vzhledem k (5.51) a (5.52) má posloupnost $\{x_k\}$ požadované vlastnosti. \square

D ů k a z věty 5.65. Vzhledem k větě 5.6 se můžeme omezit na (σ) RS-integrál.

Předpokládejme, že $\text{var}_a^b g = \infty$. Díky Heinově-Borelově větě o konečném pokrytí (viz větu 4.6) a větě 2.11 víme, že funkce $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ má konečnou variaci na $[a, b]$ právě tehdy, když platí

$$\text{a} \quad \left. \begin{aligned} & \forall x \in (a, b) \exists \delta_1 \in (0, x - a) : \text{var}_{x-\delta_1}^x g < \infty \\ & \forall x \in [a, b) \exists \delta_2 \in (0, b - x) : \text{var}_x^{x+\delta_2} g < \infty. \end{aligned} \right\} \quad (5.53)$$

Předpoklad, že $\text{var}_a^b g = \infty$ znamená, že existuje $x_0 \in [a, b]$ takové, že pro $x = x_0$ není splněna jedna z podmínek (5.53). Nechť tedy například $x_0 \in (a, b]$ je takové, že platí (5.47). Podle tvrzení 2 tedy existuje rostoucí posloupnost $\{x_k\}$ bodů

v (a, x_0) taková, že

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x_0 \quad \text{a} \quad \sum_{k=1}^{\infty} |g(x_{k+1}) - g(x_k)| = \infty.$$

Dále podle tvrzení 1 existuje posloupnost $\{c_k\}$ kladných čísel taková, že platí

$$\lim_{k \rightarrow \infty} c_k = 0 \quad \text{a} \quad \sum_{k=1}^{\infty} c_k |g(x_{k+1}) - g(x_k)| = \infty.$$

Položme

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{pro } x < x_1, \text{ resp. } x \geq x_0, \text{ resp. } x \in \{x_k\}_{k=1}^{\infty}, \\ c_k \operatorname{sign}(g(x_{k+1}) - g(x_k)) & \text{pro } x = \xi_k := \frac{x_{k+1} + x_k}{2} \end{cases}$$

a ve zbývajících bodech intervalu $[a, b]$ dodefinujme funkci f lineárně a tak, aby byla spojitá na $[a, b]$. Pro takto definovanou funkci $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ platí

$$\sum_{k=1}^{\infty} f(\xi_k) [g(x_{k+1}) - g(x_k)] = \infty.$$

Speciálně pro každé $M > 0$ existuje $N_M \in \mathbb{N}$ takové, že

$$\sum_{k=1}^{N_M} f(\xi_k) [g(x_{k+1}) - g(x_k)] > M.$$

Pro dané $M > 0$ označme

$$\sigma_M = \{a, x_1, x_2, \dots, x_{N_M}, x_{N_M+1}, b\}, \quad \xi_M = (a, \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{N_M}, b).$$

Potom je $(\sigma_M, \xi_M) \in \mathcal{T}[a, b]$ a

$$S(\sigma_M, \xi_M) = \sum_{k=1}^{N_M} f(\xi_k) [g(x_{k+1}) - g(x_k)] > M.$$

(Připomeňme si, že $f(a) = f(b) = 0$.) To ale znamená, že integrál $(\sigma) \int_a^b f \, dg$ nemůže mít konečnou hodnotu.

Není-li splněna druhá z podmínek v (5.53), tj. existuje $x_0 \in [a, b)$ takové, že $\operatorname{var}_{x_0}^x g = \infty$ pro každé $x \in (x_0, b]$, je třeba místo tvrzení 2 použít jeho vhodnou úpravu. \square

5.66 Cvičení. Zformulujte a dokažte analogii tvrzení 2 potřebnou k dokončení důkazu věty 5.65, jestliže existuje $x_0 \in [a, b)$ takové, že $\operatorname{var}_{x_0}^x g = \infty$ pro každé $x \in (x_0, b]$.

5.67 Věta. Necht $f \in \mathbb{G}[a, b]$ a necht integrál $\int_a^b f \, dg$ existuje pro každou konečnou skokovou funkci g . Potom f je spojitá na $[a, b]$.

D ů k a z . Opět se můžeme omezit na (σ) RS-integrál. Nechť $x_0 \in (a, b)$, $c, d \in \mathbb{R}$, $c + d \neq 0$ a nechť funkce $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ je definována podobně jako v poznámce 5.24, tj.

$$g(x) = c \chi_{[a, x_0)}(x) + \frac{c+d}{2} \chi_{[x_0]}(x) + d \chi_{(x_0, b]}(x) \quad \text{pro } x \in [a, b].$$

Podle poznámky 5.24 může integrál $(\sigma) \int_a^b f \, dg$ existovat pouze tehdy, když $f(x_0-) = f(x_0) = f(x_0+)$. Podobně bychom dokázali, že f musí být spojitá i v bodě a zprava a v bodě b zleva. \square

5.9 Věty o střední hodnotě

Věty tohoto odstavce platí ve stejném znění pro oba typy RS-integrálu.

5.68 Věta (O STŘEDNÍ HODNOTĚ). *Je-li f spojitá na $[a, b]$ a g neklesající na $[a, b]$, pak existuje $x_0 \in [a, b]$ takové, že*

$$\int_a^b f \, dg = f(x_0) [g(b) - g(a)]. \quad (5.54)$$

D ů k a z . Věta 5.54 zaručuje existenci integrálu $\int_a^b f \, dg$ v obou smyslech. Protože je g neklesající na $[a, b]$, pro každé značené dělení $(\sigma, \xi) \in \mathcal{T}[a, b]$ platí

$$m [g(b) - g(a)] \leq S(\sigma, \xi) \leq M [g(b) - g(a)],$$

kde $m = \min_{x \in [a, b]} f(x)$ a $M = \max_{x \in [a, b]} f(x)$. Podobně jako při důkazu lemmatu 5.10 plyne odtud, že platí také

$$m [g(b) - g(a)] \leq \int_a^b f \, dg \leq M [g(b) - g(a)].$$

Dále protože f je spojitá, nabývá všech hodnot z intervalu $[m, M]$. Speciálně existuje $x_0 \in [a, b]$ takové, že platí (5.54). \square

5.69 Věta (DRUHÁ O STŘEDNÍ HODNOTĚ). *Je-li f spojitá na $[a, b]$ a g neklesající na $[a, b]$, pak existuje $x_0 \in [a, b]$ takové, že*

$$\int_a^b f(x) g(x) \, dx = g(a) \int_a^{x_0} f(x) \, dx + g(b) \int_{x_0}^b f(x) \, dx. \quad (5.55)$$

D ů k a z . Funkce f je riemannovsky integrovatelná na $[a, b]$. Položme

$$h(x) = \int_a^x f(t) \, dt \quad \text{pro } x \in [a, b].$$

Potom podle věty o substituci (věta 5.45 a důsledek 5.46), věty o integraci per-partes (věta 5.50) a věty o střední hodnotě (věta 5.68) existuje $x_0 \in [a, b]$ tak, že

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) g(x) dx &= \int_a^b g dh = h(b) g(b) - \int_a^b h dg \\ &= \left(\int_a^b f dx \right) g(b) - \left(\int_a^{x_0} f dx \right) [g(b) - g(a)] \\ &= g(a) \int_a^{x_0} f(x) dx + g(b) \int_{x_0}^b f(x) dx. \end{aligned}$$

Platí tedy (5.55). □

5.10 Další integrály Stieltjesova typu

Buď te dány funkce $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ a dělení σ intervalu $[a, b]$. Položme

$$\begin{aligned} S_M(\sigma) &= \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \frac{f(\sigma_j) + f(\sigma_{j-1})}{2} [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})], \\ S_{CL}(\sigma) &= \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} f(\sigma_{j-1}) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})], \\ S_{CR}(\sigma) &= \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} f(\sigma_j) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})]. \end{aligned}$$

Dosadíme-li do definice 5.3 $S_M(\sigma)$, resp. $S_{CL}(\sigma)$, resp. $S_{CR}(\sigma)$ místo $S(\sigma, \xi)$, dostaneme po řadě integrály *středový* resp. *levý Cauchyův*, resp. *pravý Cauchyův*. Podle způsobu limitního procesu se ovšem rozlišují (δ) nebo (σ) varianty. Je zřejmé, že všechny zobecňují příslušné RS-integrály, pokud jde o třídy integrovatelných funkcí. Ne vždy však zůstanou zachovány všechny vlastnosti RS-integrálů. Na příklad pro středový integrál neplatí obdoba věty 5.45 o substituci. Více podrobností lze najít v odstavci II.19 monografie [11] T. H. Hildebrandta.

5.11 Cvičení na závěr

Není-li uvedeno jinak, v následujících cvičeních proveďte diskusi o existenci, případně určete hodnotu pro každý typ Stieltjesova integrálu z této kapitoly, tj pro integrály (δ)RS, (σ)RS, středový, levý Cauchyův a pravý Cauchyův.

(i) Nechť $g(x) = \sin x$ pro $x \in [0, \pi]$. Určete hodnotu integrálu $\int_0^\pi x \, d[g(x)]$.

(ii) Nechť $g(x) = \exp(|x|)$ pro $x \in [-1, 1]$. Určete hodnotu integrálu

$$(\delta) \int_{-1}^1 x \, d[g(x)].$$

(iii) Nechť $g(x) = \begin{cases} 0 & \text{pro } x \in [0, \frac{1}{2}), \\ c & \text{pro } x = \frac{1}{2}, \\ d & \text{pro } x \in (\frac{1}{2}, 1]. \end{cases}$

Zkoumejte existenci a hodnotu integrálu $\int_0^1 f \, dg$ pro různé funkce f v závislosti na c, d .

(iv) Nechť $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{pro } x < 0, \\ 1 & \text{pro } x \geq 0, \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} 0 & \text{pro } x \leq 0, \\ 1 & \text{pro } x > 0. \end{cases}$

Zkoumejte existenci a hodnotu integrálů

$$\int_{-1}^1 g \, df, \int_{-1}^0 g \, df, \int_0^1 g \, df, \int_{-1}^1 g \, dg, \int_{-1}^0 g \, dg, \int_0^1 g \, dg.$$

(v) Určete hodnotu integrálu $(\delta) \int_0^1 x^2 [g(x)]$, kde $g(x) = \begin{cases} x & \text{pro } x \in [0, \frac{1}{2}], \\ \frac{1}{x} & \text{pro } x \in (\frac{1}{2}, 1]. \end{cases}$

(vi) Definujte exaktně křivkový integrál prvního druhu zmíněný v odstavci 1.2 a formulujte jeho základní vlastnosti, které plynou z vět obsažených v této kapitole.

V této kapitole jsme čerpali z kapitoly II Hildebrandtovy monografie [11], ve které je možno najít i další informace.

Kurzweilův-Stieltjesův integrál

Riemannův-Stieltjesův integrál má široké uplatnění všude, kde je možno omezit se na situace, kdy integrand a integrátor nemají společné body nespojitosti (nebo, v případě (σ) RS-integrálu, neexistují body, ve kterých by obě funkce měly nespojitost na stejné straně). Pro některé aplikace (např. v teorii hystereze a z ní pocházejících variačních nerovnostech, viz [2], [21] a [22]) je však žádoucí mít k dispozici integrál Stieltjesova typu, který si nevynucuje žádná omezení na spojitost integrovaných a integrujících funkcí. Ukazuje se, že integrál, který této potřebě nejlépe vyhovuje integrál, který budeme nazývat Kurzweilův-Stieltjesův. Jeho výhodnost nespočívá jen v jeho obecnosti, ale též i v relativní jednoduchosti jeho definice i odvození jeho vlastností. Navzdory těmto přednostem mu v monografické literatuře nebylo doposud věnováno tolik pozornosti, kolik by si zasloužil. Pokud je mi známo, stručné pojednání o tomto integrálu lze najít v kapitole 24 Schechterovy monografie [43] z roku 1997 (tam je nazýván Henstockův-Stieltjesův integrál). Podrobněji se tímto integrálem zabývá McLeodova monografie [34] z roku 1980, kde je nazýván *gauge integral* („gauge“=„kalibr“). Jaroslav Kurzweil použil tento integrál již v roce 1958 (viz [29]) jako speciální případ zobecněného nelineárního integrálu, který definoval ve své fundamentální práci [28] z roku 1957 při vyšetřování spojitě závislosti řešení nelineárních diferenciálních rovnic obsahujících Diracovu distribuci. Během sedmdesátých let minulého století byl již termín Kurzweilův-Stieltjesův integrál (nebo Perronův-Stieltjesův integrál podle Kurzweilovy definice) běžně používán v pracích zabývajících se zobecněnými lineárními diferenciálními rovnicemi (viz např. [47] nebo [55] a práce tam citované).

Cílem této kapitoly je předložit co nejucelenější teorii Kurzweilova-Stieltjesova integrálu.

6.1 Definice a základní vlastnosti

6.1 Definice. Každá kladná funkce $\delta : [a, b] \rightarrow (0, \infty)$ se nazývá *kalibr* na intervalu $[a, b]$. Množinu kalibrů na $[a, b]$ značíme $\mathcal{G}[a, b]$.

Je-li δ kalibr na $[a, b]$, řekneme, že značené dělení (σ, ξ) intervalu $[a, b]$ je δ -jemné, jestliže platí

$$[\sigma_{j-1}, \sigma_j] \subset (\xi_j - \delta(\xi_j), \xi_j + \delta(\xi_j)) \quad \text{pro všechna } j = 1, 2, \dots, \nu(\sigma).$$

$\mathcal{A}(\delta; [a, b])$ značí množinu všech δ -jemných značených dělení intervalu $[a, b]$. Nehrozí-li nedorozumění, používáme kratší značení $\mathcal{A}(\delta)$.

Mějme funkce $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ a značené dělení $(\sigma, \xi) \in \mathcal{T}[a, b]$. Potom definujeme jako v kapitole 5 integrální součet

$$S(\sigma, \xi) (= S_{f\Delta g}(\sigma, \xi) = S_{f\Delta g}(\sigma, \xi; [a, b])) = \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} f(\xi_j) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})].$$

6.2 Definice. Nechť $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ a $I \in \mathbb{R}$. Řekneme, že existuje *Kurzweilův-Stieltjesův integrál* (KS-integrál) $\int_a^b f(x) d[g(x)]$ a má hodnotu $I \in \mathbb{R}$, jestliže

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon \in \mathcal{G}[a, b] : \left((\sigma, \xi) \in \mathcal{A}(\delta_\varepsilon) \right) \implies \left| I - S(\sigma, \xi) \right| < \varepsilon. \quad (6.1)$$

Jestliže $g(x) \equiv x$, pak místo o KS-integrálu mluvíme o KH-integrálu (Kurzweilův-Henstockův integrál) a značíme $\int_a^b f(x) dx$. Budeme využívat též zkrácené značení $\int_a^b f dg = \int_a^b f(x) d[g(x)]$.

Existuje-li integrál $\int_a^b f dg$, klademe $\int_b^a f dg = -\int_a^b f dg$. Dále $\int_a^a f dg = 0$.

Tato definice je korektní díky následujícím dvěma lemmatům.

6.3 Lemma (COUSIN). *Pro každý kalibr $\delta \in \mathcal{G}[a, b]$ je množina $\mathcal{A}(\delta)$ všech δ -jemných značených dělení intervalu $[a, b]$ neprázdná.*

D ů k a z. Mějme kalibr $\delta \in \mathcal{G}[a, b]$. Označme M množinu všech $c \in (a, b)$, pro něž je množina $\mathcal{A}(\delta; [a, c])$ neprázdná.

Nechť $c = \min\{a + \delta(a), b\}$, $\sigma = \{a, c\}$ a $\xi = (a)$. Protože je $\delta(a) > 0$, máme $c \in (a, b)$ a $(\sigma, \xi) \in \mathcal{A}(\delta; [a, c])$, tj. $c \in M$. Množina M je tedy neprázdná, a proto $d = \sup M > -\infty$.

Ukážeme dále, že d leží v množině M . Protože je $\delta(d) > 0$, plyne z definice suprema, že existuje $c \in (d - \delta(d), d) \cap M$. Tudíž existuje také δ -jemné značené dělení (σ', ξ') intervalu $[a, c]$. Nechť $c < d$. (V opačném případě je triviálně $d = c \in M$.) Položme $\sigma = \sigma' \cup \{d\}$ a $\xi = (\xi', d)$. Potom $(\sigma, \xi) \in \mathcal{T}[a, d]$, a protože je $[c, d] \subset (d - \delta(d), d + \delta(d))$, znamená to také, že $(\sigma, \xi) \in \mathcal{A}(\delta; [a, d])$, tj. $d \in M$.

Je-li $d = b$, jsme s důkazem hotovi. Předpokládejme, že je $d < b$. Zvolme libovolně $(\sigma'', \xi'') \in \mathcal{T}[a, d]$ a $\gamma \in (d, d + \delta(d)) \cap (d, b)$. (Takové γ existuje, protože je $\delta(d) > 0$.) Máme tedy $[d, \gamma] \subset (d - \delta(d), d + \delta(d))$, a proto $(\sigma'' \cup \{\gamma\}, (\xi'', d))$ je δ -jemné značené dělení intervalu $[a, \gamma]$, tj. $\gamma \in M$. Protože je $\gamma > d$, dostáváme tak spor s definicí $d = \sup M$. Platí tedy $d = \sup M = b$ a důkaz lemmatu je dokončen. \square

6.4 Lemma. *Hodnota integrálu $\int_a^b f \, d g$ je podmínkou (6.1) určena jednoznačně.*

D ů k a z. Předpokládejme, že existují $I_1, I_2 \in \mathbb{R}$, $I_1 \neq I_2$, takové, že platí (6.1), kam dosadíme $I = I_i$, $i = 1, 2$. Položme $\tilde{\varepsilon} = \frac{1}{2} |I_1 - I_2|$. Pak existují kalibry δ_1 a δ_2 tak, že

$$|S(\sigma, \xi) - I_1| < \tilde{\varepsilon} \text{ pro každé } (\sigma, \xi) \in \mathcal{A}(\delta_1), \quad (6.2)$$

$$|S(\sigma, \xi) - I_2| < \tilde{\varepsilon} \text{ pro každé } (\sigma, \xi) \in \mathcal{A}(\delta_2) \quad (6.3)$$

Položme $\delta(x) = \min\{\delta_1(x), \delta_2(x)\}$ pro $x \in [a, b]$. Potom je zřejmě δ také kalibr a platí $\mathcal{A}(\delta) \subset \mathcal{A}(\delta_1) \cap \mathcal{A}(\delta_2)$. Pro každé $(\sigma, \xi) \in \mathcal{A}(\delta)$ tedy máme

$$\begin{aligned} 2\tilde{\varepsilon} &= |I_1 - I_2| = |I_1 - S(\sigma, \xi) + S(\sigma, \xi) - I_2| \\ &\leq |I_1 - S(\sigma, \xi)| + |S(\sigma, \xi) - I_2| < 2\tilde{\varepsilon}. \end{aligned}$$

Protože toto není možné, musí být $I_1 = I_2$. □

Nebude-li uvedeno jinak, bude mít v následujícím textu symbol integrálu vždy smysl KS-integrálu.

6.5 Poznámka. Nechť $\delta, \delta_0 \in \mathcal{G}[a, b]$ a $\delta \leq \delta_0$ na $[a, b]$. Potom je $\mathcal{A}(\delta) \subset \mathcal{A}(\delta_0)$. Je-li tedy splněna nějaká podmínka pro všechna $(\sigma, \xi) \in \mathcal{A}(\delta_0)$, tím spíše je splněna i pro všechna $(\sigma, \xi) \in \mathcal{A}(\delta)$. Tudíž, máme-li dán kalibr $\delta_0 \in \mathcal{G}[a, b]$, můžeme se v definici 6.2 omezit na kalibry δ_ε , pro které je $\delta_\varepsilon \leq \delta_0$ na $[a, b]$.

Také pro existenci KS-integrálu platí podmínka Bolzanova-Cauchyova typu.

6.6 Věta (BOLZANOVA-CAUCHYOVA PODMÍNKA). *Nechť $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.*

Potom integrál $\int_a^b f \, d g$ existuje právě tehdy, když platí

$$\left. \begin{aligned} \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon \in \mathcal{G}[a, b]: \\ \left((\sigma, \xi), (\sigma', \xi') \in \mathcal{A}(\delta_\varepsilon) \right) \implies |S(\sigma, \xi) - S(\sigma', \xi')| < \varepsilon. \end{aligned} \right\} \quad (6.4)$$

D ů k a z. a) Existuje-li integrál $\int_a^b f \, d g = I \in \mathbb{R}$, pak, podle definice 6.2, pro každé $\varepsilon > 0$ existuje kalibr $\delta_\varepsilon \in \mathcal{G}[a, b]$ takový, že je $|S(\sigma, \xi) - I| < \frac{\varepsilon}{2}$ pro všechna $(\sigma, \xi) \in \mathcal{A}(\delta_\varepsilon)$. Pro každou dvojici $(\sigma, \xi), (\sigma', \xi') \in \mathcal{A}(\delta_\varepsilon)$ tedy máme

$$|S(\sigma, \xi) - S(\sigma', \xi')| \leq |S(\sigma, \xi) - I| + |S(\sigma', \xi') - I| < \varepsilon.$$

Platí tedy (6.4).

b) Předpokládejme nyní, že je splněna podmínka (6.4). Buď dáno $\varepsilon > 0$. Podle (6.4) můžeme zvolit kalibr δ_ε tak, aby

$$|S(\sigma, \xi) - S(\sigma', \xi')| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (6.5)$$

platilo pro každou dvojici δ_ε -jemných značených dělení (σ, ξ) , (σ', ξ') intervalu $[a, b]$. Označme M množinu reálných čísel m , pro něž existuje kalibr $\delta_m \in \mathcal{G}[a, b]$ takový, že nerovnost $S(\sigma, \xi) \geq m$ je splněna pro každé $(\sigma, \xi) \in \mathcal{A}(\delta_m)$.

Dokážeme, že množina M je neprázdná, shora ohraničená a $\sup M = \int_a^b f \, dg$. Zafixujme $(\rho, \eta) \in \mathcal{A}(\delta_\varepsilon)$. Podle (6.5) platí

$$S(\rho, \eta) - \frac{\varepsilon}{2} < S(\sigma, \xi) < S(\rho, \eta) + \frac{\varepsilon}{2} \text{ pro každé } (\sigma, \xi) \in \mathcal{A}(\delta_\varepsilon). \quad (6.6)$$

To znamená, že $(-\infty, S(\rho, \eta) - \frac{\varepsilon}{2}) \subset M$, a tedy $M \neq \emptyset$.

Pro každé $m \in M$ a $x \in [a, b]$ definujme $\tilde{\delta}_m(x) = \min\{\delta_m(x), \delta_\varepsilon(x)\}$. Potom pro každé $m \in M$ a každé $(\sigma, \xi) \in \mathcal{A}(\tilde{\delta}_m) \subset \mathcal{A}(\delta_\varepsilon)$ platí nerovnosti

$$m \leq S(\sigma, \xi) < S(\rho, \eta) + \frac{\varepsilon}{2}, \quad \text{tj. } M \subset \left(-\infty, S(\rho, \eta) + \frac{\varepsilon}{2}\right).$$

Množina M je tedy shora ohraničená a $S(\rho, \eta) - \frac{\varepsilon}{2} \leq \sup M \leq S(\rho, \eta) + \frac{\varepsilon}{2}$. Odtud podle (6.6) odvodíme konečně, že platí

$$|S(\sigma, \xi) - \sup M| \leq |S(\sigma, \xi) - S(\rho, \eta)| + |S(\rho, \eta) - \sup M| < \varepsilon$$

pro každé $(\sigma, \xi) \in \mathcal{A}(\delta_\varepsilon)$, tj. $\sup M = \int_a^b f \, dg$. □

6.7 Poznámka. Podobně jako v případě RS-integrálů (viz cvičení 5.15) můžeme podmínku (6.4) zeslabit následujícím způsobem

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon \in \mathcal{G}[a, b]:$$

$$\left((\sigma, \xi), (\sigma', \xi') \in \mathcal{A}(\delta_\varepsilon), \sigma' \supset \sigma \right) \implies |S(\sigma, \xi) - S(\sigma', \xi')| < \varepsilon.$$

KS-integrál má obvyklé lineární vlastnosti.

6.8 Věta. *Nechť $f, f_1, f_2, g, g_1, g_2: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ a necht existují integrály*

$$\int_a^b f_1 \, dg, \int_a^b f_2 \, dg, \int_a^b f \, dg_1 \text{ a } \int_a^b f \, dg_2.$$

Potom pro libovolná $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ platí

$$\int_a^b (c_1 f_1 + c_2 f_2) \, dg = c_1 \int_a^b f_1 \, dg + c_2 \int_a^b f_2 \, dg$$

a

$$\int_a^b f \, d[c_1 g_1 + c_2 g_2] = c_1 \int_a^b f \, d g_1 + c_2 \int_a^b f \, d g_2.$$

D ů k a z . Ukaŕme si tŕeba d ůkaz prv n ůho tvrzen ů.

Bud' d ano $\varepsilon > 0$. Podle na ŕeho pŕedpokladu existuj ů kalibry $\delta_1 \in \mathcal{G}[a, b]$ a $\delta_2 \in \mathcal{G}[a, b]$ takov e, Œe plat ů

$$(\sigma, \xi) \in \mathcal{A}(\delta_i) \implies \left| S_{f_i \Delta g}(\sigma, \xi) - \int_a^b f_i \, d g \right| < \varepsilon \quad \text{pro } i = 1, 2.$$

Pro $x \in [a, b]$ poloŕme $\delta_\varepsilon(x) = \min\{\delta_1(x), \delta_2(x)\}$. Oznaĉme $h = c_1 f_1 + c_2 f_2$. ProtoŒe pro kaŕd e $(\sigma, \xi) \in \mathcal{A}(\delta_\varepsilon)$ plat ů

$$\begin{aligned} S_{h \Delta g}(\sigma, \xi) &= \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} (c_1 f_1(\xi_j) + c_2 f_2(\xi_j)) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})] \\ &= c_1 S_{f_1 \Delta g}(\sigma, \xi) + c_2 S_{f_2 \Delta g}(\sigma, \xi), \end{aligned}$$

dostáváme

$$\begin{aligned} &\left| S_{h \Delta g}(\sigma, \xi) - c_1 \int_a^b f_1 \, d g - c_2 \int_a^b f_2 \, d g \right| \\ &\leq |c_1| \left| S_{f_1 \Delta g}(\sigma, \xi) - \int_a^b f_1 \, d g \right| + |c_2| \left| S_{f_2 \Delta g}(\sigma, \xi) - \int_a^b f_2 \, d g \right| \\ &< (|c_1| + |c_2|) \varepsilon. \end{aligned}$$

Odtud uŒ na ŕe tvrzen ů bezprostŕedn e plyne.

Druh e tvrzen ů v ety by se dokazovalo obdobn e a d ůkaz lze ponechat ĉtenáři jako cviĉen ů. \square

6.9 V eĉa. JestliŒe existuje integrál $\int_a^b f \, d g$ a jestliŒe $[c, d] \subset [a, b]$, pak existuje tak e integrál $\int_c^d f \, d g$.

D ů k a z je analogick ů d ůkazu v ety 5.16 a lze ho pŕenechat ĉtenáři jako cviĉen ů. \square

6.10 Cviĉen ů. Dokaŕte druh e tvrzen ů v ety 6.8 a v eĉu 6.9.

6.11 V eĉa. Nech' $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ a $c \in [a, b]$. Integrál $\int_a^b f \, d g$ existuje pŕáv e tehdy, kdyŒ existuj ů oba integrály $\int_a^c f \, d g$ a $\int_c^b f \, d g$. V takov em pŕ ůpad e pak

platí rovnost

$$\int_a^b f \, dg = \int_a^c f \, dg + \int_c^b f \, dg.$$

Důk a z. Je-li $c = a$ nebo $c = b$, je tvrzení věty triviální. Nechť je tedy $c \in (a, b)$.

a) Existuje-li integrál $\int_a^b f \, dg$, pak podle věty 6.9 existují také oba integrály $\int_a^c f \, dg$ a $\int_c^b f \, dg$.

b) Nechť $\int_a^c f \, dg = I_1$ a $\int_c^b f \, dg = I_2$. Buď dáno $\varepsilon > 0$. Zvolme kalibry $\delta'_\varepsilon \in \mathcal{G}[a, c]$, $\delta''_\varepsilon \in \mathcal{G}[c, b]$ tak, aby pro všechna značená δ'_ε -jemná dělení (σ', ξ') intervalu $[a, c]$ a všechna δ''_ε -jemná dělení (σ'', ξ'') intervalu $[c, b]$ platilo

$$|S(\sigma', \xi') - I_1| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{a} \quad |S(\sigma'', \xi'') - I_2| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (6.7)$$

Definujme nyní kalibr δ_ε na $[a, b]$ předpisem

$$\delta_\varepsilon(x) = \begin{cases} \min \left\{ \delta'_\varepsilon(x), \frac{1}{4}(c-x) \right\}, & \text{když } x \in [a, c), \\ \min \left\{ \delta'_\varepsilon(c), \delta''_\varepsilon(c) \right\}, & \text{když } x = c, \\ \min \left\{ \delta''_\varepsilon(x), \frac{1}{4}(x-c) \right\}, & \text{když } x \in (c, b]. \end{cases}$$

Potom,

$$x + \delta_\varepsilon(x) \leq x + \frac{1}{4}(c-x) < c, \quad \text{je-li } x < c,$$

a

$$x - \delta_\varepsilon(x) \geq x - \frac{1}{4}(x-c) > c, \quad \text{je-li } x > c.$$

Pro žádné $x \neq c$ tedy nemůže být $c \in [x - \delta_\varepsilon(x), x + \delta_\varepsilon(x)]$. Pro každé δ_ε -jemné značené dělení (σ, ξ) intervalu $[a, b]$ tudíž existuje $k \in \{1, 2, \dots, \nu(\sigma)\}$ tak, že $\xi_k = c$. Můžeme tedy předpokládat, že platí $\sigma_{k-1} < \sigma_k = \xi_k = c = \xi_{k+1} < \sigma_{k+1}$. Kdyby bylo $\sigma_{k-1} < c = \xi_k < \sigma_k$, upravili bychom příslušný člen v součtu $S(\sigma, \xi)$ následujícím způsobem:

$$f(c) [g(\sigma_k) - g(\sigma_{k-1})] = f(c) [g(\sigma_k) - g(c)] + f(c) [g(c) - g(\sigma_{k-1})].$$

Existují tedy $(\sigma', \xi') \in \mathcal{T}[a, c]$ a $(\sigma'', \xi'') \in \mathcal{T}[c, b]$ takové, že

$$(\sigma', \xi') \in \mathcal{A}(\delta_\varepsilon; [a, c]) \subset \mathcal{A}(\delta'_\varepsilon; [a, c]), \quad (\sigma'', \xi'') \in \mathcal{A}(\delta_\varepsilon; [c, b]) \subset \mathcal{A}(\delta''_\varepsilon; [c, b])$$

$$\sigma = \sigma' \cup \sigma'', \quad \xi = (\xi', \xi''), \quad S(\sigma, \xi) = S(\sigma', \xi') + S(\sigma'', \xi'').$$

Vezmeme-li v úvahu také (6.7), vidíme, že platí

$$\begin{aligned} |S(\sigma, \xi) - (I_1 + I_2)| &= |S(\sigma', \xi') + S(\sigma'', \xi'') - (I_1 + I_2)| \\ &\leq |S(\sigma', \xi') - I_1| + |S(\sigma'', \xi'') - I_2| < \varepsilon \end{aligned}$$

pro každé $(\sigma, \xi) \in \mathcal{A}(\delta_\varepsilon; [a, b])$ neboli $\int_a^b f \, dg = I_1 + I_2$. \square

6.12 Poznámka. Jestliže existuje integrál $(\delta) \int_a^b f \, dg$, pak existuje také KS-integrál $\int_a^b f \, dg$ a má tutéž hodnotu. Je-li totiž $(\delta) \int_a^b f \, dg = I \in \mathbb{R}$, pak pro každé $\varepsilon > 0$ existuje $\Delta_\varepsilon > 0$ takové, že $|S(\sigma, \xi) - I| < \varepsilon$ platí pro všechna značená dělení (σ, ξ) intervalu $[a, b]$ taková, že $|\sigma| < \Delta_\varepsilon$. Potom $\delta_\varepsilon(x) \equiv \Delta_\varepsilon/2$ je kalibr s vlastnostmi zaručujícími rovnost $\int_a^b f \, dg = I$.

Na druhou stranu, existuje-li integrál $\int_a^b f \, dg = I$ a jestliže pro každé $\varepsilon > 0$ lze najít kalibr $\delta_\varepsilon \in \mathcal{G}[a, b]$ takový, že platí $\inf\{\delta_\varepsilon(x) : x \in [a, b]\} > 0$ a

$$|S(\sigma, \xi) - I| < \varepsilon \quad \text{pro každé } (\sigma, \xi) \in \mathcal{A}(\delta),$$

pak také $(\delta) \int_a^b f \, dg = I$. Položíme-li totiž $\Delta_\varepsilon = \inf\{\delta_\varepsilon(x) : x \in [a, b]\}$, bude platit

$$|S(\sigma, \xi) - I| < \varepsilon \quad \text{pro každé } (\sigma, \xi) \in \mathcal{T}([a, b]) \quad \text{takové, že } |\sigma| < \Delta_\varepsilon.$$

Následující věta popisuje vztah (σ) RS-integrálu a KS-integrálu.

6.13 Věta. Jestliže existuje integrál $(\sigma) \int_a^b f \, dg$, pak existuje také KS-integrál

$$\int_a^b f \, dg \quad \text{a platí} \quad \int_a^b f \, dg = (\sigma) \int_a^b f \, dg.$$

Důkaz. Označme $I = (\sigma) \int_a^b f \, dg$. Buď dáno $\varepsilon > 0$ a nechť $\sigma_\varepsilon \in \mathcal{D}[a, b]$ je dělení intervalu $[a, b]$ z definice (σ) RS-integrálu. Označme jeho body tak, že bude $\sigma_\varepsilon = \{s_0, s_1, \dots, s_m\}$, a definujme

$$\delta_\varepsilon(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} \min\{|x - s_j| : j = 0, 1, \dots, m\}, & \text{když } x \notin \sigma_\varepsilon, \\ 1, & \text{když } x \in \sigma_\varepsilon. \end{cases}$$

Budiž (σ, ξ) libovolné δ_ε -jemné značené dělení intervalu $[a, b]$. Analogickými úvahami jako v důkazu věty 6.11 zjistíme, že musí být

$$\sigma_\varepsilon \subset \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\nu(\sigma)\}. \quad (6.8)$$

Dále

$$\left. \begin{aligned} S(\sigma, \xi) &= \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \left[f(\xi_j) [g(\sigma_j) - g(\xi_j)] + f(\xi_j) [g(\xi_j) - g(\sigma_{j-1})] \right] \\ &= S(\sigma', \xi'), \end{aligned} \right\} (6.9)$$

kde $\sigma' = \{\sigma_0, \xi_1, \sigma_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu(\sigma)}, \sigma_{\nu(\sigma)}\}$, $\xi' = (\xi_1, \xi_1, \xi_2, \xi_2, \dots, \xi_{\nu(\sigma)}, \xi_{\nu(\sigma)})$. (Stane-li se, že pro nějaké k je $\sigma_{k-1} = \xi_k$ nebo $\xi_k = \sigma_k$, je třeba takové intervaly $[\sigma_{k-1}, \xi_k]$ nebo $[\xi_k, \sigma_k]$ a příslušné značky v (σ', ξ') vynechat.)

Podle (6.8) je $\sigma_\varepsilon \subset \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu(\sigma)}\} \subset \sigma'$. Vzhledem k rovnosti (6.9) a definici dělení σ_ε odtud plyne, že

$$|S(\sigma, \xi) - I| = |S(\sigma', \xi') - I| < \varepsilon$$

a podle definice 6.2 to znamená, že $\int_a^b f \, d g = I$. \square

6.14 Příklady. Všimněme si některých specifických vlastností KH-integrálu.

(i) KH-integrál je zřejmě zobecněním klasického Riemannova integrálu.

(ii) Nechť $f(x) = 0$ na $[a, b] \setminus W$, kde W je spočetná podmnožina $[a, b]$, $W = \{w_k\}$. Buď dáno libovolné $\varepsilon > 0$. Definujme

$$\delta_\varepsilon(x) = \begin{cases} 1, & \text{když } x \notin W, \\ \frac{\varepsilon}{2^{k+1}(1 + |f(w_k)|)}, & \text{když } x = w_k \in W. \end{cases}$$

Nechť $(\sigma, \xi) \in \mathcal{A}(\delta_\varepsilon)$. Označme $m = \nu(\sigma)$. Potom

$$S(\sigma, \xi) = \sum_{\substack{j=1 \\ \xi_j \in W}}^m f(\xi_j) [\sigma_j - \sigma_{j-1}].$$

Pro každé j takové, že $\xi_j = w_k \in W$ pro nějaké k , musí podle definice kalibru δ_ε platit $\sigma_j - \sigma_{j-1} \leq \frac{\varepsilon}{2^k(1 + |f(w_k)|)}$. Odtud plyne, že

$$|S(\sigma, \xi)| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |f(w_k)| \frac{\varepsilon}{2^k(1 + |f(w_k)|)} \leq \varepsilon \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \varepsilon.$$

Podle definice 6.2 to znamená, že $\int_a^b f(x) \, dx = 0$.

(iii) Nechť existuje Newtonův integrál (N) $\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$, kde funkce F je spojitá na $[a, b]$ a platí

$$F'(x) = f(x) \text{ pro každé } x \in (a, b), \quad F'(a+) = f(a), \quad F'(b-) = f(b). \quad (6.10)$$

Ukážeme, že pak je KH-integrál $\int_a^b f(x) dx$ roven $F(b) - F(a)$.

Nechť je dáno $\varepsilon > 0$. Vzhledem k (6.10) a podle definice derivace pro každé $\xi \in [a, b]$ existuje $\delta_\varepsilon(\xi) > 0$ takové, že platí

$$|F(x) - F(\xi) - f(\xi)(x - \xi)| < \frac{\varepsilon}{b-a} |x - \xi|$$

pro všechna $x \in [a, b] \cap (\xi - \delta_\varepsilon(\xi), \xi + \delta_\varepsilon(\xi))$. Buď (σ, ξ) libovolné δ_ε -jemné dělení intervalu $[a, b]$ a $m = \nu(\sigma)$. Potom pro každé $j \in \{1, 2, \dots, m\}$ máme

$$\begin{aligned} & |F(\sigma_j) - F(\sigma_{j-1}) - f(\xi_j) [\sigma_j - \sigma_{j-1}]| \\ & \leq |F(\sigma_j) - F(\xi_j) - f(\xi_j) [\sigma_j - \xi_j]| \\ & \quad + |F(\xi_j) - F(\sigma_{j-1}) - f(\xi_j) [\xi_j - \sigma_{j-1}]| \\ & < \frac{\varepsilon}{b-a} (|\sigma_j - \xi_j| + |\xi_j - \sigma_{j-1}|) = \frac{\varepsilon}{b-a} [\sigma_j - \sigma_{j-1}], \end{aligned}$$

a tudíž

$$\begin{aligned} & |[F(b) - F(a)] - S(\sigma, \xi)| \\ & = \left| \sum_{j=1}^m \left(F(\sigma_j) - F(\sigma_{j-1}) - f(\xi_j) [\sigma_j - \sigma_{j-1}] \right) \right| \\ & \leq \sum_{j=1}^m |F(\sigma_j) - F(\sigma_{j-1}) - f(\xi_j) [\sigma_j - \sigma_{j-1}]| < \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{j=1}^m [\sigma_j - \sigma_{j-1}] = \varepsilon, \end{aligned}$$

tj. $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.

6.2 Existence integrálu

V příkladech 6.14 jsme určili hodnoty některých KH-integrálů přímo z definice. Nyní si ukážeme, jak lze v některých jednoduchých příkladech určit z definice i hodnotu KS-integrálu.

6.15 Příklady. (i) Z definice 6.2 je zřejmé, že je-li $f(t) \equiv f(a)$ na $[a, b]$, pak

$$\int_a^b f dg = f(a) [g(b) - g(a)] \quad \text{a} \quad \int_a^b g df = 0$$

pro každou funkci $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

(ii) Pro libovolnou funkci $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ platí

$$\int_a^b f d\chi_{(\tau, b]} = f(\tau) \quad \text{pro } \tau \in [a, b), \quad (6.11)$$

$$\int_a^b f \, d\chi_{[\tau, b]} = f(\tau) \quad \text{pro } \tau \in (a, b], \quad (6.12)$$

$$\int_a^b f \, d\chi_{[a, \tau]} = -f(\tau) \quad \text{pro } \tau \in [a, b), \quad (6.13)$$

$$\text{a} \quad \int_a^b f \, d\chi_{[a, \tau]} = -f(\tau) \quad \text{pro } \tau \in (a, b] \quad (6.14)$$

$$\int_a^b f \, d\chi_{[\tau]} = 0 \quad \text{pro } \tau \in (a, b). \quad (6.15)$$

Ukažme si odvození vztahů (6.11) a (6.12). Všechny ostatní se z nich už odvodí použitím věty 6.11.

Nechť $\tau \in [a, b)$ a $g(x) = \chi_{(\tau, b]}(x)$ na $[a, b]$. Potom $g \equiv 0$ na $[a, \tau]$, a tedy $\int_a^\tau f \, dg = 0$ podle příkladu (i). Dále nechť

$$\delta(x) = \begin{cases} 1, & \text{když } x = \tau, \\ \frac{1}{4}(x - \tau), & \text{když } x \in (\tau, b]. \end{cases}$$

Analogicky jako v důkazu věty 6.11 zjistíme, že pro každé $(\sigma, \xi) \in \mathcal{A}(\delta; [\tau, b])$ musí být $\tau = \sigma_0 = \xi_1$, $g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1}) = 0$ pro $j = 2, 3, \dots, \nu(\sigma)$. Proto

$$S(\sigma, \xi) = f(\tau) [g(\sigma_1) - g(\tau)] = f(\tau) \quad \text{a} \quad \int_\tau^b f \, dg = f(\tau).$$

Pomocí věty 6.11 nyní už dokončíme důkaz vztahu (6.11).

Vztah (6.12) se dokazuje analogicky. Tentokrát ovšem máme $\tau \in (a, b]$ a $g(x) = \chi_{[\tau, b]}(x)$ pro $x \in [a, b]$ a $\int_\tau^b f \, dg = 0$. Položíme

$$\delta(x) = \begin{cases} 1, & \text{když } x = \tau, \\ \frac{1}{4}(\tau - x), & \text{když } x \in [a, \tau). \end{cases}$$

Pro každé $(\sigma, \xi) \in \mathcal{A}(\delta; [a, \tau])$ pak máme $\sigma_{\nu(\sigma)} = \xi_{\nu(\sigma)} = \tau$, a tedy

$$S(\sigma, \xi) = f(\tau) [g(\tau) - g(\sigma_{\nu(\sigma)-1})] = f(\tau) \quad \text{a} \quad \int_a^\tau f \, dg = f(\tau).$$

(iii) Pro libovolnou funkci g regulovanou na $[a, b]$ platí

$$\int_a^b \chi_{(\tau, b]} \, dg = g(b) - g(\tau+) \quad \text{pro } \tau \in [a, b), \quad (6.16)$$

$$\int_a^b \chi_{[\tau, b]} \, dg = g(b) - g(\tau-) \quad \text{pro } \tau \in (a, b], \quad (6.17)$$

$$\int_a^b \chi_{[a,\tau]} \, dg = g(\tau+) - g(a) \quad \text{pro } \tau \in [a, b), \quad (6.18)$$

$$\int_a^b \chi_{[a,\tau)} \, dg = g(\tau-) - g(a) \quad \text{pro } \tau \in (a, b] \quad (6.19)$$

a

$$\int_a^b \chi_{[\tau]} \, dg = g(\tau+) - g(\tau-) \quad \text{pro } \tau \in (a, b). \quad (6.20)$$

Opět se omezíme na důkaz prvních dvou vztahů.

Nechť tedy nejprve $\tau \in [a, b)$ a $f(x) = \chi_{(\tau, b]}(x)$ na $[a, b]$. Potom je

$$\int_a^\tau f \, dg = 0.$$

Buď dáno $\varepsilon > 0$. Zvolme nyní $\eta > 0$ tak, aby bylo $|g(\tau+) - g(x)| < \varepsilon$ pro každé $x \in (\tau, \tau + \eta)$ a definujme

$$\delta(x) = \begin{cases} \eta, & \text{když } x = \tau, \\ \frac{1}{4}(x - \tau), & \text{když } x \in (\tau, b]. \end{cases}$$

Pro každé $(\sigma, \xi) \in \mathcal{A}(\delta; [\tau, b])$ nyní musí být $\tau = \sigma_0 = \xi_1$ a tedy

$$\begin{aligned} & |S(\sigma, \xi) - [g(b) - g(\tau+)]| \\ &= |[g(b) - g(\sigma_{\nu(\sigma)-1})] + [g(\sigma_{\nu(\sigma)-1}) - g(\sigma_{\nu(\sigma)-2}) \\ &\quad + \cdots + [g(\sigma_2) - g(\sigma_1)] - [g(b) - g(\tau+)]| \\ &= |g(\tau+) - g(\sigma_1)|. \end{aligned}$$

Protože $\tau < \sigma_1 < \tau + \delta(\tau) = \tau + \eta$, plyne odtud a z definice η , že

$$|S(\sigma, \xi) - [g(b) - g(\tau+)]| < \varepsilon \quad \text{pro každé } (\sigma, \xi) \in \mathcal{A}(\delta; [\tau, b]).$$

Tudíž

$$\int_a^b f \, dg = \int_a^\tau f \, dg + \int_\tau^b f \, dg = g(b) - g(\tau+),$$

tj. platí (6.16).

Ve druhém případě je $\tau \in (a, b]$ a $f(x) = \chi_{[\tau, b]}(x)$ pro $x \in [a, b]$. Máme

$$\int_\tau^b f \, dg = g(b) - g(\tau).$$

Zvolme $\eta > 0$ tak, aby platilo $|g(\tau-) - g(x)| < \varepsilon$ pro každé $x \in (\tau - \eta, \tau)$, a definujme

$$\delta(x) = \begin{cases} \eta, & \text{když } x = \tau, \\ \frac{1}{4}(\tau - x), & \text{když } x \in [a, \tau). \end{cases}$$

Tím si opět vynutíme, že pro každé $(\sigma, \xi) \in \mathcal{A}(\delta; [a, \tau])$ bude $\tau = \sigma_{\nu(\sigma)} = \xi_{\nu(\sigma)}$, a tudíž

$$S(\sigma, \xi) = [g(\tau) - g(\sigma_{\nu(\sigma)-1})],$$

kde $\sigma_{\nu(\sigma)-1} \in (\tau - \eta, \tau)$. Jako v předešlém případě odtud plyne, že platí

$$\int_a^\tau f \, dg = g(\tau) - g(\tau-), \quad \text{tj. } \int_a^b f \, dg = \int_a^\tau f \, dg + \int_\tau^b f \, dg = g(b) - g(\tau-).$$

Pokud jde o existenci integrálu, můžeme podle cvičení 2.34 (i) výše uvedené příklady shrnout do následujícího tvrzení.

6.16 Důsledek. *Jestliže $g \in \mathbb{G}[a, b]$ a $f \in \mathbb{S}[a, b]$, pak oba integrály*

$$\int_a^b f \, dg \quad \text{a} \quad \int_a^b g \, df$$

existují.

6.17 Cvičení. Dokažte následující tvrzení:

Nechť $h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in \mathbb{R}$, $W = \{w_1, w_2, \dots, w_n\} \subset [a, b]$ a $h(x) = c$ pro $x \in [a, b] \setminus W$. Potom

$$\int_a^b f \, dh = f(b)h(b) - f(a)h(a) - (f(b) - f(a))c$$

platí pro každou funkci $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

(Návod: funkci h zapišme ve tvaru $h(x) = \sum_{k=1}^n [h(w_k) - c] \chi_{[w_k]}(x)$.)

Další věta poskytuje základní odhad pro integrál $\int_a^b f \, dg$ za předpokladu, že g má konečnou variaci na $[a, b]$. Na funkci f přitom žádné zásadní omezení neklademe. Pochopitelně, že reálný význam bude mít tvrzení věty pouze pro případ, že f je ohraničená na $[a, b]$.

6.18 Věta. *Jestliže $g \in \mathbb{BV}[a, b]$ a $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ jsou takové, že integrál $\int_a^b f \, dg$ existuje, pak platí*

$$\left| \int_a^b f \, dg \right| \leq \|f\| \operatorname{var}_a^b g. \quad (6.21)$$

Jestliže navíc existuje také integrál $\int_a^b |f(x)| \, d[\text{var}_a^x g]$, pak platí

$$\left| \int_a^b f \, dg \right| \leq \int_a^b |f(x)| \, d[\text{var}_a^x g] \leq \|f\| \text{var}_a^b g. \quad (6.22)$$

Důkaz plyne z toho, že nerovnosti

$$|S(\sigma, \xi)| \leq \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} |f(\xi_j)| |g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})| \leq \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} |f(\xi_j)| \text{var}_{\sigma_{j-1}}^{\sigma_j} g \leq \|f\| \text{var}_a^b g$$

platí pro každé značené dělení (σ, ξ) intervalu $[a, b]$. \square

Také další jednoduchý odhad integrálu se opírá o definici KS-integrálu.

6.19 Věta. *Nechť $g \in \mathbb{BV}[a, b]$ a $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ jsou takové, že integrál $\int_a^b f \, dg$ existuje. Dále nechť existují kalibr $\delta \in \mathcal{G}[a, b]$ a funkce $u : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ neklesající na $[a, b]$ takové, že*

$$\left. \begin{array}{l} \tau \in [a, b] \quad a \quad t \in (\tau - \delta(\tau), \tau + \delta(\tau)) \cap [a, b] \\ \implies |t - \tau| |f(\tau)| |g(t) - g(\tau)| \leq (t - \tau) (u(t) - u(\tau)). \end{array} \right\} \quad (6.23)$$

Potom

$$\left| \int_a^b f \, dg \right| \leq u(b) - u(a). \quad (6.24)$$

Důkaz. Pro každé δ -jemné značené dělení (σ, ξ) intervalu $[a, b]$ máme podle (6.23)

$$\begin{aligned} |S(\sigma, \xi)| &\leq \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} |f(\xi_j)| (|g(\sigma_j) - g(\xi_j)| + |g(\xi_j) - g(\sigma_{j-1})|) \\ &\leq \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} (u(\sigma_j) - u(\sigma_{j-1})) = u(b) - u(a). \end{aligned}$$

Vzhledem k definici KS-integrálu plyne odtud nerovnost (6.24). \square

Věta 6.18 nám umožní dokázat nejjednodušší větu o konvergenci integrálů.

6.20 Věta. *Nechť $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ je ohraničená na $[a, b]$, $g \in \mathbb{BV}[a, b]$ a nechť posloupnost $\{f_n\}$ funkcí definovaných na intervalu $[a, b]$ je taková, že*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\| = 0, \quad (6.25)$$

přičemž existují všechny integrály $\int_a^b f_n \, dg$, $n \in \mathbb{N}$. Potom existuje také integrál $\int_a^b f \, dg$ a platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n \, dg = \int_a^b f \, dg. \quad (6.26)$$

D ů k a z . a) Protože f je ohraničená, plyne z předpokladu (6.25), že existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že platí

$$\|f_n\| \leq \|f\| + 1 < \infty \quad \text{pro všechna } n \geq n_0.$$

Podle věty 6.18 tedy máme

$$\left| \int_a^b f_n \, dg \right| \leq (\|f\| + 1) \text{var}_a^b g < \infty \quad \text{pro všechna } n \geq n_0.$$

Podle Bolzanovy-Weierstrašovy věty (viz větu 2.19) tedy existují rostoucí posloupnost $\{n_k\} \subset \mathbb{N}$ a číslo $I \in \mathbb{R}$ takové, že platí $n_1 \geq n_0$ a

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^b f_{n_k} \, dg = I. \quad (6.27)$$

b) Označme

$$\left. \begin{aligned} I_k &= \int_a^b f_{n_k} \, dg && \text{pro } k \in \mathbb{N}, \\ S_k(\sigma, \xi) &= S_{f_{n_k} \Delta g}(\sigma, \xi) && \text{pro } k \in \mathbb{N}, (\sigma, \xi) \in \mathcal{T}[a, b], \\ S(\sigma, \xi) &= S_{f \Delta g}(\sigma, \xi) && \text{pro } (\sigma, \xi) \in \mathcal{T}[a, b]. \end{aligned} \right\} \quad (6.28)$$

Bud' dáno $\varepsilon > 0$. Vzhledem k (6.25) a (6.27) můžeme zvolit $k_0 \in \mathbb{N}$ tak, že platí

$$|I_k - I| < \varepsilon \quad \text{a} \quad \|f_{n_k} - f\| < \varepsilon \quad \text{pro } k \geq k_0. \quad (6.29)$$

Dále nechť $\delta_0 \in \mathcal{G}[a, b]$ je kalibr na $[a, b]$ takový, že pro všechna δ_0 -jemná značná dělení (σ, ξ) intervalu $[a, b]$ platí

$$|S_{k_0}(\sigma, \xi) - I_{k_0}| < \varepsilon. \quad (6.30)$$

Pro každé $(\sigma, \xi) \in \mathcal{A}(\delta_0)$ máme podle (6.29)

$$\begin{aligned} |S(\sigma, \xi) - S_{k_0}(\sigma, \xi)| &= \left| \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} (f(\xi_j) - f_{n_{k_0}}(\xi_j)) (g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})) \right| \\ &< \|f_{n_{k_0}} - f\| V(g, \sigma) \leq \varepsilon \text{var}_a^b g. \end{aligned}$$

Tudíž, vzhledem k (6.29) a (6.30), dostáváme

$$\begin{aligned} |S(\sigma, \xi) - I| &\leq |S(\sigma, \xi) - S_{k_0}(\sigma, \xi)| + |S_{k_0}(\sigma, \xi) - I_{k_0}| + |I_{k_0} - I| \\ &< \varepsilon (\text{var}_a^b g + 2) \end{aligned}$$

pro každé $(\sigma, \xi) \in \mathcal{A}(\delta_0)$. To znamená, že platí

$$\int_a^b f \, dg = I = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^b f_{n_k} \, dg.$$

c) Konečně, použitím vět 6.8 a 6.18 dostaneme

$$\left| \int_a^b f_n \, dg - \int_a^b f \, dg \right| \leq \|f_n - f\| \text{var}_a^b g \quad \text{pro každé } n \in \mathbb{N}.$$

Platí tedy i (6.26). □

Nyní můžeme formulovat první významnější existenční výsledek.

6.21 Věta. *Nechť $f \in \mathbb{G}[a, b]$ a $g \in \mathbb{BV}[a, b]$. Potom integrál $\int_a^b f \, dg$ existuje a platí (6.22).*

Důkaz. Podle věty 4.8 (ii) existuje posloupnost $\{f_n\}$ jednoduchých skokových funkcí, která konverguje stejnoměrně na $[a, b]$ k funkci f . Podle důsledků 2.16

a 6.16 integrál $\int_a^b f_n \, dg$ existuje pro každé $n \in \mathbb{N}$. To znamená, že podle věty 6.20

existuje také integrál $\int_a^b f \, dg$ a platí (6.26).

Zřejmě $|f| \in \mathbb{G}[a, b]$. Podle předešlé části důkazu tedy existuje také integrál $\int_a^b |f(x)| \, d[\text{var}_a^x g]$, a tudíž podle věty 6.18 platí (6.22). □

6.22 Příklad. Ukážeme si jednu netriviální aplikaci vět 6.19 a 6.21.

Mějme funkci $h: [a, b] \rightarrow [0, \infty)$ neklesající a zleva spojitou na $(a, b]$. Dokážeme, že pro každé $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ platí

$$\int_a^b h^k \, dh \leq \frac{h^{k+1}(b) - h^{k+1}(a)}{k+1}. \quad (6.31)$$

Integrál na levé straně nerovnosti (6.31) zřejmě existuje podle věty 6.21. Nejprve provedeme elementární úpravu

$$\frac{h^{k+1}(t) - h^{k+1}(\tau)}{k+1} = \frac{h(t) - h(\tau)}{k+1} \left[\sum_{i=0}^k h^{k-i}(t) h^i(\tau) \right] \quad (6.32)$$

a všimněme si toho, že za našich předpokladů je funkce h ohraničená na $[a, b]$. Jako další krok ukážeme, že ke každému $\varepsilon > 0$ a každému $\tau \in (a, b]$ existuje $\delta(\tau) > 0$ takové, že platí nerovnost

$$h^{k-i}(t) h^i(\tau) > h^k(\tau) - \varepsilon \text{ pro } t \in (\tau - \delta(\tau), \tau + \delta(\tau)) \text{ a } i = 0, 1, \dots, k. \quad (6.33)$$

Díky monotónnosti funkce h je snadné ověřit, že nerovnost (6.33) platí pro každé $t \in (\tau, b]$. Na druhou stranu, díky spojitosti funkce h zleva, ke každému $\varepsilon > 0$ a každému $\tau \in (a, b]$ najdeme $\delta(\tau) > 0$ takové, aby platilo

$$0 \leq h^{k-i}(\tau) - h^{k-i}(t) < \frac{\varepsilon}{\|h\|}, \quad \text{jakmile } t \in (\tau - \delta(\tau), \tau].$$

Odtud plyne, že pro $t \in (\tau - \delta(\tau), \tau]$ a $i = 0, 1, \dots, k$ platí

$$0 \leq h^k(\tau) - h^{k-i}(t) h^i(\tau) = (h^{k-i}(\tau) - h^{k-i}(t)) h^i(\tau) < \frac{\varepsilon}{\|h\|} \|h\| = \varepsilon.$$

Platí tedy také (6.33). Dosazením (6.33) do (6.32) dostaneme

$$\begin{aligned} \frac{h^{k+1}(t) - h^{k+1}(\tau)}{k+1} &> \frac{h(t) - h(\tau)}{k+1} \sum_{i=0}^k (h^k(\tau) - \varepsilon) \\ &= (h(t) - h(\tau)) h^k(\tau) - \varepsilon \end{aligned}$$

pro každé $\varepsilon > 0$, $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, $t \in (\tau - \delta(\tau), \tau]$ a $i = 0, 1, \dots, k$. Platí tedy (6.23), kde

$$f(t) = h^k(t), \quad g(t) = h(t) \quad \text{a} \quad u(t) = \frac{h^{k+1}(t)}{k+1} \quad \text{pro } t \in [a, b]. \quad (6.34)$$

Podle věty 6.19 tedy platí nerovnost (6.24).

6.23 Cvičení. Dokažte tvrzení:

Nechť funkce $h: [a, b] \rightarrow [0, \infty)$ je nerostoucí a zprava spojitá na $[a, b]$. Potom pro každé $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ platí

$$\int_a^b h^k \, dh \geq \frac{h^{k+1}(b) - h^{k+1}(a)}{k+1}.$$

Následující konvergenční výsledek je tak trochu symetrický k větě 6.20.

6.24 Věta. *Nechť $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ je ohraničená na $[a, b]$, $g \in \mathbb{BV}[a, b]$ a nechť posloupnost $\{g_n\}$ funkcí definovaných na intervalu $[a, b]$ je taková, že platí*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{var}_a^b(g_n - g) = 0,$$

přičemž existují všechny integrály $\int_a^b f \, dg_n$, $n \in \mathbb{N}$. Potom existuje také integrál

$$\int_a^b f \, d g \text{ a platí}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f \, d g_n = \int_a^b f \, d g. \quad (6.35)$$

D ů k a z . Bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat

$$g_n(a) = g(a) = 0 \quad \text{pro všechna } n \in \mathbb{N}.$$

Dále je důkaz podobný důkazu věty 6.20. Existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že platí

$$\text{var}_a^b g_n \leq \text{var}_a^b g + 1 \quad \text{pro všechna } n \geq n_0.$$

Podle věty 6.18 tedy máme

$$\left| \int_a^b f \, d g_n \right| \leq \|f\| (\text{var}_a^b g + 1) \quad \text{pro všechna } n \geq n_0$$

a podle Bolzanovy-Weierstraßovy věty (viz větu 2.19) tedy existují číslo $I \in \mathbb{R}$ a rostoucí posloupnost $\{n_k\} \subset \mathbb{N}$ takové, že platí $n_1 \geq n_0$ a

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^b f \, d g_{n_k} = I.$$

Podobně jako v (6.28) označme

$$\left. \begin{aligned} I_k &= \int_a^b f \, d g_{n_k} && \text{pro } k \in \mathbb{N}, \\ S_k(\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\xi}) &= S_{f \Delta g_{n_k}}(\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\xi}) && \text{pro } k \in \mathbb{N}, (\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\xi}) \in \mathcal{T}[a, b], \\ S(\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\xi}) &= S_{f \Delta g}(\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\xi}) && \text{pro } (\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\xi}) \in \mathcal{T}[a, b]. \end{aligned} \right\} \quad (6.36)$$

Buď dáno $\varepsilon > 0$. Zvolme $k_0 \in \mathbb{N}$ a kalibr $\delta_0 \in \mathcal{G}[a, b]$ tak, aby platilo

$$|I_{k_0} - I| < \varepsilon, \quad \text{var}_a^b (g_{n_{k_0}} - g) < \varepsilon$$

a

$$|S_{k_0}(\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\xi}) - I_{k_0}| < \varepsilon \quad \text{pro } (\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\xi}) \in \mathcal{A}(\delta_0).$$

Potom pro každé $(\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\xi}) \in \mathcal{A}(\delta_0)$ máme

$$\begin{aligned} |S(\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\xi}) - S_{k_0}(\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\xi})| &= \left| \sum_{j=1}^{\nu(\boldsymbol{\sigma})} f(\xi_j) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1}) - g_{n_{k_0}}(\sigma_j) + g_{n_{k_0}}(\sigma_{j-1})] \right| \\ &\leq \|f\| V(g_{n_{k_0}} - g, \boldsymbol{\sigma}) \leq \|f\| \text{var}_a^b (g_{n_{k_0}} - g) \leq \varepsilon \|f\|. \end{aligned}$$

Pro každé $(\sigma, \xi) \in \mathcal{A}(\delta_0)$ tedy platí

$$\begin{aligned} |S(\sigma, \xi) - I| & \\ & \leq |S(\sigma, \xi) - S_{k_0}(\sigma, \xi)| + |S_{k_0}(\sigma, \xi) - I_{k_0}| + |I_{k_0} - I| \\ & < \varepsilon (\|f\| + 2). \end{aligned}$$

Odtud plyne, že

$$\int_a^b f \, dg = I = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^b f \, dg_{n_k}.$$

Konečně, opětovným použitím vět 6.8 a 6.18 dostaneme

$$\left| \int_a^b f \, dg_n - \int_a^b f \, dg \right| \leq \|f\| \operatorname{var}_a^b (g_n - g) \quad \text{pro každé } n \in \mathbb{N}.$$

Platí tedy (6.35). □

Předpokládejme, že funkce f je regulovaná na $[a, b]$ a g má konečnou variaci na $[a, b]$. Podle věty 6.21 potom existuje integrál $\int_a^b f \, dg$. Pro aplikace potřebujeme ale dokázat, že tento integrál existuje i v symetrické situaci, tj. když $f \in \mathbb{BV}[a, b]$ a $g \in \mathbb{G}[a, b]$. To bude nyní naším cílem.

Podle věty 2.39 můžeme funkci f rozložit na součet spojitě funkce f^C s konečnou variací a skokové funkce f^B . Podle cvičení 5.56 a věty 6.13 existuje integrál $\int_a^b f^C \, dg$. Vzpomeneme-li si na lemma 2.42, podle kterého existuje posloupnost jednoduchých skokových funkcí $\{f_n^B\} \subset \mathbb{S}[a, b]$ stejnoměrně konvergující k f^B na $[a, b]$, nahlédneme, že nám stačí dokázat konvergenční větu, ze které by plynulo, že platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n^B \, dg = \int_a^b f^B \, dg. \quad (6.37)$$

(Integrály $\int_a^b f_n^B \, dg$ existují podle důsledku 6.16 pro $n \in \mathbb{N}$, nicméně věta 6.20 a ani věta 6.24 platnost rovnosti (6.37) nezaručují.)

Následující věta poskytuje odhad symetrický k odhadu (6.21) z věty 6.18.

6.25 Věta. *Nechť funkce g ohraničená na $[a, b]$ a $f \in \mathbb{B}\mathbb{V}[a, b]$ jsou takové, že existuje integrál $\int_a^b f \, dg$. Potom platí*

$$\left| \int_a^b f \, dg \right| \leq (|f(a)| + |f(b)| + \text{var}_a^b f) \|g\|. \quad (6.38)$$

D ů k a z. Pro libovolné $(\sigma, \xi) \in \mathcal{T}[a, b]$ máme

$$\begin{aligned} S(\sigma, \xi) &= f(\xi_1) [g(\sigma_1) - g(a)] + f(\xi_2) [g(\sigma_2) - g(\sigma_1)] \\ &\quad + \cdots + f(\xi_m) [g(b) - g(\sigma_{m-1})] \\ &= f(b)g(b) - f(a)g(a) \\ &\quad - [f(\xi_1) - f(a)]g(a) - [f(\xi_2) - f(\xi_1)]g(\sigma_1) \\ &\quad - \cdots - [f(b) - f(\xi_m)]g(b) \\ &= f(b)g(b) - f(a)g(a) - \sum_{j=0}^m [f(\xi_{j+1}) - f(\xi_j)]g(\sigma_j), \end{aligned}$$

kde $m = \nu(\sigma)$, $\xi_0 = a$ a $\xi_{m+1} = b$. Odtud plyne, že

$$|S(\sigma, \xi)| \leq (|f(a)| + |f(b)| + \sum_{j=0}^m |f(\xi_{j+1}) - f(\xi_j)|) \|g\|.$$

Nerovnost

$$|S(\sigma, \xi)| \leq (|f(a)| + |f(b)| + \text{var}_a^b f) \|g\| \quad (6.39)$$

tedy platí pro každé $(\sigma, \xi) \in \mathcal{T}[a, b]$. Odtud už tvrzení (6.38) okamžitě plyne. \square

Nyní dokážeme konvergenční tvrzení, které zaručí, že bude platit potřebný vztah (6.37).

6.26 Lemma. *Nechť funkce g je ohraničená na $[a, b]$, $f \in \mathbb{B}\mathbb{V}[a, b]$ a nechť posloupnost $\{f_n\} \subset \mathbb{B}\mathbb{V}[a, b]$ je taková, že*

$$\int_a^b f_n \, dg \text{ existuje pro každé } n \in \mathbb{N} \quad a \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_{\mathbb{B}\mathbb{V}} = 0.$$

Potom existuje také integrál $\int_a^b f \, dg$ a platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n \, dg = \int_a^b f \, dg.$$

D ů k a z . Podle vět 6.8 a 6.25 je

$$\left| \int_a^b f_n \, dg - \int_a^b f_m \, dg \right| \leq 2 \|g\| \|f_n - f_m\|_{\mathbb{B}\mathbb{V}} \quad \text{pro libovolná } m, n \in \mathbb{N}.$$

Posloupnost $\left\{ \int_a^b f_n \, dg \right\}$ je tedy cauchyovská a existuje $I \in \mathbb{R}$ takové, že platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n \, dg = I.$$

Ukážeme, že $\int_a^b f \, dg = I$. Buď dáno libovolné $\varepsilon > 0$. Zvolme $n_0 \in \mathbb{N}$ tak, aby platilo

$$\left| \int_a^b f_{n_0} \, dg - I \right| < \varepsilon \quad \text{a} \quad \|f_{n_0} - f\|_{\mathbb{B}\mathbb{V}} < \varepsilon.$$

Dále zvolme $\delta_\varepsilon \in \mathcal{G}[a, b]$ tak, aby pro každé $(\sigma, \xi) \in \mathcal{A}(\delta_\varepsilon)$ platilo

$$\left| S_{n_0}(\sigma, \xi) - \int_a^b f_{n_0} \, dg \right| < \varepsilon,$$

kde $S_{n_0}(\sigma, \xi) = S_{f_{n_0} \Delta g}(\sigma, \xi)$. Podle (6.39) pro libovolné $(\sigma, \xi) \in \mathcal{T}(\delta_\varepsilon)$ máme

$$\begin{aligned} & |S(\sigma, \xi) - S_{n_0}(\sigma, \xi)| \\ & \leq \left(|f(a) - f_{n_0}(a)| + |f(b) - f_{n_0}(b)| + \text{var}_a^b(f - f_{n_0}) \right) \|g\| \\ & \leq 2 \|f - f_{n_0}\|_{\mathbb{B}\mathbb{V}} \|g\|. \end{aligned}$$

Souhrnem, pro libovolné $(\sigma, \xi) \in \mathcal{A}(\delta_\varepsilon)$ dostáváme

$$\begin{aligned} & |S(\sigma, \xi) - I| \\ & \leq |S(\sigma, \xi) - S_{n_0}(\sigma, \xi)| + \left| S_{n_0}(\sigma, \xi) - \int_a^b f_{n_0} \, dg \right| \\ & \quad + \left| \int_a^b f_{n_0} \, dg - I \right| \\ & < 2 \|f - f_{n_0}\|_{\mathbb{B}\mathbb{V}} \|g\| + 2\varepsilon < \varepsilon 2 (\|g\| + 1). \end{aligned}$$

Odtud plyne rovnost

$$\int_a^b f \, dg = I = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n \, dg. \quad \square$$

Nyní už budeme umět dokázat kýžený existenční výsledek. V následujících tvrzeních a jejich důkazech používáme důsledně konvence (x) z Úmluv a označení a klademe $g(a-) = g(a)$, $g(b+) = g(b)$, tj.

$$\Delta^- g(a) = \Delta^+ g(b) = 0, \quad \Delta g(a) = \Delta^+ g(a), \quad \Delta g(b) = \Delta^- g(b)$$

pro každou funkci g regulovanou na $[a, b]$. V tomto smyslu je třeba i rozumět symbolům pro funkce $g(x-)$, resp. $g(x+)$ definované na $[a, b]$. Není těžké si rozmyslet, že například pro $g \in \mathbb{G}[a, b]$ a $h(x) = g(x-)$ platí

$$h(x-) = h(x) = g(x-), \quad h(x+) = g(x+) \quad \text{na } [a, b].$$

Analogicky, pro $g \in \mathbb{G}[a, b]$ a $h(x) = g(x+)$ máme

$$h(x+) = h(x) = g(x+), \quad h(x-) = g(x-) \quad \text{na } [a, b].$$

6.27 Věta. Jestliže $f \in \mathbb{BV}[a, b]$, $g \in \mathbb{G}[a, b]$, pak integrál $\int_a^b f \, d g$ existuje a platí (6.38).

D ů k a z. Nechť $g \in \mathbb{G}[a, b]$, $f \in \mathbb{BV}[a, b]$ a W je množina bodů nespojitosti funkce f v $[a, b]$. Podle věty 2.21 je W nejvýše spočetná, tj. $W = \{w_k : k \in \mathbb{K}\}$, kde $\mathbb{K} = \{1, 2, \dots, m\}$ pro nějaké $m \in \mathbb{N}$ nebo $\mathbb{K} = \mathbb{N}$.

Nechť $f = f^C + f^B$ je Jordanův rozklad funkce f na spojitou část f^C a skokovou část f^B definovanou jako f_2 v (2.26). Položme

$$f_n^B(x) = \sum_{k \in \mathbb{K} \cap [1, n]} \Delta^- f(w_k) \chi_{[w_k, b]}(x) + \sum_{k \in \mathbb{K} \cap [1, n]} \Delta^+ f(w_k) \chi_{(w_k, b]}(x)$$

pro $n \in \mathbb{N}$ a $x \in [a, b]$. Zřejmě $f_n^B \in \mathbb{S}[a, b]$ pro každé $n \in \mathbb{N}$ a podle lemmatu 2.42 platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n^B - f^B\|_{\mathbb{BV}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \text{var}_a^b(f^B - f_n^B) = 0.$$

Dále podle důsledku 6.16 integrál $\int_a^b f_n^B \, d g$ existuje pro každé $n \in \mathbb{N}$. Je-li tedy množina \mathbb{K} konečná, existence integrálu $\int_a^b f^B \, d g$ plyne triviálně. Není-li \mathbb{K} konečná, pak integrál $\int_a^b f^B \, d g$ existuje podle lemmatu 6.26.

Podle cvičení 5.56 a věty 6.13 existuje integrál $\int_a^b f^C \, d g$. Existence integrálu $\int_a^b f \, d g$ tedy již plyne z věty 6.8. Konečně, podle věty 6.25 platí také (6.38). \square

Přímým důsledkem vět 4.4, 6.8 a 6.27 je následující konvergenční tvrzení.

6.28 Důsledek. *Jestliže $g_n \in \mathbb{G}[a, b]$ pro $n \in \mathbb{N}$ a $\lim_{n \rightarrow \infty} \|g_n - g\| = 0$, pak pro každou funkci $f \in \mathbb{BV}[a, b]$ platí*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f \, d g_n = \int_a^b f \, d g. \quad (6.40)$$

Následující tvrzení navazuje na důkaz věty 6.27 a dává návod k výpočtu integrálu $\int_a^b f \, d g$, je-li známa hodnota integrálu $\int_a^b f^C \, d g$, kde f^C značí spojitou část funkce f .

6.29 Důsledek. *Jestliže $f \in \mathbb{BV}[a, b]$, $g \in \mathbb{G}[a, b]$, W je množina bodů nespojivosti funkce f v $[a, b]$ a f^C je spojitá část funkce f , $f^C(a) = f(a)$, pak*

$$\left. \begin{aligned} \int_a^b f \, d g &= \int_a^b f^C \, d g \\ &+ \sum_{w \in W} [\Delta^- f(w) (g(b) - g(w-)) + \Delta^+ f(w) (g(b) - g(w+))]. \end{aligned} \right\} \quad (6.41)$$

D ů k a z. Jako v důkazu věty 6.27 je $W = \{w_k : k \in \mathbb{K}\}$, kde $\mathbb{K} = \{1, 2, \dots, m\}$ pro nějaké $m \in \mathbb{N}$ nebo $\mathbb{K} = \mathbb{N}$. Nechť

$$f_n^B(x) = \sum_{k \in \mathbb{K} \cap [1, n]} [\Delta^- f(w_k) \chi_{[w_k, b]}(x) + \Delta^+ f(w_k) \chi_{(w_k, b]}(x)]$$

pro $n \in \mathbb{N}$ a $x \in [a, b]$. Podle lematu 2.42 platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n^B - f^B\|_{\mathbb{BV}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \text{var}_a^b (f^B - f_n^B) = 0.$$

Dále podle (6.16), (6.17) a věty 6.8, máme

$$\left. \begin{aligned} \int_a^b f_n^B \, d g \\ = \sum_{k \in \mathbb{K} \cap [1, n]} \left(\Delta^- f(w_k) [g(b) - g(w_k-)] + \Delta^+ f(w_k) [g(b) - g(w_k+)] \right) \end{aligned} \right\} \quad (6.42)$$

pro každé $n \in \mathbb{N}$. Je-li \mathbb{K} konečná, plyne odtud okamžitě, že platí (6.41).

Je-li $\mathbb{K} = \mathbb{N}$, pak podle lemmatu 6.26 platí

$$\int_a^b f^{\mathbb{B}} \, dg = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n^{\mathbb{B}} \, dg. \quad (6.43)$$

Podle důsledku 2.27 je

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{\infty} \left| \Delta^- f(w_k) (g(b) - g(w_k-)) + \Delta^+ f(w_k) (g(b) - g(w_k+)) \right| \\ & \leq 2 \|g\| \sum_{k=1}^{\infty} \left(|\Delta^- f(w_k)| + |\Delta^+ f(w_k)| \right) \leq 2 \|g\| (\text{var}_a^b f) < \infty. \end{aligned}$$

Vzhledem k (6.42) a (6.43) tudíž dostáváme

$$\left. \begin{aligned} & \int_a^b f^{\mathbb{B}} \, dg \\ & = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\Delta^- f(w_k) (g(b) - g(w_k-)) + \Delta^+ f(w_k) (g(b) - g(w_k+)) \right). \end{aligned} \right\} \quad (6.44)$$

Platí tedy (6.41). □

V situaci symetrické k důsledku 6.29 máme

6.30 Lemma. *Jestliže $f \in \mathbb{G}[a, b]$, $g \in \mathbb{BV}[a, b]$, W je množina bodů nespojitosti funkce g v $[a, b]$ a $g^{\mathbb{C}}$ je spojitá část funkce g , $g^{\mathbb{C}}(a) = g(a)$, pak*

$$\int_a^b f \, dg = \int_a^b f \, dg^{\mathbb{C}} + \sum_{w \in W} f(w) \Delta g(w), \quad (6.45)$$

kde $\Delta g(a) = \Delta^+ g(a)$ a $\Delta g(b) = \Delta^- g(b)$.

Důkaz je analogický důkazu důsledku 6.29 a je ponechán čtenáři jako cvičení. □

6.31 Cvičení. Dokažte lemma 6.30. (Návod: využijte lemma 2.42 a větu 6.20 a postupujte jako při důkazu důsledku 6.29.)

6.3 Integrace per-partes

Pro důkazy důsledku 6.29 a lemmatu 6.30 byly užitečné příklady 6.15. Následující technická lemmata jsou potřebná pro důkaz věty o integraci per-partes, která je naším dalším významnějším cílem. Také v jejich důkazech budou příklady 6.15 využity.

6.32 Lemma. *Nechť $h \in \mathbb{BV}[a, b]$, $c \in \mathbb{R}$ a $W \subset [a, b]$ je nejvýše spočetná množina taková, že platí*

$$h(x) = c \quad \text{pro } x \in [a, b] \setminus W. \quad (6.46)$$

Potom pro každou funkci $g \in \mathbb{G}[a, b]$ platí

$$\int_a^b h \, dg = c[g(b) - g(a)] + \sum_{w \in W} [h(w) - c] \Delta g(w), \quad (6.47)$$

kde $\Delta g(w) = \Delta^- g(w)$, jestliže $w = b$ a $\Delta g(w) = \Delta^+ g(w)$, jestliže $w = a$.

D ů k a z. *Nechť je dána funkce $g \in \mathbb{G}[a, b]$. Protože $h \in \mathbb{G}[a, b]$, máme podle (6.46)*

$$h(x-) = h(x+) = h(a+) = h(b-) = c \quad \text{pro každé } x \in (a, b).$$

Funkce $h^C(x) \equiv c$ je tedy spojitá část funkce h , $h^B = h - h^C$ a

$$\Delta^- h(x) = h(x) - c = -\Delta^+ h(x) \quad \text{pro každé } x \in (a, b).$$

Podle důsledku 6.29 (kde $f = h$) tedy dostáváme

$$\begin{aligned} \int_a^b h \, dg &= \int_a^b c \, dg + \sum_{w \in W} (h(w) - c) [g(b) - g(w-) - g(b) + g(w+)] \\ &= c[g(b) - g(a)] + \sum_{w \in W} [h(w) - c] \Delta g(w), \end{aligned}$$

tj. platí (6.47). □

6.33 Cvičení. Pomocí lemmatu 6.32 dokažte, že je-li $\tau \in (a, b)$, $\varkappa \in \mathbb{R}$ a

$$g(t) = \begin{cases} 0 & \text{když } t < \tau, \\ \varkappa & \text{když } t = \tau, \\ 1 & \text{když } t > \tau, \end{cases}$$

pak $\int_a^b \varphi \, dg = \varphi(\tau) \varkappa$ pro libovolnou funkci $\varphi \in \mathbb{BV}[a, b]$.

(Návod: položte $h(t) = \varphi(t) g(t)$ pro $t \in [a, b]$ a spočítejte pomocí lemmatu integrály $\int_a^\tau h \, dg$ a $\int_\tau^b h \, dg$.)

6.34 Lemma. *Nechť $h \in \mathbb{G}[a, b]$, $c \in \mathbb{R}$ a nechť $W \subset [a, b]$ je nejvýše spočetná množina taková, že platí (6.46). Potom*

$$\int_a^b f \, dh = f(b)h(b) - f(a)h(a) - [f(b) - f(a)]c \quad (6.48)$$

platí pro každou funkci $f \in \mathbb{BV}[a, b]$.

Důkaz. a) Funkce h splňuje (6.46) právě tehdy, když existuje množina $\mathbb{K} \subset \mathbb{N}$ taková, že $W = \{w_k \in [a, b] : k \in \mathbb{K}\}$ a

$$h(x) = c + \sum_{k \in \mathbb{K}} (h(w_k) - c) \chi_{[w_k]}(x) \quad \text{pro } x \in [a, b].$$

Pro $n \in \mathbb{N}$ položme $\mathbb{K}_n = \mathbb{K} \cap [1, n]$, $W_n = \{w_k : k \in \mathbb{K}_n\}$ a

$$h_n(x) = c + \sum_{k \in \mathbb{K}_n} (h(w_k) - c) \chi_{[w_k]}(x) \quad \text{pro } x \in [a, b].$$

Dokážeme, že platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|h_n - h\| = 0. \quad (6.49)$$

Nechť je tedy dáno $\varepsilon > 0$ a nechť $n_0 \in \mathbb{N}$ je takové, že

$$|h(w_k) - c| \leq \varepsilon \quad \text{pro každé } k > n_0. \quad (6.50)$$

Takové n_0 existuje, protože pro každé $k \in \mathbb{N}$ je

$$|h(w_k) - c| = \begin{cases} |\Delta^- h(w_k)|, & \text{když } w_k \in (a, b), \\ |\Delta^+ h(a)|, & \text{když } w_k = a, \\ |\Delta^- h(b)|, & \text{když } w_k = b \end{cases}$$

a množina těch $k \in \mathbb{N}$, pro něž $|h(w_k) - c| > \varepsilon$, může mít podle důsledku 4.10 jenom nejvýše konečný počet (n_0) prvků. Tudíž

$$|h_n(x) - h(x)| = \left\{ \begin{array}{ll} |c - h(x)|, & \text{když } x \in [a, b] \setminus W_n, \\ 0, & \text{když } x \in W_n \end{array} \right\} \leq \varepsilon$$

pro $n \geq n_0$ a $x \in [a, b]$. Platí tedy (6.49).

b) Nechť $f \in \mathbb{BV}[a, b]$. Podle příkladu 6.15 (i), věty 6.8 a formule (6.15) (viz též cvičení 6.17) dostaneme pro každé $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} \int_a^b f \, dh_n &= \sum_{k \in \mathbb{K}_n} (h(w_k) - c) \int_a^b f \, d\chi_{[w_k]} = f(b) [h(b) - c] - f(a) [h(a) - c] \\ &= f(b) h(b) - f(a) h(a) - [f(b) - f(a)] c. \end{aligned}$$

Podle (6.49) a podle důsledku 6.28 tedy máme

$$\int_a^b f \, dh = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f \, dh_n = f(b) h(b) - f(a) h(a) - [f(b) - f(a)] c. \quad \square$$

6.35 Lemma. *Nechť $h \in \mathbb{BV}[a, b]$, $c \in \mathbb{R}$ a nechť $W \subset [a, b]$ je nejvýše spočetná množina taková, že platí (6.46). Potom (6.48) platí pro každou funkci $f \in \mathbb{G}[a, b]$.*

D ů k a z. Nechť $f \in \mathbb{G}[a, b]$ a $h \in \mathbb{BV}[a, b]$. Podle věty 4.8 (ii) existuje posloupnost $\{f_n\}$ jednoduchých skokových funkcí, která konverguje stejnoměrně na intervalu $[a, b]$ k funkci f . Podle lemmatu 6.64 máme

$$\int_a^b f_n \, dh = f_n(b) h(b) - f_n(a) h(a) - [f_n(b) - f_n(a)] c \quad (6.51)$$

pro každé $n \in \mathbb{N}$. Podle věty 6.20 je tedy

$$\int_a^b f \, dh = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n \, dh = f(b) h(b) - f(a) h(a) - [f(b) - f(a)] c. \quad \square$$

Nyní už můžeme formulovat a dokázat větu o integraci per-partes pro KS-integrály.

6.36 Věta (VĚTA O INTEGRACI PER-PARTES).

Jestliže $f \in \mathbb{G}[a, b]$ a $g \in \mathbb{BV}[a, b]$, pak existují oba integrály

$$\int_a^b f \, dg \quad \text{a} \quad \int_a^b g \, df$$

a platí

$$\left. \begin{aligned} \int_a^b f \, dg + \int_a^b g \, df &= f(b) g(b) - f(a) g(a) \\ &+ \sum_{x \in [a, b]} \left(\Delta^- f(x) \Delta^- g(x) - \Delta^+ f(x) \Delta^+ g(x) \right). \end{aligned} \right\} \quad (6.52)$$

D ů k a z. Integrál $\int_a^b f \, dg$ existuje podle věty 6.21 a integrál $\int_a^b g \, df$ existuje podle věty 6.27. Dále

$$\begin{aligned} \int_a^b f \, dg + \int_a^b g \, df &= \int_a^b f(x) \, d[g(x) + \Delta^+ g(x)] + \int_a^b g(x) \, d[f(x) - \Delta^- f(x)] \\ &\quad - \int_a^b f(x) \, d[\Delta^+ g(x)] + \int_a^b g(x) \, d[\Delta^- f(x)]. \end{aligned}$$

Není obtížné ověřit, že funkce $h(x) = \Delta^+ g(x)$ má konečnou variaci na $[a, b]$ a splňuje (6.46) s $c=0$ a $h(b)=0$. Dále $\Delta h(x)=0$ pro $x \in (a, b)$. Podle lemmatu 6.35 tedy máme

$$\int_a^b f(x) \, d[\Delta^+ g(x)] = -f(a) \Delta^+ g(a).$$

Analogicky, podle lemmatu 6.34 je $\int_a^b g(x) \, d[\Delta^- f(x)] = g(b) \Delta^- f(b)$ čili

$$\left. \begin{aligned} \int_a^b f(x) \, d[g(x)] + \int_a^b g(x) \, d[f(x)] \\ = \int_a^b f(x) \, d[g(x+)] + \int_a^b g(x) \, d[f(x-)] \\ + f(a) \Delta^+ g(a) + \Delta^- f(b) g(b). \end{aligned} \right\} \quad (6.53)$$

První integrál na pravé straně můžeme upravit na

$$\int_a^b f(x) \, d[g(x+)] = \int_a^b f(x-) \, d[g(x+)] + \int_a^b \Delta^- f(x) \, d[g(x+)]. \quad (6.54)$$

Funkce $h(x)=g(x+)$ má zřejmě konečnou variaci na $[a, b]$, $h(x-)=g(x-)$ pro $x \in [a, b]$ a $h(x+)=h(x)=g(x+)$, tj. $\Delta h(x) = \Delta g(x)$ pro $x \in [a, b]$. Protože funkce $f_1(x) = \Delta^- f(x)$ je zřejmě regulovaná na $[a, b]$, podle lemmatu 6.32 platí

$$\int_a^b \Delta^- f(x) \, d[g(x+)] = \sum_{x \in [a, b]} \Delta^- f(x) \Delta g(x). \quad (6.55)$$

Analogicky

$$\left. \begin{aligned} \int_a^b g(x) \, d[f(x-)] = \int_a^b g(x+) \, d[f(x-)] - \int_a^b \Delta^+ g(x) \, d[f(x-)] \\ = \int_a^b g(x+) \, d[f(x-)] - \sum_{x \in [a, b]} \Delta^+ g(x) \Delta f(x). \end{aligned} \right\} \quad (6.56)$$

Funkce $f(x-)$ je spojitá zleva na $(a, b]$, $g(x+)$ je spojitá zprava na $[a, b)$. Podle vět 5.55 (ii) a 6.13 tedy existují oba integrály

$$\int_a^b f(x-) \, d[g(x+)] \quad \text{a} \quad \int_a^b g(x+) \, d[f(x-)]$$

a podle věty 5.50 platí

$$\int_a^b f(x-) \, d[g(x+)] + \int_a^b g(x+) \, d[f(x-)] = f(b-)g(b) - f(a)g(a+). \quad (6.57)$$

Dosazením (6.54)–(6.57) do (6.53) dostaneme dále

$$\begin{aligned} & \int_a^b f \, dg + \int_a^b g \, df \\ &= f(b-)g(b) - f(a)g(a+) + f(a)\Delta^+g(a) + \Delta^-f(b)g(b) \\ & \quad + \sum_{x \in [a,b]} \left(\Delta^-f(x) [\Delta^-g(x) + \Delta^+g(x)] - [\Delta^-f(x) + \Delta^+f(x)] \Delta^+g(x) \right) \\ &= f(b)g(b) - f(a)g(a) + \sum_{x \in [a,b]} \left(\Delta^-f(x)\Delta^-g(x) - \Delta^+f(x)\Delta^+g(x) \right). \end{aligned}$$

Dokázali jsme tedy, že (6.52) platí. \square

6.37 Poznámka. Pro KS-integrál tedy neplatí věta o integraci per-partes v podobě, v jaké ji známe pro RS-integrály (viz větu 5.50). Je to způsobeno tím, že obor funkcí pro které existuje KS-integrál je podstatně širší než obor funkcí, pro které existují RS-integrály.

6.38 Cvičení. Dokažte, že za předpokladů věty 6.36 platí

$$\begin{aligned} \int_a^b f \, dg &= (\sigma) \int_a^b f(x+) \, dg(x-) + f(b)\Delta^-g(b) - \sum_{x \in (a,b)} \Delta^+f(x)\Delta g(x) \\ \int_a^b f \, dg &= (\sigma) \int_a^b f(x-) \, dg(x+) + f(a)\Delta^+g(a) + \sum_{x \in (a,b)} \Delta^-f(x)\Delta g(x). \end{aligned}$$

(Návod: využijte formule odvozené v průběhu důkazu věty 6.36.)

6.4 Saksovo-Henstockovo lemma a některé jeho důsledky

6.39 Lemma (SAKS-HENSTOCK). *Nechť $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ jsou takové, že integrál $\int_a^b f \, dg$ existuje. Nechť $\varepsilon > 0$ je dáno a nechť $\delta \in \mathcal{G}[a, b]$ je kalibr na $[a, b]$ takový, že platí*

$$\left| S(\sigma, \xi) - \int_a^b f \, dg \right| < \varepsilon \quad \text{pro všechna } (\sigma, \xi) \in \mathcal{A}(\delta).$$

Potom pro libovolný systém $\left\{([s_j, t_j], \theta_j) : j=1, 2, \dots, n\right\}$ takový, že

$$\left. \begin{aligned} a \leq s_1 \leq \theta_1 \leq t_1 \leq s_2 \leq \dots \leq s_n \leq \theta_n \leq t_n \leq b, \\ [s_j, t_j] \subset [\theta_j - \delta(\theta_j), \theta_j + \delta(\theta_j)] \quad \text{pro } j = 1, 2, \dots, n, \end{aligned} \right\} \quad (6.58)$$

platí nerovnost

$$\left| \sum_{j=1}^n \left[f(\theta_j) [g(t_j) - g(s_j)] - \int_{s_j}^{t_j} f \, dg \right] \right| \leq \varepsilon. \quad (6.59)$$

D ů k a z. Nechť $\left\{([s_j, t_j], \theta_j) : j=1, 2, \dots, n\right\}$ je systém splňující (6.58). Buď dáno $\eta > 0$. Označme $t_0 = a$, $s_{n+1} = b$. Je-li $j \in \{0, 1, \dots, n\}$ a $t_j < s_{j+1}$, pak, vzhledem k poznámce 6.5, existují na intervalu $[t_j, s_{j+1}]$ kalibr δ_j a δ_j -jemné značené dělení (σ^j, ξ^j) takové, že $\delta_j(x) \leq \delta(x)$ pro každé $x \in [t_j, s_{j+1}]$ a

$$\left| S(\sigma^j, \xi^j) - \int_{t_j}^{s_{j+1}} f \, dg \right| < \frac{\eta}{n+1}. \quad (6.60)$$

Nyní sestavme δ -jemné značené dělení (ρ, η) intervalu $[a, b]$ tak, aby platilo

$$\sum_{j=1}^n f(\theta_j) [g(t_j) - g(s_j)] + \sum_{j=0}^n S(\sigma^j, \xi^j) = S(\rho, \eta).$$

(Je-li $t_j = s_{j+1}$, klademe $S(\sigma^j, \xi^j) = 0$.) Vzhledem k předpokladům lemmatu tedy máme

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{j=1}^n \left(f(\theta_j) [g(t_j) - g(s_j)] - \int_{s_j}^{t_j} f \, dg \right) + \sum_{j=0}^n \left(S(\sigma^j, \xi^j) - \int_{t_j}^{s_{j+1}} f \, dg \right) \right| \\ &= \left| S(\rho, \eta) - \int_a^b f \, dg \right| < \varepsilon. \end{aligned}$$

Odtud a z (6.60) dostáváme

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{j=1}^n f(\theta_j) [g(t_j) - g(s_j)] - \int_{s_j}^{t_j} f \, dg \right| \\ & \leq \left| S(\rho, \eta) - \int_a^b f \, dg \right| + \left| \sum_{j=0}^n \left(S(\sigma^j, \xi^j) - \int_{t_j}^{s_{j+1}} f \, dg \right) \right| < \varepsilon + \eta. \end{aligned}$$

Protože $\eta > 0$ bylo libovolné, platí (6.59). □

6.40 Věta. *Nechť $\int_a^b f \, dg$ existuje a $c \in [a, b]$. Potom platí*

$$\lim_{\substack{x \rightarrow c \\ x \in [a, b]}} \left(\int_a^x f \, dg + f(c) [g(c) - g(x)] \right) = \int_a^c f \, dg. \quad (6.61)$$

D ů k a z . Buď dáno $\varepsilon > 0$ a nechť $\delta_\varepsilon \in \mathcal{G}[a, b]$ je takový kalibr, že

$$\left| S(\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\xi}) - \int_a^b f \, dg \right| < \varepsilon \quad \text{platí pro všechna } (\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\xi}) \in \mathcal{A}(\delta_\varepsilon).$$

Pro každé $x \in (c, c + \delta_\varepsilon(c)) \cap [a, b]$ vyhovuje systém $\{([s_1, t_1], \theta_1)\}$, kde $t_1 = x$ a $s_1 = \theta_1 = c$, podmínkám (6.58). Podle Saksova-Henstockova lemmatu (viz Lemma 6.39) tedy máme

$$\left| f(c) [g(x) - g(c)] - \int_c^x f \, dg \right| \leq \varepsilon. \quad (6.62)$$

Podobně, je-li $x \in (c - \delta_\varepsilon(c), c) \cap [a, b]$, pak použitím lemmatu 6.39 na systém $\{[x, c], c\}$ dostaneme nerovnost

$$\left| f(c) [g(c) - g(x)] - \int_x^c f \, dg \right| \leq \varepsilon.$$

Pro každé $x \in (c - \delta_\varepsilon(c), c + \delta_\varepsilon(c)) \cap [a, b]$ tedy platí nerovnost (6.62), a tudíž

$$\begin{aligned} \left| \int_a^c f \, dg - \int_a^x f \, dg - f(c) [g(c) - g(x)] \right| \\ = \left| \int_c^x f \, dg - f(c) [g(x) - g(c)] \right| \leq \varepsilon, \end{aligned}$$

tj. platí (6.61). □

6.41 Důsledek. *Nechť $\int_a^b f \, dg$ existuje, $g \in \mathbb{G}[a, b]$ a nechť funkce $h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ je definována předpisem $h(x) = \int_a^x f \, dg$ pro $x \in [a, b]$. Potom $h \in \mathbb{G}[a, b]$ a*

$$h(t+) = h(t) + f(t) \Delta^+ g(t) \quad \text{a} \quad h(s-) = h(s) - f(s) \Delta^- g(s)$$

pro $t \in [a, b)$ a $s \in (a, b]$. □

6.5 Neurčitý integrál

6.42 Věta (HAKE). (i) *Nechť $\int_a^x f \, dg$ existuje pro každé $x \in [a, b)$ a nechť*

$$\lim_{x \rightarrow b^-} \left(\int_a^x f \, dg + f(b) [g(b) - g(x)] \right) = I \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Potom } \int_a^b f \, dg = I.$$

(ii) *Nechť $\int_x^b f \, dg$ existuje pro každé $x \in (a, b]$ a nechť*

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \left(\int_x^b f \, dg + f(a) [g(x) - g(a)] \right) = I \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Potom } \int_a^b f \, dg = I.$$

D ů k a z . (i) a) Buď dáno $\varepsilon > 0$. Zvolme $\Delta > 0$ tak, aby platilo

$$\left| \int_a^x f \, dg + f(b) [g(b) - g(x)] - I \right| < \varepsilon \quad \text{pro každé } x \in [b - \Delta, b). \quad (6.63)$$

Položme $x_k = b - \frac{b-a}{k+1}$ pro $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Potom posloupnost $\{x_k\}$ je rostoucí,
 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = b$ a

$$\left. \begin{aligned} &\forall k \in \mathbb{N} \exists \delta_k \in \mathcal{G}[a, x_k]: \\ &(\rho, \eta) \in \mathcal{A}(\delta_k; [a, x_k]) \implies \left| S(\rho, \eta) - \int_a^{x_k} f \, dg \right| < \frac{\varepsilon}{2^k}. \end{aligned} \right\} \quad (6.64)$$

b) Definujme kalibr δ_0 na $[a, b)$ tak, aby platilo

$$\delta_0(s) \leq \delta_k(s) \quad \text{a} \quad [s - \delta_0(s), s + \delta_0(s)] \subset [a, x_k]$$

pro každé $k \in \mathbb{N}$ a každé $s \in [x_{k-1}, x_k)$.

Dále pro každé $s \in [a, b)$ označme symbolem $\kappa(s)$ jednoznačně určené přiřazené číslo k takové, že $s \in [x_{k-1}, x_k)$.

c) Dokážeme, že platí

$$\left. \begin{aligned} &\left| S(\tau, \theta) - \int_a^x f \, dg \right| < \varepsilon \\ &\text{pro všechna } x \in [a, b) \text{ a } (\tau, \theta) \in \mathcal{A}(\delta_0; [a, x]). \end{aligned} \right\} \quad (6.65)$$

Nechť je tedy dáno $x \in [a, b)$ a nechť $p \in \mathbb{N}$ je takové, že $x \in [x_{p-1}, x_p)$ (tj. $p = \kappa(x)$). Dále nechť (τ, θ) je libovolné δ_0 -jemné značené dělení intervalu

$[a, x]$. Označme $\nu(\tau) = r$. Pro každé $k \in \mathbb{N} \cap [1, p]$ a každé $j \in \mathbb{N} \cap [1, r]$ takové, že $\kappa(\theta_j) = k$, máme

$$\theta_j - \delta_k(\theta_j) \leq \theta_j - \delta_0(\theta_j) \leq \tau_{j-1} < \tau_j \leq \theta_j + \delta_0(\theta_j) \leq \theta_j + \delta_k(\theta_j).$$

Vzhledem k (6.64) vidíme, že pro každé $k \in \{1, 2, \dots, p\}$ systém

$$\{([\tau_{j-1}, \tau_j], \theta_j) : j = 1, 2, \dots, r, \kappa(\theta_j) = k\}$$

spĺňuje předpoklady lemmatu 6.39 na místě $\{([s_j, t_j], \theta_j) : j = 1, 2, \dots, n\}$. Platí tedy

$$\left| \sum_{\kappa(\theta_j)=k}^r f(\theta_j) [g(\tau_j) - g(\tau_{j-1})] - \int_{\tau_{j-1}}^{\tau_j} f \, dg \right| \leq \frac{\varepsilon}{2^k} \text{ pro každé } k \in \{1, 2, \dots, p\}.$$

Konečně,

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{j=1}^r f(\theta_j) [g(\tau_j) - g(\tau_{j-1})] - \int_a^x f \, dg \right| \\ &= \left| \sum_{k=1}^p \sum_{\kappa(\theta_j)=k} \left(f(\theta_j) [g(\tau_j) - g(\tau_{j-1})] - \int_{\tau_{j-1}}^{\tau_j} f \, dg \right) \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^p \left| \sum_{\kappa(\theta_j)=k} \left(f(\theta_j) [g(\tau_j) - g(\tau_{j-1})] - \int_{\tau_{j-1}}^{\tau_j} f \, dg \right) \right| < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon, \end{aligned}$$

tj. platí (6.65).

d) Položme $\delta^*(x) = \min\{b - x, \delta_0(x)\}$ pro $x \in [a, b)$, $\delta^*(x) = \Delta$ pro $x = b$. Nechť (σ, ξ) je libovolné δ^* -jemné značené dělení intervalu $[a, b]$ a $m = \nu(\sigma)$. Potom musí platit $\xi_m = \sigma_m = b$, $\sigma_{m-1} \in (b - \Delta, b)$ a

$$\begin{aligned} |S(\sigma, \xi) - I| &= \left| \sum_{j=1}^{m-1} f(\xi_j) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})] + f(b) [g(b) - g(\sigma_{m-1})] - I \right| \\ &\leq \left| \sum_{j=1}^{m-1} f(\xi_j) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})] - \int_a^{\sigma_{m-1}} f \, dg \right| \\ &\quad + \left| \int_a^{\sigma_{m-1}} f \, dg + f(b) [g(b) - g(\sigma_{m-1})] - I \right|. \end{aligned}$$

Vzhledem k (6.65) a (6.63) (kde položíme $x = \sigma_{m-1}$) tedy dostáváme konečně

$$|S(\sigma, \xi) - I| < 2\varepsilon, \quad \text{tj. } \int_a^b f \, dg = I.$$

Důkaz tvrzení (ii) se provede analogicky a ponecháváme ho čtenáři jako cvičení. \square

6.43 Cvičení. Dokažte tvrzení (ii) věty 6.42 a jeho následující variantu:

Předpokládejme, že integrál $\int_a^b f \, dg$ existuje. Nechť je dáno $x \in [a, b)$ a nechť

$$\lim_{t \rightarrow x^+} \left(\int_a^t f \, dg - f(x) [g(t) - g(x)] \right) = I \in \mathbb{R}. \text{ Potom } \int_a^x f \, dg = I.$$

6.44 Příklady. Pomocí Hakeovy věty můžeme snadno a univerzálním způsobem odvodit vzorce, které jsme v příkladech 6.15 odvodili přímo z definice pomocí vhodné volby kalibru. Např. formuli $\int_a^b f \, d\chi_{[\tau, b]} = f(\tau)$, kde $\tau \in (a, b]$ a f je libovolná, odvodíme takto

$$\begin{aligned} \int_a^b f \, d\chi_{[\tau, b]} &= \int_a^\tau f \, d\chi_{[\tau, b]} \\ &= \lim_{t \rightarrow \tau^-} \left(\int_a^t f \, d\chi_{[\tau, b]} + f(\tau) [\chi_{[\tau, b]}(\tau) - \chi_{[\tau, b]}(t)] \right) = f(\tau). \end{aligned}$$

Podobně, pro $\tau \in [a, b)$ a $g \in \mathbb{G}[a, b]$ dostaneme pomocí Hakeovy věty

$$\begin{aligned} \int_a^b \chi_{[a, \tau]} \, dg &= \int_a^\tau 1 \, dg + \int_\tau^b \chi_{[a, \tau]} \, dg \\ &= g(\tau) - g(a) + \lim_{t \rightarrow \tau^+} \left(\int_t^b \chi_{[a, \tau]} \, dg + 1 [g(t) - g(\tau)] \right) \\ &= g(\tau+) - g(a), \end{aligned}$$

tj. platí (6.18).

6.45 Cvičení. Pomocí Hakeovy věty dokažte i zbývající formule z příkladů 6.15.

6.6 Substituce

Dalším důsledkem Saksova-Henstockova lemmatu je následující lemma, které nám pomůže dokázat větu o substituci.

6.46 Lemma. Nechť $\int_a^b f \, dg$ existuje. Potom pro každé $\varepsilon > 0$ existuje kalibr $\delta \in \mathcal{G}[a, b]$ takový, že nerovnost

$$\sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \left| f(\xi_j) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})] - \int_{\sigma_{j-1}}^{\sigma_j} f \, dg \right| < \varepsilon \quad (6.66)$$

platí pro každé $(\sigma, \xi) \in \mathcal{A}(\delta)$.

Důkaz. Buď dáno $\varepsilon > 0$ a nechť $\delta \in \mathcal{G}[a, b]$ je kalibr takový, že

$$\left| S(\boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{\eta}) - \int_a^b f \, dg \right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

platí pro všechna δ -jemná značená dělení $(\boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{\eta})$ intervalu $[a, b]$.

Bud' dáno libovolné $(\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\xi}) \in \mathcal{A}(\delta)$. Označme $m = \nu(\boldsymbol{\sigma})$ a

$$J^+ = \left\{ j \in \{1, 2, \dots, m\} : f(\xi_j) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})] - \int_{\sigma_{j-1}}^{\sigma_j} f \, dg \geq 0 \right\}$$

a

$$J^- = \{1, 2, \dots, m\} \setminus J^+.$$

Systém $\{([\sigma_{j-1}, \sigma_j], \xi_j) : j \in J^+\}$ splňuje předpoklady (6.58) z lemmatu 6.39 na místě $\{([s_j, t_j], \tau_j)\}$. Podle lemmatu 6.39 tedy platí

$$\begin{aligned} & \sum_{j \in J^+} \left| f(\xi_j) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})] - \int_{\sigma_{j-1}}^{\sigma_j} f \, dg \right| \\ &= \left| \sum_{j \in J^+} \left(f(\xi_j) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})] - \int_{\sigma_{j-1}}^{\sigma_j} f \, dg \right) \right| \leq \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

Podobně

$$\begin{aligned} & \sum_{j \in J^-} \left| f(\xi_j) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})] - \int_{\sigma_{j-1}}^{\sigma_j} f \, dg \right| \\ &= \left| \sum_{j \in J^-} \left(f(\xi_j) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})] - \int_{\sigma_{j-1}}^{\sigma_j} f \, dg \right) \right| \leq \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

Odtud už nerovnost (6.66) okamžitě vyplývá. □

6.47 Věta (VĚTA O SUBSTITUCI). *Je-li funkce $h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ohraničená a in-*

tegrál $\int_a^b f \, dg$ existuje, potom jakmile existuje jeden z integrálů

$$\int_a^b h(x) \, d\left[\int_a^x f \, dg\right], \quad \int_a^b h(x) f(x) \, d[g(x)],$$

existuje i druhý a v takovém případě pak platí

$$\int_a^b h(x) \, d\left[\int_a^x f \, dg\right] = \int_a^b h(x) f(x) \, d[g(x)].$$

D ů k a z. Podle věty 6.9 je funkce $w(x) = \int_a^x f \, dg$ definovaná pro každé $x \in [a, b]$.

a) Předpokládejme, že existuje integrál $\int_a^b h f \, dg$. Bud' dáno $\varepsilon > 0$ a nechť δ_ε je kalibr na $[a, b]$ takový, že

$$\sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \left| h(\xi_j) f(\xi_j) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})] - \int_{\sigma_{j-1}}^{\sigma_j} h f \, dg \right| < \varepsilon$$

a

$$\sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \left| f(\xi_j) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})] - \int_{\sigma_{j-1}}^{\sigma_j} f \, dg \right| < \varepsilon$$

platí pro každé δ_ε -jemné značené dělení (σ, ξ) . (Takový kalibr existuje podle lemmatu 6.46.)

Buď dáno $(\sigma, \xi) \in \mathcal{A}(\delta_\varepsilon)$. Označme $m = \nu(\sigma)$. Potom

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{j=1}^m h(\xi_j) [w(\sigma_j) - w(\sigma_{j-1})] - \int_a^b h f \, dg \right| \\ & \leq \sum_{j=1}^m \left| h(\xi_j) \int_{\sigma_{j-1}}^{\sigma_j} f \, dg - h(\xi_j) f(\xi_j) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})] \right| \\ & \quad + \sum_{j=1}^m \left| h(\xi_j) f(\xi_j) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})] - \int_{\sigma_{j-1}}^{\sigma_j} h f \, dg \right| \\ & \leq \|h\| \sum_{j=1}^m \left| \int_{\sigma_{j-1}}^{\sigma_j} f \, dg - f(\xi_j) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})] \right| \\ & \quad + \sum_{j=1}^m \left| h(\xi_j) f(\xi_j) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})] - \int_{\sigma_{j-1}}^{\sigma_j} h f \, dg \right| \\ & \leq (\|h\| + 1) \varepsilon, \end{aligned}$$

tj. existuje integrál $\int_a^b h \, dw$ a platí $\int_a^b h \, dw = \int_a^b h f \, dg$.

b) Obrácená implikace by se dokazovala podobně, opět za vydatné pomoci lemmatu 6.46. \square

Pro KS-integrál ovšem platí také tvrzení analogická větám 5.47 a 5.48, které jsme dokázali pro RS-integrály. Uvedeme alespoň jedno z nich.

6.48 Věta. *Předpokládejme, že funkce $\phi: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ je rostoucí a zobrazuje interval $[\alpha, \beta]$ na interval $[a, b]$ a nechť $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Pak existuje-li jeden z integrálů*

$$\int_a^b f(x) \, d[g(x)], \quad \int_\alpha^\beta f(\phi(x)) \, d[g(\phi(x))],$$

existuje i ten druhý a platí rovnost a

$$\int_\alpha^\beta f(\phi(x)) \, d[g(\phi(x))] = \int_a^b f(x) \, d[g(x)]. \quad (6.67)$$

D ů k a z . Povšimněme si, že protože ϕ je rostoucí a zobrazuje interval $[\alpha, \beta]$ na interval $[a, b]$, musí být ϕ i její inverze ϕ^{-1} spojité.

Pro dané značené dělení $(\rho, \eta) \in \mathcal{T}[\alpha, \beta]$ položeme

$$\sigma_j = \phi(\rho_j) \text{ pro } j = 0, 1, \dots, \nu(\rho) \text{ a } \xi_j = \phi(\eta_j) \text{ pro } j = 1, 2, \dots, \nu(\rho)$$

a $\sigma = \{\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_{\nu(\rho)}\}$, $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu(\rho)})$. Potom $(\sigma, \xi) \in \mathcal{T}[a, b]$. Značíme $(\sigma, \xi) = \phi(\rho, \eta)$ a $(\rho, \eta) = \phi^{-1}(\sigma, \xi)$. Zřejmě $\phi^{-1}(\sigma, \xi) \in \mathcal{T}[a, b]$ pro $(\sigma, \xi) \in \mathcal{T}[a, b]$.

Pro daný kalibr $\tilde{\delta} \in \mathcal{G}[\alpha, \beta]$ definujme kalibr $\delta \in \mathcal{G}[a, b]$ tak, aby platilo

$$\text{a } \left. \begin{array}{l} \phi^{-1}(\tau + \delta(\tau)) < \phi^{-1}(\tau) + \tilde{\delta}(\phi^{-1}(\tau)) \quad \text{jestliže } \tau \in [a, b] \\ \phi^{-1}(\tau - \delta(\tau)) > \phi^{-1}(\tau) - \tilde{\delta}(\phi^{-1}(\tau)) \quad \text{jestliže } \tau \in (a, b]. \end{array} \right\} \quad (6.68)$$

Nyní, jestliže rozšířené dělení $(\sigma, \xi) \in \mathcal{T}[a, b]$ je δ -jemné, pak podle (6.68) máme pro každé $j = 1, 2, \dots, \nu(\sigma)$

$$\text{a } \left. \begin{array}{l} \rho_j = \phi^{-1}(\sigma_j) \leq \phi^{-1}(\xi_j + \delta(\xi_j)) < \phi^{-1}(\xi_j) + \tilde{\delta}(\phi^{-1}(\xi_j)) = \eta_j + \tilde{\delta}(\eta_j) \\ \rho_{j-1} = \phi^{-1}(\sigma_{j-1}) \geq \phi^{-1}(\xi_j - \delta(\xi_j)) > \phi^{-1}(\xi_j) - \tilde{\delta}(\phi^{-1}(\xi_j)) = \eta_j - \tilde{\delta}(\eta_j). \end{array} \right.$$

Čili $\phi^{-1}(\sigma, \xi) \in \mathcal{A}(\tilde{\delta})$ pro každé $(\sigma, \xi) \in \mathcal{A}(\delta)$. Podobně bychom ke každému kalibru $\delta \in \mathcal{G}[a, b]$ našli kalibr $\tilde{\delta} \in \mathcal{G}[\alpha, \beta]$ takový, že $\phi(\rho, \eta) \in \mathcal{A}(\delta)$, jakmile $(\rho, \eta) \in \mathcal{A}(\tilde{\delta})$.

Protože

$$\sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} f(\xi_j) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})] = \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} f(\phi(\eta_j)) [g(\phi(\rho_j)) - g(\phi(\rho_{j-1}))]$$

pro každé $(\sigma, \xi) \in \mathcal{T}[a, b]$ a $(\rho, \eta) = \phi^{-1}(\sigma, \xi)$, plyne odtud už snadno důkaz věty. \square

6.49 Cvičení. (i) Podrobně si promyslete závěr důkazu předešlé věty.

(ii) Formulujte a dokažte analogii věty 6.48 pro případ, že ϕ je klesající.

(iii) Formulujte a dokažte analogii věty 5.48.

6.50 Poznámka. Větu 6.48 je možno zobecnit v různých směrech. Na příklad následující verze věty o substituci se uplatnila při aplikaci teorie hystereze v ekonomii (viz [4]):

Předpokládejme, že funkce $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ je ohraničená na $[a, b]$ a taková, že $f \in \mathbb{G}[a, b]$ pro každé $\alpha \in (a, b)$. Dále nechť funkce $\phi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ je neklesající na $[a, b]$ a $\phi(a) = c$, $\phi(b) = d$. Konečně, nechť funkce $g \in \mathbb{B}\mathbb{V}[c, d]$ je zprava spojitá na $[c, d]$. Pro $s \in [c, d]$ položme $\psi(s) = \inf\{t \in [a, b] : s \leq \phi(t)\}$. Potom pro

každé $\alpha \in [a, b]$ platí

$$\int_{\alpha}^b f(t) \, d[g(\phi(t))] = \int_{\phi(\alpha)}^{\phi(b)} f(\psi(s)) \, d[g(s)].$$

6.7 Bodová konvergence

6.51 Věta (OSGOODOVA VĚTA). *Předpokládejme, že pro funkci $f \in \mathbb{G}[a, b]$ a posloupnost $\{f_n\} \subset \mathbb{G}[a, b]$ platí*

$$\|f_n\| \leq M < \infty \text{ pro } n \in \mathbb{N} \quad (6.69)$$

a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \text{ pro } x \in [a, b]. \quad (6.70)$$

Potom

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n \, dg = \int_a^b f \, dg \text{ pro každou funkci } g \in \mathbb{BV}[a, b]. \quad (6.71)$$

D ů k a z. Integrály $\int_a^b f_n \, dg$, $n \in \mathbb{N}$, a $\int_a^b f \, dg$ existují podle věty 6.21. Nechť $g = g^C + g^B$ je Jordanův rozklad funkce g takový, že $g^C(a) = g(a)$ (viz větu 2.39). Potom podle věty 5.50 a cvičení 5.56 (i) existují integrály

$$(\sigma) \int_a^b f \, dg^C \text{ a } (\sigma) \int_a^b f_n \, dg^C \text{ pro } n \in \mathbb{N}$$

a podle Osgoodovy věty pro RS-integrály (věta 5.61) platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sigma) \int_a^b f_n \, dg^C = (\sigma) \int_a^b f \, dg^C$$

neboli (podle věty 6.13)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n \, dg^C = \int_a^b f \, dg^C. \quad (6.72)$$

Dále podle lemmatu 6.30 máme pro každé $n \in \mathbb{N}$

$$\int_a^b f \, dg^B = \sum_{w \in W} f(w) \Delta g(w) \text{ a } \int_a^b f_n \, dg^B = \sum_{w \in W} f_n(w) \Delta g(w),$$

kde W je množina bodů nespojitosti funkce g v intervalu $[a, b]$. Jestliže je W konečná, pak zřejmě platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{w \in W} f_n(w) \Delta g(w) = \sum_{w \in W} f(w) \Delta g(w),$$

a tudíž

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n \, dg^B = \int_a^b f \, dg^B. \quad (6.73)$$

Nechť $W = \{w_k : k \in \mathbb{N}\}$. Buď dáno $\varepsilon > 0$. Podle důsledku 2.27 je

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\Delta g(w_k)| \leq \text{var}_a^b g < \infty.$$

Existuje tedy $p_\varepsilon \in \mathbb{N}$ takové, že $\sum_{k=p_\varepsilon+1}^{\infty} |\Delta g(w_k)| < \frac{\varepsilon}{4M}$. Vzhledem k (6.69) a (6.70) je také $|f(x)| \leq M$ pro $x \in [a, b]$, a tudíž

$$\left| \sum_{k=p_\varepsilon+1}^{\infty} (f_n(w_k) - f(w_k)) \Delta g(w_k) \right| \leq 2M \sum_{k=p_\varepsilon+1}^{\infty} |\Delta g(w_k)| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (6.74)$$

Dále protože

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{p_\varepsilon} f_n(w_k) \Delta g(w_k) = \sum_{k=1}^{p_\varepsilon} f(w_k) \Delta g(w_k),$$

existuje $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ takové, že

$$\left| \sum_{k=1}^{p_\varepsilon} (f_n(w_k) - f(w_k)) \Delta g(w_k) \right| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{pro } n \geq n_\varepsilon,$$

což dohromady s (6.74) dává

$$\left| \int_a^b (f_n - f) d g^B \right| = \left| \sum_{k=1}^{\infty} (f_n(w_k) - f(w_k)) \Delta g(w_k) \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

pro $n \geq n_\varepsilon$. Rovnost (6.73) tedy platí i tehdy, když množina W není konečná. Toto, společně s (6.72) a větou 6.8, zaručuje platnost rovnosti (6.71) a dokazuje tvrzení věty. \square

6.8 Integrály maticových a vektorových funkcí

Jsou-li maticové funkce $F: [a, b] \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^p)$, $G: [a, b] \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^p, \mathbb{R}^n)$ takové, že všechny integrály

$$\int_a^b f_{i,k} d g_{k,j} \quad (i = 1, 2, \dots, m, k = 1, 2, \dots, p, j = 1, 2, \dots, n)$$

existují, pak symbol $\int_a^b F(t) d G(t)$ (resp. krátce $\int_a^b F d G$) značí $m \times n$ -matici $M \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$ s prvky

$$m_{i,j} = \sum_{k=1}^p \int_a^b f_{i,k} d g_{k,j}, \quad i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n.$$

Analogicky definujeme také integrály $\int_a^b d[F] G$, resp. $\int_a^b F d[G] H$, kde F , G a H jsou maticové funkce vhodných rozměrů.

Připomeňme, že podle označení (xiv) normu matice $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$ značíme $|A|$ a definujeme ji předpisem $|A| = \max_{j=1, \dots, m} \sum_{i=1}^n |a_{i,j}|$. V této souvislosti považujeme prvky prostoru \mathbb{R}^n za matice typu $n \times 1$ (neboli sloupcové vektory). Jinými slovy, ztotožňujeme prostory \mathbb{R}^n a $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$. To znamená, že klademe $|x| = \sum_{i=1}^n |x_i|$. Potom platí $|Ax| \leq |A| |x|$ pro $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$ a $x \in \mathbb{R}^n$. Je také známo, že platí $|A| = \sup \{ |Ax| : x \in \mathbb{R}^n \text{ a } |x| \leq 1 \}$.

Variace maticové funkce $F : [a, b] \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$ je definovaná formálně stejným předpisem jako variace skalárních funkcí, tj.

$$\text{var}_a^b F = \sup_{\sigma \in \mathcal{D}[a,b]} \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} |F(\sigma_j) - F(\sigma_{j-1})|.$$

Snadno se ověří, že platí

$$\max_{\substack{i=1,2,\dots,m \\ j=1,2,\dots,n}} (\text{var}_a^b f_{i,j}) \leq \text{var}_a^b F \leq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \text{var}_a^b f_{i,j}.$$

To znamená, že maticová funkce $F : [a, b] \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$ má konečnou variaci právě tehdy, když má konečnou variaci každá její složka. Podobně, F je spojitá, resp. regulovaná právě tehdy, když stejnou vlastnost má každá její složka.

Rozšíření výsledků uvedených v této a předešlé kapitole na případ funkcí maticových, resp. vektorových je tedy snadné. Je ovšem nutno si uvědomit, že operace násobení matic není obecně komutativní, a tak musíme mít stále na paměti, že nesmíme libovolně měnit pořadí maticových funkcí, v jakém se v součinech obsažených v aproximujících součtech $S(\sigma, \xi)$ objevují. Na příklad větu o integraci per-partes (věta 6.36) je třeba formulovat takto:

Jestliže $F : [a, b] \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^p)$ je regulovaná na $[a, b]$ a $G : [a, b] \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^p, \mathbb{R}^n)$ má konečnou variaci na $[a, b]$, pak existují oba integrály $\int_a^b F \, dG$ a $\int_a^b d[F] G$ a platí

$$\int_a^b F \, dG + \int_a^b d[F] G = F(b) G(b) - F(a) G(a) + \sum_{x \in [a,b]} \left(\Delta^- F(x) \Delta^- G(x) - \Delta^+ F(x) \Delta^+ G(x) \right).$$

Podobně třeba věta o substituci (věta 6.47) bude vypadat takto:

Jestliže funkce $H : [a, b] \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^p)$ je ohraničená, $F : [a, b] \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^p, \mathbb{R}^q)$, $G : [a, b] \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^q, \mathbb{R}^n)$ a integrál $\int_a^b F \, dG$ existuje, potom jakmile existuje jeden z integrálů

$$\int_a^b H(x) d\left[\int_a^x F dG\right], \quad \int_a^b (H F) dG,$$

existuje i druhý a v takovém případě pak platí

$$\int_a^b H(x) d\left[\int_a^x F dG\right] = \int_a^b (H F) dG.$$

6.52 Cvičení. S přihlédnutím k rozšíření na integraci vektorových funkcí naznačenému v tomto odstavci definujte exaktně křivkový integrál druhého druhu zmíněný v odstavci 1.2 a formulujte jeho základní vlastnosti, které plynou z vět obsažených v kapitolách 5 a 6.

6.9 Souvislost s dalšími typy integrálů

Vyjasnili jsme již vzájemné vztahy mezi KS-integrálem a RS-integrály (viz poznámku 6.12 a větu 6.13). Podobně jako jsme v příkladu 6.14 (iii) dokázali, že z existence Newtonova integrálu (N) $\int_a^b f(x) dx$ plyne existence KH-integrálu

$\int_a^b f(x) dx$, lze dokázat také, že z existence Perronova integrálu (P) $\int_a^b f(x) dx$

plyne existence KH-integrálu $\int_a^b f(x) dx$. Definici Perronova integrálu najdeme například v monografiích [46] nebo [15], viz [46, definice XII.1.5], resp. [15, definice XII.25]. (Níže uvádíme definici Perronova-Stieltjesova integrálu, která ji také zahrnuje.) Platí dokonce, že KH-integrál je ekvivalentní s Perronovým integrálem (viz [46, věta XII.2.1]). Vzhledem ke známým vlastnostem Perronova integrálu to znamená, že KH-integrál (vzdor jeho jednoduché téměř riemannovské definici) zahrnuje tedy současně integrály Riemannův, Newtonův, ale i Lebesgueův. Tím se rozumí, že je-li na nějakém intervalu daná funkce integrovatelná ve smyslu Lebesgueově, pak má na tomto intervalu i KH-integrál a oba integrály mají stejnou hodnotu. Dále existuje-li KH-integrál funkce f , pak f je lebesgueovsky integrovatelná právě tehdy, když také její absolutní hodnota $|f|$ je KH-integrovatelná, viz například kapitoly XII a XIV v monografii [46].

PERRONŮV-STIELTJESŮV INTEGRÁL (PS-integrál)

Definice náleží A. J. Wardovi, viz [62]. Popsána byla též v Saksově monografii [42, VI.8]. Uvedeme zde ekvivalentní (viz [48, Theorem 2.1]) definici.

Řekneme, že funkce $M : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ je *majoranta* pro f vzhledem ke g , jestliže existuje kalibr $\delta \in \mathcal{G}[a, b]$ takový, že

$$(t - \tau) [M(t) - M(\tau)] \geq (t - \tau) f(\tau) (g(t) - g(\tau))$$

pro $\tau \in [a, b]$ a $t \in [a, b] \cap (\tau - \delta(\tau), \tau + \delta(\tau))$. Podobně, funkce $m : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ je *minoranta* pro f vzhledem ke g , jestliže existuje kalibr $\delta \in \mathcal{G}[a, b]$ takový, že

$$(t - \tau) [m(t) - m(\tau)] \leq (t - \tau) f(\tau) (g(t) - g(\tau))$$

pro $\tau \in [a, b]$ a $t \in [a, b] \cap (\tau - \delta(\tau), \tau + \delta(\tau))$. Symbol $\mathfrak{M}(f \Delta g)$ značí množinu majorant pro f vzhledem ke g , $\mathfrak{m}(f \Delta g)$ je množina minorant pro f vzhledem ke g . Předpokládejme, že $\mathfrak{M}(f \Delta g)$ i $\mathfrak{m}(f \Delta g)$ jsou neprázdné a poloźme

$$(PS) \int_a^b f dg = \inf \{M(b) - M(a) : M \in \mathfrak{M}[a, b]\}$$

a

$$(PS) \int_a^b f dg = \sup \{m(b) - m(a) : m \in \mathfrak{m}[a, b]\}.$$

((PS) $\int_a^b f dg$ je *horní Perronův-Stieltjesův* integrál f a (PS) $\int_a^b f dg$ je *dolní Perronův-Stieltjesův* integrál.) Pomocí Cousinova lemmatu (lemma 6.3) lze dokázat

(viz [28, Lemma 1.1.2]), že platí $(PS) \int_a^b f dg \leq (PS) \int_a^b f dg$. Jestliže

$$(PS) \int_a^b f dg = (PS) \int_a^b f dg = I \in \mathbb{R}, \text{ pak } (PS) \int_a^b f dg = I$$

je *Perronův-Stieltjesův integrál* funkce f vzhledem k funkci g přes interval $[a, b]$.

Poznamenejme, že podle [28, Lemma 1.2.1] integrál $(PS) \int_a^b f dg$ existuje tehdy a jen tehdy, když existuje KS-integrál $\int_a^b f dg$. Jestliže tyto integrály existují, pak mají stejnou hodnotu. (PS-integrál je ekvivalentní s KS-integrálem.)

LEBESGUEŮV-STIELTJESŮV INTEGRÁL (LS-integrál)

byl popsán v řadě monografií a učebnic, viz např. T. H. Hildebrandt [11, kapitola VI], V. Jarník [15, kapitoly II a X], A. N. Kolmogorov a S. V. Fomin [16, VI.6.3], J. Lukeš [31, kapitola 12], S. Saks [42, kapitola III]. Existuje několik cest k jeho definici. Vesměš se ale jedná o poměrně komplikovaný proces. Nejčastěji je integrál (LS) $\int_M f dg$ přes množinu $M \subset [a, b]$ definován zprvu pro f nezáporné, ohraničené a borelovsky měřitelné a g neklesající a zprava spojitě jako Lebesgueův integrál vzhledem k Lebesgueově-Stieltjesově míře μ_g , tj. σ -aditivní míře vzniklé rozšířením míry intervalu $G((c, d]) = g(d) - g(c)$ pro $[c, d] \subset [a, b]$ podobným způsobem, jako se buduje Lebesgueova míra rozšířením obvyklé míry intervalu $\ell([c, d]) = d - c$. Definice se pak pomocí rozkladu funkcí s konečnou variací na rozdíl dvou neklesajících funkcí a rozkladu $f = f^+ - f^-$ rozšíří na případ, kdy f je ohraničená a borelovsky měřitelná a $g \in \mathbb{B}\mathbb{V}[a, b]$. Alternativní možností je definovat LS-integrál jako rozšíření RS-integrálu Daniellovou metodou.

Na rozdíl od KS-integrálu, LS-integrál má poněkud užší třídu integrovatelných funkcí. Nezahrnuje například integraci vzhledem k regulovaným funkcím. Na druhou stranu, neomezuje se na integraci přes interval. Má smysl uvažovat o LS-integraci přes libovolnou LS-měřitelnou množinu.

Vztah mezi LS-integrálem a PS-integrálem (a tedy i KS-integrálem) je dobře charakterizován následujícím tvrzením obsaženým v Saksově monografii (viz [42, Theorem VI (8.1)]).

Nechť $g \in \mathbb{BV}[a, b]$, $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ a nechť existuje integrál (LS) $\int_{(a,b)} f dg$. Potom existuje také PS-integrál $\int_a^b f dg$ a platí

$$\int_a^b f dg = (\text{LS}) \int_{(a,b)} f dg + f(a) \Delta^+ g(a) + f(b) \Delta^- g(b).$$

Odtud podle věty o substituci (věta 6.47) plyne i následující zajímavé tvrzení.

Je-li f ohraničená na $[a, b]$, $h: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ lebesgueovskyy integrovatelná na $[a, b]$ a $g(t) = g(a) + \int_a^t h(x) dx$ pro $t \in [a, b]$, pak $\int_a^b f dg = \int_a^b f(t) h(t) dt$, kde integrál na pravé straně je Lebesgueův.

YOUNGŮV INTEGRÁL A KREJČÍHO KN-INTEGRÁL

Nechť $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ a $g \in \mathbb{G}[a, b]$. Označme $\mathcal{T}_Y[a, b]$ množinu všech značených dělení (σ, ξ) intervalu $[a, b]$ takových, že platí $\sigma_{j-1} < \xi_j < \sigma_j$ pro každé $j \in \{1, 2, \dots, \nu(\sigma)\}$, a definujme

$$S_Y(\sigma, \xi) = f(a) \Delta^+ g(a) + \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)-1} f(\sigma_j) \Delta g(\sigma_j) + \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} f(\xi_j) [g(\sigma_j-) - g(\sigma_{j-1}+)] + f(b) \Delta^- g(b).$$

pro $(\sigma, \xi) \in \mathcal{T}[a, b]$. Dosadíme-li nyní $S_Y(\sigma, \xi)$ místo $S(\sigma, \xi)$ a $\mathcal{T}_Y[a, b]$ místo $\mathcal{T}[a, b]$ do definice 5.3, dostaneme Youngovy ((δ) nebo (σ)) integrály.

O Youngově integrálu a zejména o jeho (σ)-verzi $(\sigma Y) \int_a^b f dg$ je podrobně pojednáno v odstavci II.19 monografie T. H. Hildebrandta [11]. Youngovy integrály jsou zřejmě obecnější než odpovídající RS-integrály. Jestliže funkce f je regulovaná na $[a, b]$ a g má na $[a, b]$ konečnou variaci, pak integrál $(\sigma Y) \int_a^b f dg$ existuje a má stejnou hodnotu jako KS-integrál $\int_a^b f dg$. Na druhou stranu, jestliže g je regulovaná na $[a, b]$ a $g(a) = g(t-) = g(s+) = g(b)$ pro $t \in (a, b)$ a $s \in [a, b)$, pak je $S_Y(\sigma, \xi) = 0$ pro každou funkci $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ a každé dělení $(\sigma, \xi) \in \mathcal{T}_Y[a, b]$,

tj. $(\sigma Y) \int_a^b f dg = 0$. Takové tvrzení ovšem neplatí obecně pro KS-integrál, jak je ukázáno v [48, Example 1.1]. P. Krejčí proto nedávno (viz [18]) upravil definici KS-integrálu tak, že jeho modifikovaný KS-integrál, který nazývá KN-integrál, už v sobě plně zahrnuje i integrál (σ) -Youngův. Jeho definice spočívá v šikovném zúžení množiny přípustných značených dělení a můžeme ji zformulovat takto:

Nechť $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ a $I \in \mathbb{R}$. Řekneme, že (KN) $\int_a^b f dg = I$, jestliže pro každé $\varepsilon > 0$ existují kalibr δ a spočetná podmnožina A intervalu $[a, b]$ taková, že $|S_{f\Delta}g(\sigma, \xi) - I| < \varepsilon$ platí pro každé δ -jemné značené dělení (σ, ξ) takové, že žádná z jeho značek ξ_j neleží v množině A .

DUSHNIKŮV (VNITŘNÍ) INTEGRÁL

Dosadíme-li do definice 5.3 místo množiny $\mathcal{T}[a, b]$ značených dělení množinu $\mathcal{T}_Y[a, b]$ uvedenou v předchozím odstavci, dostaneme *Dushnikovy* neboli také *vnitřní* ((δ) nebo (σ)) integrály. Je zřejmé, že jestliže existuje integrál $(\sigma) \int_a^b f dg$,

pak existuje i Dushnikův (σ) -integrál $(\sigma D) \int_a^b f dg$ a mají stejnou hodnotu. Z hlediska praktického uplatnění je Dushnikův integrál podobně obecný jako KS-integrál. Obecně se však jeho hodnoty liší od odpovídajících hodnot KS-integrálu. To lze nahlédnout z následujícího vztahu (viz [13, Theorem 4.7])

$$(\sigma Y) \int_a^b f dg + (\sigma D) \int_a^b g df = f(b)g(a) - f(a)g(b),$$

který platí, jestliže jsou obě funkce f a g regulované na $[a, b]$ a alespoň jedna z nich má na $[a, b]$ konečnou variaci. Dushnikův integrál je podrobně popsán v monografii [12] Ch.S. Höniga, který rozšířil jeho definici i na funkce s hodnotami v Banachových prostorech a vyšetřil jeho vlastnosti natolik, že mohl na jejich základě vybudovat teorii Volterrových-Stieltjesových integrálních rovnic v Banachových prostorech.

INTEGRACE V ABSTRAKTNÍCH PROSTORECH

Rozšíření integrace na vektorové a maticové funkce jsme ukázali v odstavci 6.8. Analogicky lze postupovat i v případě abstraktních funkcí, tj. funkcí s hodnotami v Banachových prostorech. Je-li \mathbb{X} Banachův prostor a $\mathcal{L}(\mathbb{X})$ odpovídající Banachův prostor spojitých lineárních operátorů na \mathbb{X} a

$$F: [a, b] \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{X}), G: [a, b] \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{X}), g: [a, b] \rightarrow \mathbb{X},$$

pak můžeme definovat KS-integrály

$$\int_a^b dF g, \int_a^b F dg, \int_a^b dF G, \int_a^b F dG.$$

Na příklad $\int_a^b dF g = I \in \mathbb{X}$, jestliže pro každé $\varepsilon > 0$ existuje kalibr $\delta \in \mathcal{G}[a, b]$ takový, že platí

$$\left\| \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} F(\xi_j) [g(\sigma_j) - g(\sigma_{j-1})] - I \right\|_{\mathbb{X}} < \varepsilon$$

pro každé δ -jemné značené dělení (σ, ξ) intervalu $[a, b]$. Pojem variace lze snadno přenést i na abstraktní funkce. Pro funkci $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{X}$ a dělení σ intervalu $[a, b]$ definujeme

$$V(f, \sigma) = \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \|f(\sigma_j) - f(\sigma_{j-1})\|_{\mathbb{X}} \quad \text{a} \quad \text{var}_a^b f = \sup\{V(f, \sigma) : \sigma \in \mathcal{D}[a, b]\}.$$

Je také zřejmé, jak definovat prostor $\mathbb{G}([a, b], \mathbb{X})$ regulovaných funkcí s hodnotami v \mathbb{X} . Potom např. oba integrály

$$\int_a^b dF G \quad \text{a} \quad \int_a^b F dG$$

existují, jestliže $F \in \mathbb{BV}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{X}))$ a $G \in \mathbb{G}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{X}))$ a platí i většina tvrzení známých pro integraci skalárních funkcí (viz [50], [53] a [37]). Jsou však i výjimky: Lemma 6.46 platí pouze, pokud má prostor \mathbb{X} konečnou dimenzi. To znamená mj., že jsou jisté potíže s přenesením např. věty o substituci na abstraktní integrály. V této stručné informaci stojí ještě za zmínku, že pokud nemá prostor \mathbb{X} konečnou dimenzi, má smysl místo variace uvažovat obecně slabší pojem *semivariace*, který se definuje takto:

Pro danou funkci $F: [a, b] \rightarrow L(\mathbb{X})$ a dělení $\sigma \in \mathcal{D}[a, b]$ položme nejprve

$$V_a^b(F, \sigma) = \sup \left\{ \left\| \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} [F(\sigma_j) - F(\sigma_{j-1})] x_j \right\|_{\mathbb{X}} \right\},$$

kde supremum se bere přes všechny možné volby prvků $x_j \in \mathbb{X}$, $j = 1, 2, \dots, \nu(\sigma)$ takových, že $\|x_j\|_X \leq 1$. Potom číslo

$$(\mathcal{B}) \text{ var}_a^b F = \sup\{V_a^b(F, \sigma) : \sigma \in \mathcal{D}[a, b]\}$$

se nazývá *semivariace* funkce F na $[a, b]$ (viz např. [12]). Zpravidla (ne vždy) je možno předpoklady o konečné variaci zeslabit na konečnou semivariaci. Je známo, že má-li \mathbb{X} konečnou dimenzi, pak pojmy variace a semivariace splývají.

Poznamenejme ještě, že integrace funkcí s hodnotami v Hilbertových, resp. reflexivních Banachových prostorech má uplatnění např. v teorii hystereze (viz např. [21] nebo [22]).

Důkazy podstatné části tvrzení uvedených v této kapitole byly převzaty z monografie [59]. Některé jsou pak modifikacemi důkazů analogických tvrzení pro speciální případ $g(x) \equiv x$ ze Schwabikovy monografie [46].

Aplikace Stieltjesova integrálu ve funkcionální analýze

V této kapitole nejprve ukážeme, jak se Stieltjesovy integrály uplatní při reprezentaci spojitých lineárních funkcionálů na některých prostorech funkcí. Nejprve připomeňme několik základních pojmů.

7.1 Několik základních pojmů z funkcionální analýzy

(i) Necht' \mathbb{X} a \mathbb{Y} jsou lineární (vektorové) prostory. Zobrazení

$$\beta : (x, y) \in \mathbb{X} \times \mathbb{Y} \rightarrow \beta(x, y) \in \mathbb{R}$$

se nazývá *bilineární*, jestliže platí

$$\begin{aligned} \beta(x_1 + x_2, y) &= \beta(x_1, y) + \beta(x_2, y) && \text{pro všechna } x_1, x_2 \in \mathbb{X}, y \in \mathbb{Y}, \\ \beta(\lambda x, y) &= \lambda \beta(x, y) && \text{pro všechna } x \in \mathbb{X}, y \in \mathbb{Y}, \lambda \in \mathbb{R}, \\ \beta(x, y_1 + y_2) &= \beta(x, y_1) + \beta(x, y_2) && \text{pro všechna } x \in \mathbb{X}, y_1, y_2 \in \mathbb{Y}, \\ \beta(x, \lambda y) &= \lambda \beta(x, y) && \text{pro všechna } x \in \mathbb{X}, y \in \mathbb{Y}, \lambda \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

(ii) Prostory \mathbb{X} , \mathbb{Y} tvoří *duální pár vzhledem k bilineárnímu zobrazení β* , jestliže platí

$$\begin{aligned} \beta(x, y) = 0 &\text{ pro všechna } x \in \mathbb{X} \implies y = 0, \\ \beta(x, y) = 0 &\text{ pro všechna } y \in \mathbb{Y} \implies x = 0. \end{aligned}$$

(iii) Lineárním zobrazením lineárního prostoru \mathbb{X} do \mathbb{R} říkáme *lineární funkcionály* na \mathbb{X} . Pro libovolné lineární funkcionály Φ , Ψ na \mathbb{X} , $\lambda \in \mathbb{R}$ a $x \in \mathbb{X}$ definujeme

$$(\Phi + \Psi)(x) = \Phi(x) + \Psi(x) \quad \text{a} \quad (\lambda \Phi)(x) = \lambda \Phi(x).$$

Množina lineárních funkcionálů na prostoru \mathbb{X} je zřejmě vzhledem k takto zavedeným operacím také lineární prostor. (Nulovým prvkem množiny lineárních funkcionálů na prostoru \mathbb{X} je přirozeně funkcionál $0 : x \in \mathbb{X} \rightarrow 0 \in \mathbb{R}$.)

(iv) Je-li \mathbb{X} Banachův prostor s normou $x \in \mathbb{X} \rightarrow \|x\|_{\mathbb{X}}$, pak lineární funkcionál Φ na \mathbb{X} je spojitý (vzhledem k topologii indukované normou $\|\cdot\|_{\mathbb{X}}$) právě tehdy, když je ohraničený, tj. existuje číslo $K \in [0, \infty)$ takové, že $|\Phi(x)| \leq K \|x\|_{\mathbb{X}}$ platí pro každé $x \in \mathbb{X}$ (viz [16, IV.1.2]). Prostor spojitých lineárních funkcionálů na

Banachově prostoru \mathbb{X} značíme \mathbb{X}^* a nazýváme *duální* (nebo též *adjungovaný prostor*) k \mathbb{X} . Předpisem $\Phi \in \mathbb{X}^* \rightarrow \|\Phi\|_{\mathbb{X}^*} = \sup \{|\Phi(x)| : x \in \mathbb{X}, \|x\|_{\mathbb{X}} \leq 1\}$ je přirozeně definována norma na \mathbb{X}^* a \mathbb{X}^* je vzhledem k této normě také Banachův prostor (viz [16, IV.2.1]). Povšimněme si též, že zobrazení

$$x \in \mathbb{X}, \Phi \in \mathbb{X}^* \rightarrow \Phi(x) \in \mathbb{R} \quad (7.1)$$

je bilineární.

Významnou roli v teorii spojitých lineárních operátorů hraje věta Hahnova-Banachova, kterou zde (společně s jedním jejím užitečným důsledkem) připomeneme v obecnosti postačující pro naše účely. Důkazy lze najít ve většině učebnic funkcionální analýzy, viz například [16, IV.1.3].

7.1 Věta (HAHN-BANACH). *Nechť \mathbb{X} je Banachův prostor a $\mathbb{Y} \subset \mathbb{X}$ je jeho podprostor. Potom pro každý spojitý lineární funkcionál Φ na \mathbb{Y} existuje spojitý lineární funkcionál $\tilde{\Phi}$ na \mathbb{X} takový, že*

$$\tilde{\Phi}(y) = \Phi(y) \quad \text{pro } y \in \mathbb{Y} \quad \text{a} \quad \|\tilde{\Phi}\|_{\mathbb{X}^*} = \|\Phi\|_{\mathbb{Y}^*}. \quad (7.2)$$

7.2 Věta. *Nechť \mathbb{X} je Banachův prostor a $\mathbb{Y} \subset \mathbb{X}$ je jeho uzavřený podprostor. Potom pro každý prvek $z \in \mathbb{X} \setminus \mathbb{Y}$ existuje spojitý lineární funkcionál Φ na \mathbb{X} takový, že*

$$\|\Phi\|_{\mathbb{X}^*} = 1, \quad \Phi(y) = 0 \quad \text{pro } y \in \mathbb{Y} \quad \text{a} \quad \Phi(z) = \text{dist}(\mathbb{Y}, z),$$

kde $\text{dist}(\mathbb{Y}, z)$ značí vzdálenost prvku z od množiny \mathbb{Y} , tj.

$$\text{dist}(\mathbb{Y}, z) = \inf \{\|y - z\|_{\mathbb{X}} : y \in \mathbb{Y}\}.$$

Pomocí věty 7.2 snadno dokážeme následující tvrzení.

7.3 Důsledek. *Je-li \mathbb{X} Banachův prostor a \mathbb{X}^* jeho duální prostor, pak \mathbb{X}, \mathbb{X}^* je duální pár vzhledem k bilineárnímu zobrazení (7.1).*

D ů k a z. a) Je-li $\Phi(x) = 0$ pro každé $x \in \mathbb{X}$, znamená to, že Φ je nulový funkcionál, tj. $\Phi = 0 \in \mathbb{X}^*$.

b) Podle věty 7.2 pro libovolné $x \neq 0$ existuje funkcionál $\Phi \in \mathbb{X}^*$ takový, že $\|\Phi\|_{\mathbb{X}^*} = 1$ a $\Phi(x) = \|x\|$. (Položíme $\mathbb{Y} = \{0\}$.) Nemůže se tedy stát, že by bylo současně $\Phi(x) = 0$ pro každé $\Phi \in \mathbb{X}^*$ a $x \neq 0$. \square

7.2 Spojité lineární funkcionály na prostoru spojitých funkcí

Mezi významné výsledky funkcionální analýzy patří reprezentace spojitých lineárních funkcionálů na některých často používaných prostorech funkcí. Speciálně v případě prostoru $\mathbb{C}[a, b]$ funkcí spojitých na $[a, b]$ se dobře uplatní klasický (δ)RS-integrál.

7.4 Věta (RIESZ). Φ je spojitý lineární funkcionál na $\mathbb{C}[a, b]$ ($\Phi \in (\mathbb{C}[a, b])^*$) právě tehdy, když existuje funkce $p \in \mathbb{BV}[a, b]$ taková, že $p(a) = 0$ a

$$\Phi(x) = (\delta) \int_a^b x \, d p \quad \text{pro každou funkci } x \in \mathbb{C}[a, b]. \quad (7.3)$$

Potom také platí $\|\Phi\|_{\mathbb{X}^*} = \text{var}_a^b p$.

Důkaz z. a) Nechť $x \in \mathbb{C}[a, b]$ a $p \in \mathbb{BV}[a, b]$. Potom podle věty 5.54 existuje integrál $(\delta) \int_a^b x \, d p$ a podle lemmatu 5.10 platí $\left| (\delta) \int_a^b x \, d p \right| \leq (\text{var}_a^b p) \|x\|$. Zobrazení

$$\Phi_p : x \in \mathbb{C}[a, b] \rightarrow (\delta) \int_a^b x \, d p \in \mathbb{R}$$

je tedy ohraničený (tj. spojitý) lineární funkcionál na $\mathbb{C}[a, b]$, přičemž

$$\|\Phi_p\|_{(\mathbb{C}[a, b])^*} \leq \text{var}_a^b p. \quad (7.4)$$

b) Buď dán libovolný spojitý lineární funkcionál Φ na $\mathbb{C}[a, b]$.

Nechť $\mathbb{M}[a, b]$ značí množinu všech funkcí ohraničených na $[a, b]$. $\mathbb{M}[a, b]$ je zřejmě Banachův prostor vzhledem k operacím a normě definovaným stejně jako v $\mathbb{C}[a, b]$. Dále je zřejmé, že $\mathbb{C}[a, b]$ je uzavřený podprostor $\mathbb{M}[a, b]$.

Ve zbývajících částech tohoto důkazu budeme značit $\mathbb{X} = \mathbb{M}[a, b]$ a $\mathbb{Y} = \mathbb{C}[a, b]$.

Podle věty 7.1 můžeme funkcionál Φ rozšířit na celý prostor \mathbb{X} , tj. existuje funkcionál $\tilde{\Phi} \in \mathbb{X}^*$ takový, že platí (7.2). Položme

$$p(a) = 0 \quad \text{a} \quad p(t) = \tilde{\Phi}(\chi_{[a, t]}) \quad \text{pro } t \in (a, b]. \quad (7.5)$$

Dokážeme, že $p \in \mathbb{BV}[a, b]$. Buď dáno dělení $\sigma \in \mathcal{D}[a, b]$. Položme $m = \nu(\sigma)$. Potom

$$V(p, \sigma) = \sum_{j=1}^m |p(\sigma_j) - p(\sigma_{j-1})| = \sum_{j=1}^m \alpha_j [p(\sigma_j) - p(\sigma_{j-1})],$$

kde $\alpha_j = \text{sign}[p(\sigma_j) - p(\sigma_{j-1})]$ pro $j = 1, 2, \dots, m$. Vzhledem k definici (7.5) tedy dostáváme

$$\begin{aligned} V(p, \sigma) &= \alpha_1 \tilde{\Phi}(\chi_{[a, \sigma_1]}) + \sum_{j=2}^m \alpha_j [\tilde{\Phi}(\chi_{[a, \sigma_j]}) - \tilde{\Phi}(\chi_{[a, \sigma_{j-1}]})] \\ &= \alpha_1 \tilde{\Phi}(\chi_{[a, \sigma_1]}) + \sum_{j=2}^m \alpha_j \tilde{\Phi}(\chi_{(\sigma_{j-1}, \sigma_j]}) \\ &= \tilde{\Phi}(\alpha_1 \chi_{[a, \sigma_1]} + \sum_{j=2}^m \alpha_j \chi_{(\sigma_{j-1}, \sigma_j]}) = \tilde{\Phi}(h), \end{aligned}$$

kde $h(t) = \alpha_1 \chi_{[a, \sigma_1]}(t) + \sum_{j=2}^m \alpha_j \chi_{(\sigma_{j-1}, \sigma_j]}(t)$ pro $t \in [a, b]$. Zřejmě $\|h\| = 1$, a

tedy $V(p, \sigma) \leq \|\tilde{\Phi}\|_{\mathbb{X}^*} = \|\Phi\|_{\mathbb{Y}^*}$ pro každé $\sigma \in \mathcal{D}[a, b]$. To ovšem znamená, že

$$\operatorname{var}_a^b p \leq \|\Phi\|_{\mathbb{Y}^*}. \quad (7.6)$$

Zbývá dokázat, že platí (7.3) neboli $\Phi = \Phi_p$. Buď te dány libovolná $x \in \mathbb{X}$ a $\varepsilon > 0$. Protože funkce x je stejnoměrně spojitá na $[a, b]$, existuje $\delta > 0$ takové, že platí

$$\left(t, s \in [a, b] \text{ a } |t - s| < \delta \right) \implies |x(t) - x(s)| < \varepsilon.$$

Nechť $\sigma \in \mathcal{D}[a, b]$ je libovolné dělení takové, že $|\sigma| < \delta$. Položme $m = \nu(\sigma)$.

$$x_{\sigma}(t) = \begin{cases} x(\sigma_1) & \text{když } t = a, \\ x(\sigma_j) & \text{když } t \in (\sigma_{j-1}, \sigma_j] \text{ a } j \in \{2, 3, \dots, m\}. \end{cases}$$

Snadno ověříme, že $|x(t) - x_{\sigma}(t)| < \varepsilon$ pro každé $t \in [a, b]$ neboli $\|x - x_{\sigma}\| \leq \varepsilon$. Dále

$$x_{\sigma}(t) = x(\sigma_1) \chi_{[a]}(t) + \sum_{j=1}^m x(\sigma_j) \chi_{(\sigma_{j-1}, \sigma_j]}(t) \quad \text{pro } t \in [a, b].$$

Odtud, vzhledem k definici (7.5), dostaneme

$$\begin{aligned} \tilde{\Phi}(x_{\sigma}) &= x(\sigma_1) \tilde{\Phi}(\chi_{[a, \sigma_1]}) + \sum_{j=2}^m x(\sigma_j) [\tilde{\Phi}(\chi_{[a, \sigma_j]}) - \tilde{\Phi}(\chi_{[a, \sigma_{j-1}]})] \\ &= x(\sigma_1) [p(\sigma_1) - p(a)] + \sum_{j=2}^m x(\sigma_j) [p(\sigma_j) - p(\sigma_{j-1})] \\ &= \sum_{j=1}^m x(\sigma_j) [p(\sigma_j) - p(\sigma_{j-1})] = S_{x\Delta p}(\sigma, \xi_{\sigma}), \end{aligned}$$

kde $\xi_{\sigma} = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m)$.

Protože existuje integrál $(\delta) \int_a^b x \, dp$, můžeme zvolit $\rho \in \mathcal{D}[a, b]$ a $\eta = \xi_{\rho}$ tak, aby platilo $|\rho| < \delta$ a

$$\left| \tilde{\Phi}(x_{\rho}) - (\delta) \int_a^b x \, dp \right| = \left| S_{x\Delta p}(\rho, \eta) - (\delta) \int_a^b x \, dp \right| < \varepsilon.$$

Protože máme také $\|x - x_{\rho}\| \leq \varepsilon$, dostáváme

$$\begin{aligned} \left| \Phi(x) - (\delta) \int_a^b x \, dp \right| &= \left| \tilde{\Phi}(x) - (\delta) \int_a^b x \, dp \right| \\ &\leq \left| \tilde{\Phi}(x) - \tilde{\Phi}(x_{\rho}) \right| + \left| \tilde{\Phi}(x_{\rho}) - (\delta) \int_a^b x \, dp \right| \\ &< \|\tilde{\Phi}\|_{\mathbb{X}^*} \|x - x_{\rho}\| + \varepsilon \leq (\|\Phi\|_{\mathbb{Y}^*} + 1) \varepsilon. \end{aligned}$$

Vzhledem k tomu, že $\varepsilon > 0$ může být libovolně malé, znamená to, že platí

$$\Phi(x) = \Phi_p(x) = (\delta) \int_a^b x \, d p \quad \text{pro } x \in \mathbb{C}[a, b].$$

Konečně, podle (7.4) a (7.6) je $\|\Phi\|_{(\mathbb{C}[a,b])^*} = \|\Phi\|_{\mathbb{Y}^*} = \text{var}_a^b p$. \square

Jak ukazuje následující věta, není přiřazení $\Phi \in (\mathbb{C}[a, b])^* \rightarrow p \in \mathbb{BV}[a, b]$ určeno vztahem (7.3) jednoznačně.

7.5 Lemma. *Nechť $g \in \mathbb{BV}[a, b]$. Potom platí*

$$(\delta) \int_a^b f \, d g = 0 \quad \text{pro každou funkci } f \in \mathbb{C}[a, b] \quad (7.7)$$

tehdy a jen tehdy, když existuje nejvýše spočetná množina $W \subset (a, b)$ taková, že

$$g(t) = g(a) \quad \text{právě tehdy, když } t \in [a, b] \setminus W. \quad (7.8)$$

D ů k a z. a) Předpokládejme, že platí (7.8). Položme $g^C(t) = g(a)$ pro $t \in [a, b]$ a $g^B = g - g^C$. Potom $g^B(t) \neq 0$ právě tehdy, když $t \in W$. (g^C je spojitá část funkce g a g^B je skoková část g .)

Nechť f je libovolná funkce spojitá na $[a, b]$. Potom zřejmě

$$(\delta) \int_a^b f \, d g^C = 0. \quad (7.9)$$

Ukážeme, že platí také

$$(\delta) \int_a^b f \, d g^B = 0. \quad (7.10)$$

Je-li $W = \emptyset$, pak (7.10) evidentně platí. Nechť W je jednobodová množina, tj. $W = \{w\}$, kde $w \in (a, b)$. Buď dáno $\varepsilon > 0$ a nechť $\delta > 0$ je takové, že

$$(t, s \in [a, b] \text{ a } |t - s| < 2\delta) \implies |f(t) - f(s)| < \varepsilon.$$

Pro libovolné značené dělení $(\sigma, \xi) \in \mathcal{T}[a, b]$ takové, že $|\sigma| < \delta$, pak máme

$$|S_{f\Delta g}(\sigma, \xi)| = \begin{cases} 0 & \text{když } w \notin \sigma, \\ |f(\xi_j) - f(\xi_{j+1})| |g^B(w)| < \varepsilon \|g^B\| & \text{když } w = \sigma_j \text{ pro nějaké } j \in \{0, 1, \dots, \nu(\sigma)\}. \end{cases}$$

Je-li W jednobodová množina, pak (7.10) platí. Snadno si rozmyslíme, že odtud plyne, že (7.10) platí i v případě, že množina W je konečná.

Předpokládejme nyní, že W je spočetná, $W = \{w_k\}$. Podle věty 2.25 je

$$\sum_{k=1}^{\infty} |g^B(w_k)| = \sum_{k=1}^{\infty} (|\Delta^- g^B(w_k)| + |\Delta^+ g^B(w_k)|) < \infty.$$

Mějme dáno $\varepsilon > 0$. Potom existuje $N \in \mathbb{N}$ takové, že

$$\sum_{k=N+1}^{\infty} |g^{\mathbb{B}}(w_k)| < \varepsilon. \quad (7.11)$$

Rozložme funkci $g^{\mathbb{B}}$ na součet $g^{\mathbb{B}} = h + \tilde{h}$, kde

$$h(t) = \begin{cases} g^{\mathbb{B}}(t) & \text{když } t \in \{w_1, w_2, \dots, w_N\}, \\ 0 & \text{když } t \in [a, b] \setminus \{w_1, w_2, \dots, w_N\} \end{cases}$$

a

$$\tilde{h}(t) = \begin{cases} g^{\mathbb{B}}(t) & \text{když } t \in \{w_k : k \geq N+1\}, \\ 0 & \text{když } t \in [a, b] \setminus \{w_k : k \geq N+1\}. \end{cases}$$

Podle předchozí části je

$$(\delta) \int_a^b f \, dh = 0. \quad (7.12)$$

Na druhou stranu, pro každé značené dělení $(\sigma, \xi) \in \mathcal{T}[a, b]$ máme podle (7.11)

$$\begin{aligned} |S_{f\Delta\tilde{h}}(\sigma, \xi)| &= \left| \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} f(\xi_j) [\tilde{h}(\sigma_j) - \tilde{h}(\sigma_{j-1})] \right| \\ &\leq 2 \|f\| \sum_{k=N+1}^{\infty} |g^{\mathbb{B}}(w_k)| < 2 \|f\| \varepsilon. \end{aligned}$$

Odtud, vzhledem k (7.9) a (7.12), plyne, že platí (7.10) a (7.7).

b) Nechť platí (7.7). Položme $f(t) = (\delta) \int_t^b (g(s) - g(a)) \, ds$ pro $t \in [a, b]$. Potom $f \in \mathbb{C}[a, b]$ a podle věty o integraci per-partes (věta 5.50) a věty o substituci (věta 5.45) je

$$\begin{aligned} (\delta) \int_a^b f \, dg &= f(b)g(b) - f(a)g(a) - (\delta) \int_a^b g \, df \\ &= -f(a)g(a) + (\delta) \int_a^b g(t) (g(t) - g(a)) \, dt \\ &= (\delta) \int_a^b (g(t) - g(a))^2 \, dt. \end{aligned}$$

Dosažením $f(t) \equiv 1$ do (7.7) zjistíme, že musí platit $g(a) = g(b)$. Kdyby bylo $g(t_0) \neq g(a)$ v nějakém bodě $t_0 \in (a, b)$ spojitosti funkce g , muselo by existovat $\Delta > 0$ takové, že $(g(t) - g(a))^2 > 0$ pro $t \in (t_0 - \Delta, t_0 + \Delta)$. Potom bychom ovšem měli také

$$(\delta) \int_a^b f \, dg = (\delta) \int_a^b (g(t) - g(a))^2 \, dt \geq (\delta) \int_{t_0 - \Delta}^{t_0 + \Delta} (g(t) - g(a))^2 \, dt > 0,$$

což je ve sporu s předpokladem (7.7). Vzhledem k větě 2.21 tedy platí (7.8). \square

7.6 Poznámka. Jestliže $f \in \mathbb{C}[a, b]$, pak podle lemmatu 7.5 integrál $(\delta) \int_a^b f \, dg$ se nezmění, změníme-li hodnoty $g(t)$ v nejvýše spočetně mnoha bodech $t \in (a, b)$. Speciálně nahradíme-li funkci g funkcí

$$\tilde{g}(t) = \begin{cases} 0 & \text{pro } t = a, \\ g(t+) - g(a) & \text{pro } t \in (a, b), \\ g(b) - g(a) & \text{pro } t = b, \end{cases}$$

bude platit

$$(\delta) \int_a^b f \, dg = (\delta) \int_a^b f \, d\tilde{g} \quad \text{pro každé } f \in \mathbb{C}[a, b].$$

Odtud okamžitě plyne, že pro každý spojitý lineární funkcionál Φ na prostoru $\mathbb{C}[a, b]$ existuje právě jedna funkce $p \in \mathbb{BV}[a, b]$ taková, že

$$\left. \begin{array}{l} \text{a} \\ p(a) = 0, \quad p(t+) = p(t) \quad \text{pro } t \in (a, b) \\ \Phi(x) = (\delta) \int_a^b x \, dp \quad \text{pro každé } x \in \mathbb{C}[a, b]. \end{array} \right\} \quad (7.13)$$

Funkce $p \in \mathbb{BV}[a, b]$, které jsou zprava spojité na (a, b) a takové, že $p(a) = 0$, se nazývají *normalizované funkce s konečnou variací* a tvoří uzavřený podprostor v $\mathbb{BV}[a, b]$, který budeme značit $\mathbb{NBV}[a, b]$. Prostory $(\mathbb{C}[a, b])^*$ a $\mathbb{NBV}[a, b]$ jsou podle věty 7.4 a lemmatu 7.5 izomorfní, tj. zobrazení

$$\Phi \in \mathbb{X}^* \rightarrow p \in \mathbb{NBV}[a, b] \quad (7.14)$$

je vzájemně jednoznačné. To by zřejmě neplatilo, kdybychom $\mathbb{NBV}[a, b]$ nahradili prostorem $\mathbb{BV}[a, b]$ všech funkcí s konečnou variací na $[a, b]$. Na druhou stranu, $\mathbb{NBV}[a, b]$ lze nahradit např. prostorem funkcí s konečnou variací na $[a, b]$, které jsou spojité zleva na (a, b) a rovnají se nule v nějakém pevně daném bodě $c \in [a, b]$.

Z následujícího lemmatu vyplyne, že je-li $\Phi \in (\mathbb{C}[a, b])^*$ a $p \in \mathbb{NBV}[a, b]$ je určeno vztahem (7.14), pak $\|\Phi\|_{(\mathbb{C}[a, b])^*} = \|p\|_{\mathbb{BV}}$, tj. prostory $(\mathbb{C}[a, b])^*$ a $\mathbb{NBV}[a, b]$ jsou izometricky izomorfní.

7.7 Lemma. Jestliže $p \in \mathbb{NBV}[a, b]$ a $\Phi(x) = (\delta) \int_a^b x \, dp$ pro $x \in \mathbb{C}[a, b]$, pak $\|\Phi\|_{(\mathbb{C}[a, b])^*} = \|p\|_{\mathbb{BV}} = \text{var}_a^b p$.

D ů k a z . Podle lemmatu 5.10 platí $\left| (\delta) \int_a^b x \, dp \right| \leq (\text{var}_a^b p) \|x\|$ neboli

$$\|\Phi\|_{(\mathbb{C}[a,b])^*} \leq \|p\|_{\mathbb{BV}}. \quad (7.15)$$

Dokážeme, že existuje funkce $\tilde{x} \in \mathbb{C}[a, b]$ taková, že

$$\|\tilde{x}\| = 1 \quad \text{a} \quad (\delta) \int_a^b \tilde{x} \, dp = \text{var}_a^b p. \quad (7.16)$$

Buď dáno libovolné $\varepsilon > 0$. Zvolme dělení $\sigma \in \mathcal{D}[a, b]$ tak, aby bylo $\nu(\sigma) \geq 2$ a

$$V(p, \tilde{\sigma}) > \text{var}_a^b p - \varepsilon \quad \text{pro každé jeho zjemnění } \tilde{\sigma}. \quad (7.17)$$

Položme $m = \nu(\sigma)$. Vzhledem ke spojitosti funkce p na (a, b) zprava můžeme pro každé $j = 1, 2, \dots, m-1$ najít bod $t_j \in (\sigma_j, \sigma_{j+1})$ takový, že

$$|p(t_j) - p(\sigma_j)| < \frac{\varepsilon}{m-1}. \quad (7.18)$$

Položme

$$\tilde{x}(t) = \begin{cases} \text{sign}(p(\sigma_1) - p(a)) & \text{když } t \in [a, \sigma_1] \\ \text{sign}(p(\sigma_{j+1}) - p(t_j)) & \text{když } t \in [t_j, \sigma_{j+1}], j \in \{1, 2, \dots, m\}, \end{cases}$$

a dodefinujeme funkci \tilde{x} na intervalech $[\sigma_j, t_j]$ lineárně a tak, aby byla spojitá na $[a, b]$. Zřejmě je $\|\tilde{x}\| = 1$. Navíc

$$(\delta) \int_a^b \tilde{x} \, dp = |p(\sigma_1) - p(a)| + \sum_{j=1}^{m-1} |p(\sigma_{j+1}) - p(t_j)| + \sum_{j=1}^{m-1} (\delta) \int_{\sigma_j}^{t_j} \tilde{x} \, dp.$$

Protože je $|\tilde{x}(t)| \leq 1$ pro $t \in [a, b]$, plyne odtud podle (7.18), že

$$\begin{aligned} \left| (\delta) \int_a^b \tilde{x} \, dp \right| &\geq |p(\sigma_1) - p(a)| + \sum_{j=1}^m |p(\sigma_{j+1}) - p(t_j)| - \sum_{j=1}^{m-1} |p(t_j) - p(\sigma_j)| \\ &= V(p, \rho) - 2 \sum_{j=1}^{m-1} |p(t_j) - p(\sigma_j)| > V(p, \rho) - 2\varepsilon, \end{aligned}$$

kde $\rho = \{a, \sigma_1, t_1, \sigma_2, \dots, \sigma_{m-1}, t_{m-1}, b\}$. Podle (7.17) dostáváme

$$\left| (\delta) \int_a^b \tilde{x} \, dp \right| > V(p, \rho) - 2\varepsilon > \text{var}_a^b p - 3\varepsilon.$$

Protože ε může být libovolné kladné číslo, znamená to, že platí (7.16), a tudíž $\sup_{\|x\| \leq 1} |\Phi(x)| \geq \text{var}_a^b p$. Odtud a z (7.15) plyne tvrzení lemmatu. \square

7.8 Věta. Zobrazení $\Phi \in (\mathbb{C}[a, b])^* \rightarrow p \in \mathbb{NBV}[a, b]$, kde p je určeno vztahem (7.13), je izometrický izomorfismus.

7.9 Poznámka. Můžeme tedy ztotožnit $(\mathbb{C}[a, b])^*$ s prostorem $\mathbb{NBV}[a, b]$.

7.10 Cvičení. Dokažte, že platí:

Pro každý spojitý lineární funkcionál Φ na prostoru $\mathbb{C}[a, b]$ existuje právě jedna funkce $p \in \mathbb{BV}[a, b]$ taková, že

$$p(b) = 0, \quad p(t-) = p(t) \quad \text{pro } t \in (a, b)$$

a

$$\Phi(x) = (\delta) \int_a^b x \, dp \quad \text{pro každé } x \in \mathbb{C}[a, b].$$

Ve větě 7.8 lze nahradit prostor $\mathbb{NBV}[a, b]$ prostorem funkcí zleva spojitých na (a, b) a takových, že $p(b) = 0$.

7.3 Spojité lineární funkcionály na prostorech integrovatelných, resp. absolutně spojitých funkcí

Další dobře známé reprezentace spojitých lineárních prostorů využívají Lebesgueova integrálu:

Pro $\alpha \in [1, \infty)$ označme symbolem $\mathbb{L}^\alpha[a, b]$ prostor funkcí x měřitelných na $[a, b]$ a takových, že $\int_a^b |x(t)|^\alpha \, dt < \infty$, přičemž norma na $\mathbb{L}^\alpha[a, b]$ je definována předpisem

$$\|x\|_\alpha = \left(\int_a^b |x(t)|^\alpha \, dt \right)^{1/\alpha} \quad \text{pro } x \in \mathbb{L}^\alpha[a, b]$$

a rovnost $x = y$ pro $x, y \in \mathbb{L}^\alpha[a, b]$ znamená, že $x(t) = y(t)$ pro s.v. $t \in [a, b]$. Jestliže položíme

$$\alpha^* = \begin{cases} \frac{\alpha}{\alpha-1} & \text{jestliže } \alpha > 1, \\ \infty & \text{jestliže } \alpha = 1, \end{cases}$$

pak obecný tvar spojitého lineárního funkcionálu na $\mathbb{L}^\alpha[a, b]$ je dán předpisem

$$\Phi \in (\mathbb{L}^\alpha[a, b])^* \iff \text{existuje } p \in \mathbb{L}^{\alpha^*}[a, b] \text{ takové, že}$$

$$\Phi(x) = \int_a^b p(t) x(t) \, dt \quad \text{pro } x \in \mathbb{L}^\alpha[a, b],$$

kde $\mathbb{L}^\infty[a, b]$ je prostor funkcí esenciálně (v podstatě) omezených na $[a, b]$, tj. reálných funkcí f měřitelných na $[a, b]$ a takových, že platí $\sup \text{ess } |f| < \infty$, kde $\sup \text{ess } |f|$ je infimum množiny všech $A \in (0, \infty)$ takových, že množina

$$\{t \in [a, b] : |f(t)| > A\}$$

má nulovou míru.

Na prostoru $\mathbb{A}\mathbb{C}[a, b]$ funkcí absolutně spojitých na intervalu $[a, b]$ definujeme normu předpisem

$$\|f\|_{\mathbb{A}\mathbb{C}} = |f(a)| + \|f'\|_1 \quad \text{pro } f \in \mathbb{A}\mathbb{C}[a, b]$$

a $\mathbb{A}\mathbb{C}[a, b]$ je pak Banachův prostor. Podle věty 3.17 představují zobrazení

$$f \in \mathbb{A}\mathbb{C}[a, b] \rightarrow (f(a), f') \in \mathbb{R} \times \mathbb{L}^1[a, b]$$

a

$$(c, g) \in \mathbb{R} \times \mathbb{L}^1[a, b] \rightarrow f(x) := c + \int_a^x g(t) dt \in \mathbb{A}\mathbb{C}[a, b]$$

vzájemně jednoznačný vztah mezi $\mathbb{A}\mathbb{C}[a, b]$ a $\mathbb{R} \times \mathbb{L}^1[a, b]$. Lze ukázat, že obecný spojitý lineární funkcionál na prostoru $\mathbb{A}\mathbb{C}[a, b]$ je dán předpisem

$\Phi \in (\mathbb{A}\mathbb{C}[a, b])^* \iff$ existují $q \in \mathbb{R}$ a $p \in \mathbb{L}^\infty[a, b]$ takové, že

$$\Phi(x) = qx(a) + \int_a^b p(t)x'(t) dt \quad \text{pro } x \in \mathbb{A}\mathbb{C}[a, b].$$

Důkazy výše uvedených tvrzení a další podrobnosti lze nalézt ve většině učebnic funkcionální analýzy. Všeobecně dostupná je také on-line verze plzeňských skript [3].

7.4 Spojité lineární funkcionály na prostorech regulovaných funkcí

Naším cílem je nyní odvození obecného tvaru spojitých lineárních funkcionálů na některých podprostorech prostoru $\mathbb{G}[a, b]$. Pro začátek si připomeňme, že podle věty 6.27 je výraz

$$\Phi_\eta(x) = qx(a) + \int_a^b p dx \tag{7.19}$$

definován pro každou funkci $x \in \mathbb{G}[a, b]$ a každý pár $\eta = (p, q) \in \mathbb{B}\mathbb{V}[a, b] \times \mathbb{R}$. Navíc, pro každé $\eta \in \mathbb{B}\mathbb{V}[a, b] \times \mathbb{R}$, předpis (7.19) definuje ohraničený (a tedy spojitý) lineární funkcionál na $\mathbb{G}[a, b]$ (viz větu 6.25).

Snadno ověříme, že předpisem

$$\eta = (p, q) \in \mathbb{B}\mathbb{V}[a, b] \times \mathbb{R} \rightarrow \|\eta\|_{\mathbb{B}\mathbb{V} \times \mathbb{R}} = |q| + \|p\|_{\mathbb{B}\mathbb{V}}$$

je definována norma na prostoru $\mathbb{B}\mathbb{V}[a, b] \times \mathbb{R}$ a $\mathbb{B}\mathbb{V}[a, b] \times \mathbb{R}$ je Banachův prostor vzhledem k této normě. Z formulí uvedených v příkladech 6.15 (viz též příklady 6.44, resp. cvičení 6.45) také snadno odvodíme následující tvrzení.

7.11 Lemma.(i) *Pro libovolnou dvojici $\eta = (p, q) \in \mathbb{BV}[a, b] \times \mathbb{R}$ platí*

$$\left. \begin{aligned} \Phi_\eta(1) &= q, \\ \Phi_\eta(\chi_{(\tau, b]}) &= p(\tau), \quad \text{když } \tau \in [a, b), \\ \Phi_\eta(\chi_{[\tau]}) &= 0, \quad \text{když } \tau \in (a, b), \\ \Phi_\eta(\chi_{[b]}) &= p(b). \end{aligned} \right\} (7.20)$$

(ii) *Pro libovolnou funkci $x \in \mathbb{G}[a, b]$ platí*

$$\left. \begin{aligned} \Phi_\eta(x) &= x(a), \quad \text{když } p \equiv 0 \text{ na } [a, b], q = 1, \\ \Phi_\eta(x) &= x(b), \quad \text{když } p \equiv 1 \text{ na } [a, b], q = 1, \\ \Phi_\eta(x) &= x(\tau-), \quad \text{když } p = \chi_{[a, \tau)} \text{ na } [a, b], \tau \in (a, b), q = 1, \\ \Phi_\eta(x) &= x(\tau+), \quad \text{když } p = \chi_{[a, \tau]} \text{ na } [a, b], \tau \in [a, b), q = 1. \end{aligned} \right\} (7.21)$$

Přímým důsledkem vztahů (7.20), (7.21) a lemmatu 4.18 je následující tvrzení.

7.12 Lemma.(i) *Jestliže $\eta = (p, q) \in \mathbb{BV}[a, b] \times \mathbb{R}$ a*

$$\Phi_\eta(x) = 0 \text{ pro každé } x \in \text{Lin}\left(1, \chi_{(\tau, b]}, \tau \in [a, b), \chi_{[b]}\right),$$

pak $p(t) \equiv 0$ na $[a, b]$ a $q = 0$.

(ii) *Jestliže $x \in \mathbb{G}[a, b]$ a*

$$\Phi_\eta(x) = 0 \text{ pro všechny dvojice } \eta = (p, q) \in \mathbb{BV}[a, b] \times \mathbb{R},$$

pak

$$x(a) = x(a+) = x(\tau-) = x(\tau+) = x(b-) = x(b) \quad (7.22)$$

platí pro $\tau \in (a, b)$.

7.13 Poznámka. Všimněme si, že vzhledem k třetímu vztahu v (7.20) můžeme v tvrzení (i) předešlého lemmatu nahradit množinu $\text{Lin}\left(1, \chi_{(\tau, b]}, \tau \in [a, b), \chi_{[b]}\right)$ množinami

$$\text{Lin}\left(1, \chi_{[\tau, b]}, \tau \in [a, b), \chi_{[b]}\right), \quad \text{resp.} \quad \text{Lin}\left(1, \frac{1}{2} \chi_{[\tau]} + \chi_{(\tau, b]}, \tau \in [a, b), \chi_{[b]}\right).$$

Odtud okamžitě plyne též následující tvrzení, kde symboly $\mathbb{G}_L[a, b]$, $\mathbb{G}_R[a, b]$ a $\mathbb{G}_{\text{reg}}[a, b]$ byly definovány v (4.3).

7.14 Věta. *Každý z následujících párů prostorů*

$$(\mathbb{G}_L[a, b], \mathbb{BV}[a, b] \times \mathbb{R}), (\mathbb{G}_{\text{reg}}[a, b], \mathbb{BV}[a, b] \times \mathbb{R}), (\mathbb{G}_R[a, b], \mathbb{BV}[a, b] \times \mathbb{R})$$

tvoří duální pár vzhledem k bilineární formě

$$x \in \mathbb{G}[a, b], \eta \in \mathbb{BV}[a, b] \times \mathbb{R} \rightarrow \Phi_\eta(x).$$

Na druhou stranu, máme také

7.15 Lemma. *Jestliže Φ je lineární ohraničený funkcionál na $\mathbb{G}_L[a, b]$ a*

$$p(t) = \begin{cases} \Phi(\chi_{(t,b)}), & \text{když } t \in [a, b), \\ \Phi(\chi_{[b]}), & \text{když } t = b, \end{cases} \quad (7.23)$$

pak $p \in \mathbb{BV}[a, b]$ a

$$\left. \begin{aligned} |p(a)| + |p(b)| + \text{var}_a^b p &\leq 2 \|\Phi\|_{(\mathbb{G}_L[a,b])^*}, \\ \text{kde } \|\Phi\|_{(\mathbb{G}_L[a,b])^*} &= \sup\{|\Phi(x)| : x \in \mathbb{G}_L[a, b], \|x\| \leq 1\}. \end{aligned} \right\} \quad (7.24)$$

D ů k a z. Pro libovolné dělení $\sigma = \{\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_m\}$ intervalu $[a, b]$ a libovolný vektor $(c_0, c_1, \dots, c_m, c_{m+1}) \in \mathbb{R}^{m+2}$ platí

$$\begin{aligned} &\left| c_0 p(a) + c_{m+1} p(b) + \sum_{j=1}^m c_j [p(\sigma_j) - p(\sigma_{j-1})] \right| \\ &= \left| \Phi \left(c_0 \chi_{(a,b)} + c_{m+1} \chi_{[b]} - \sum_{j=1}^{m-1} c_j \chi_{(\sigma_{j-1}, \sigma_j]} + c_m \chi_{(\sigma_{m-1}, b)} \right) \right| = |\Phi(h)|, \end{aligned}$$

kde

$$h = c_0 \chi_{(a,b)} + c_{m+1} \chi_{[b]} - \sum_{j=1}^{m-1} c_j \chi_{(\sigma_{j-1}, \sigma_j]} + c_m \chi_{(\sigma_{m-1}, b)}.$$

Snadno ověříme, že bude-li $|c_j| \leq 1$ pro $j = 0, 1, \dots, m+1$, pak bude $\|h\| \leq 2$. Položíme-li tedy

$$c_0 = \text{sign } p(a), \quad c_{m+1} = \text{sign } p(b), \quad c_j = \text{sign}(p(\sigma_j) - p(\sigma_{j-1}))$$

pro $j = 1, 2, \dots, m$, získáme vztah

$$|p(a)| + |p(b)| + V(p, \sigma) \leq 2 \|\Phi\|_{(\mathbb{G}_L[a,b])^*} \quad \text{pro každé } \sigma \in \mathcal{D}[a, b].$$

Odtud už plyne, že platí i (7.24). □

Analogicky předchozímu lemmatu máme také

7.16 Lemma. *Nechť Φ je libovolný lineární ohraničený funkcionál na $\mathbb{G}_{reg}[a, b]$.*

Položme

$$p(t) = \begin{cases} \Phi(\chi_{(a,b)}), & \text{když } t = a, \\ \Phi(\frac{1}{2}\chi_{[t]} + \chi_{(t,b)}), & \text{když } t \in (a, b), \\ \Phi(\chi_{[b]}), & \text{když } t = b. \end{cases} \quad (7.25)$$

Potom $\text{var}_a^b p \leq \sup\{|\Phi(x)| : x \in \mathbb{G}_{reg}[a, b], \|x\| \leq 1\} < \infty$, tj. $p \in \mathbb{BV}[a, b]$.

D ů k a z. Nechť $\Phi \in (\mathbb{G}_{reg}[a, b])^*$, $\sigma = \{\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_m\}$ je dělení intervalu $[a, b]$ a nechť reálná čísla c_j , $j = 1, 2, \dots, m$, jsou taková, že je $|c_j| \leq 1$ pro všechna $j = 1, 2, \dots, m$. Potom

$$\left. \begin{aligned} & \sum_{j=1}^m c_j [p(\sigma_j) - p(\sigma_{j-1})] \\ &= c_1 \left[\Phi\left(\frac{1}{2}\chi_{[\sigma_1]} + \chi_{(\sigma_1, b)}\right) - \Phi(\chi_{(a, b)}) \right] \\ &+ \sum_{j=2}^{m-1} c_j \left[\Phi\left(\frac{1}{2}\chi_{[\sigma_j]} + \chi_{(\sigma_j, b)}\right) - \Phi\left(\frac{1}{2}\chi_{[\sigma_{j-1}]} + \chi_{(\sigma_{j-1}, b)}\right) \right] \\ &+ c_m \left[\Phi(\chi_{[b]}) - \Phi\left(\frac{1}{2}\chi_{[\sigma_{m-1}]} + \chi_{(\sigma_{m-1}, b)}\right) \right] = \Phi(h), \end{aligned} \right\} (7.26)$$

kde

$$\begin{aligned} h &= c_1 \left[\frac{1}{2}\chi_{[\sigma_1]} + \chi_{(\sigma_1, b)} - \chi_{(a, b)} \right] + c_m \left[\chi_{[b]} - \frac{1}{2}\chi_{[\sigma_{m-1}]} - \chi_{(\sigma_{m-1}, b)} \right] \\ &+ \sum_{j=2}^{m-1} c_j \left[\frac{1}{2}\chi_{[\sigma_j]} + \chi_{(\sigma_j, b)} - \frac{1}{2}\chi_{[\sigma_{j-1}]} - \chi_{(\sigma_{j-1}, b)} \right] \\ &= c_1 \left[\frac{1}{2}\chi_{[\sigma_1]} - \chi_{(a, \sigma_1)} \right] - c_m \left[\frac{1}{2}\chi_{[\sigma_{m-1}]} + \chi_{(\sigma_{m-1}, b)} \right] \\ &+ \sum_{j=2}^{m-1} c_j \left[\frac{1}{2}\chi_{[\sigma_j]} - \chi_{(\sigma_{j-1}, \sigma_j)} - \frac{1}{2}\chi_{[\sigma_{j-1}]} \right] \\ &= -c_1 \left[\frac{1}{2}\chi_{[\sigma_1]} + \chi_{(a, \sigma_1)} \right] - c_m \left[\frac{1}{2}\chi_{[\sigma_{m-1}]} + \chi_{(\sigma_{m-1}, b)} \right] \\ &- \frac{1}{2} \sum_{j=2}^{m-1} c_j \chi_{[\sigma_j]} - \frac{1}{2} \sum_{j=2}^{m-1} c_j \chi_{[\sigma_{j-1}]} - \sum_{j=2}^{m-1} c_j \chi_{(\sigma_{j-1}, \sigma_j)} \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{j=1}^{m-1} c_j \chi_{[\sigma_j]} - \frac{1}{2} \sum_{j=2}^m c_j \chi_{[\sigma_{j-1}]} - \sum_{j=1}^m c_j \chi_{(\sigma_{j-1}, \sigma_j)} \\ &= -\sum_{j=1}^{m-1} \frac{c_j + c_{j+1}}{2} \chi_{[\sigma_j]} - \sum_{j=1}^m c_j \chi_{(\sigma_{j-1}, \sigma_j)} \\ &= -\sum_{j=1}^{m-1} \left(\frac{c_j + c_{j+1}}{2} \chi_{[\sigma_j]} + c_j \chi_{(\sigma_{j-1}, \sigma_j)} \right) - c_m \chi_{(\sigma_{m-1}, b)}. \end{aligned}$$

Z tohoto vyjádření snadno nahlédneme, že $h(a+) = -c_1$, $h(b-) = -c_m$,

$$h(\sigma_j-) = -c_j, \quad h(\sigma_j+) = -c_{j+1}, \quad h(\sigma_j) = -\frac{1}{2}(c_j + c_{j+1}) \quad \text{pro } j = 1, 2, \dots, m$$

čili $h \in \mathbb{S}[a, b] \cap \mathbb{G}_{\text{reg}}[a, b]$ a $|h(t)| \leq 1$ pro všechna $t \in [a, b]$.

Vzhledem k (7.26) tedy dostáváme, že nerovnost

$$\begin{aligned} \sup \left\{ \left| \sum_{j=1}^m c_j [p(\sigma_j) - p(\sigma_{j-1})] \right| : |c_j| \leq 1, j = 1, 2, \dots, m-1 \right\} \\ \leq \sup \{ |\Phi(x)| : x \in \mathbb{G}_{\text{reg}}[a, b], \|x\| \leq 1 \} \end{aligned}$$

platí pro každé dělení $\sigma = \{\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_m\}$ intervalu $[a, b]$ a reálná čísla c_j , taková že je $|c_j| \leq 1$ pro všechna $j = 1, 2, \dots, m$. Zvolíme-li nyní

$$c_j = \text{sign} [p(\sigma_j) - p(\sigma_{j-1})] \quad \text{pro } j = 1, 2, \dots, m,$$

zjistíme, že platí

$$V(p, \sigma) \leq \sup \{ |\Phi(x)| : x \in \mathbb{G}_{\text{reg}}[a, b], \|x\| \leq 1 \} < \infty \quad \text{pro každé } \sigma \in \mathcal{D}[a, b],$$

$$\text{tj. } \text{var}_a^b p \leq \|\Phi\|_{\mathbb{G}_{\text{reg}}[a, b]}^* < \infty. \quad \square$$

Prvním hlavním výsledkem této kapitoly je následující věta.

7.17 Věta. Φ je lineární ohraničený funkcionál na $\mathbb{G}_L[a, b]$ ($\Phi \in (\mathbb{G}_L[a, b])^*$) právě tehdy, když existuje dvojice $\eta = (p, q) \in \mathbb{BV}[a, b] \times \mathbb{R}$ taková, že

$$\Phi(x) = q x(a) + \int_a^b p \, dx \quad \text{pro } x \in \mathbb{G}_L[a, b]. \quad (7.27)$$

Navíc, zobrazení

$$\eta \in \mathbb{BV}[a, b] \times \mathbb{R} \rightarrow \Phi_\eta \in (\mathbb{G}_L[a, b])^* \quad (7.28)$$

je izomorfismus.

D ů k a z. Nechť $\Phi \in (\mathbb{G}_L[a, b])^*$ a nechť $\Phi_\eta \in (\mathbb{G}_L[a, b])^*$ je funkcionál definovaný předpisem (7.19), kde $\eta = (p, q)$, $q = \Phi(1)$ a funkce p je definovaná v (7.23). Podle lemmatu 7.15 $\eta = (p, q) \in \mathbb{BV}[a, b] \times \mathbb{R}$ a podle (7.20) a (7.23) máme

$$\begin{aligned} \Phi(1) &= q = \Phi_\eta(1), \\ \Phi(\chi_{(\tau, b)}) &= p(\tau) = \Phi_\eta(\chi_{(\tau, b)}) \quad \text{pro } \tau \in [a, b), \\ \Phi(\chi_{[b]}) &= p(b) = \Phi_\eta(\chi_{[b]}). \end{aligned}$$

Protože podle lemmatu 4.18 je každá funkce z $\mathbb{S}[a, b] \cap \mathbb{G}_L[a, b]$ lineární kombinací funkcí 1 , $\chi_{(\tau, b)}$, $\tau \in [a, b)$, $\chi_{[b]}$, plyne odtud, že $\Phi(x) = \Phi_\eta(x)$ pro každé $x \in \mathbb{G}_L[a, b] \cap \mathbb{S}[a, b]$. Konečně, protože podle lemmatu 4.17 je $\mathbb{G}_L[a, b] \cap \mathbb{S}[a, b]$ hustá množina v $\mathbb{G}_L[a, b]$ a protože funkcionály Φ a Φ_η jsou spojité, plyne odtud, že $\Phi(x) = \Phi_\eta(x)$ pro každé $x \in \mathbb{G}_L[a, b]$.

Podle věty 7.14 je (7.28) vzájemně jednoznačné zobrazení $\mathbb{BV}[a, b] \times \mathbb{R}$ na $(\mathbb{G}_L[a, b])^*$. Dále podle věty 6.25 máme

$$|\Phi_\eta(x)| \leq (|p(a)| + |p(b)| + \text{var}_a^b p + |q|) \|x\| \quad \text{pro každé } x \in \mathbb{G}_L[a, b],$$

a tudíž

$$\|\Phi_\eta\|_{(\mathbb{G}_L[a,b])^*} \leq |p(a)| + |p(b)| + \text{var}_a^b p + |q| \leq 2 (\|p\|_{\mathbb{BV}} + |q|) = 2 \|\eta\|_{\mathbb{BV} \times \mathbb{R}}.$$

Na druhou stranu, podle (7.24) a podle lematu 7.15 je

$$|q| = |\Phi(1)| \leq \|\Phi_\eta\|_{(\mathbb{G}_L[a,b])^*}$$

a

$$\|p\|_{\mathbb{BV}} \leq (|p(a)| + |p(b)| + \text{var}_a^b p) \leq 2 \|\Phi_\eta\|_{(\mathbb{G}_L[a,b])^*}.$$

Souhrnem máme

$$\frac{1}{2} \|\Phi_\eta\|_{(\mathbb{G}_L[a,b])^*} \leq \|\eta\|_{\mathbb{BV} \times \mathbb{R}} \leq 3 \|\Phi_\eta\|_{(\mathbb{G}_L[a,b])^*}$$

čili, zobrazení

$$\eta \in \mathbb{BV}[a, b] \times \mathbb{R} \rightarrow \Phi_\eta \in (\mathbb{G}_L[a, b])^*$$

je izomorfismus. □

7.18 Věta. Φ je lineární ohraničený funkcionál na $\mathbb{G}_{\text{reg}}[a, b]$ ($\Phi \in (\mathbb{G}_{\text{reg}}[a, b])^*$) právě tehdy, když existuje dvojice $\eta = (p, q) \in \mathbb{BV}[a, b] \times \mathbb{R}$ taková, že

$$\Phi(x) = q x(a) + \int_a^b p \, dx \quad \text{pro } x \in \mathbb{G}_{\text{reg}}[a, b]. \quad (7.29)$$

Navíc, zobrazení

$$\eta \in \mathbb{BV}[a, b] \times \mathbb{R} \rightarrow \Phi_\eta \in (\mathbb{G}_{\text{reg}}[a, b])^* \quad (7.30)$$

je izomorfismus.

D ů k a z. Nechť $\Phi \in (\mathbb{G}_{\text{reg}}[a, b])^*$ a $\Phi_\eta \in (\mathbb{G}_{\text{reg}}[a, b])^*$ je definován vztahem (7.19), kde $\eta = (p, q)$, $q = \Phi(1)$ a p je funkce definovaná vztahem (7.25). Podle lematu 7.16 je $\eta = (p, q) \in \mathbb{BV}[a, b] \times \mathbb{R}$ a podle (7.20) a (7.25) máme

$$\begin{aligned} \Phi(1) &= q = \Phi_\eta(1), \\ \Phi(\chi_{(a,b]}) &= p(a) = \Phi_\eta(\chi_{(a,b]}) \\ \Phi(\tfrac{1}{2}\chi_{[\tau]} + \chi_{(\tau,b]}) &= p(\tau) = \Phi_\eta(\tfrac{1}{2}\chi_{[\tau]} + \chi_{(\tau,b]}) \quad \text{pro každé } \tau \in (a, b), \\ \Phi(\chi_{[b]}) &= p(b) = \Phi_\eta(\chi_{[b]}). \end{aligned}$$

Pomocí lematu 4.18 odtud odvodíme, že platí

$$\Phi(x) = \Phi_\eta(x) \quad \text{pro každé } x \in \mathbb{G}_{\text{reg}}[a, b] \cap \mathbb{S}[a, b].$$

Podle lematu 4.17 je ovšem množina $\mathbb{G}_{\text{reg}}[a, b] \cap \mathbb{S}[a, b]$ hustá v $\mathbb{G}_{\text{reg}}[a, b]$, a tudíž dostáváme konečně, že platí $\Phi(x) = \Phi_\eta(x)$ pro všechna $x \in \mathbb{G}_{\text{reg}}[a, b]$.

Podobně jako jsme dokázali analogickou nerovnost v závěru důkazu věty 7.17, dokázali bychom nyní, že platí také

$$\frac{1}{2} \|\Phi_\eta\|_{(\mathbb{G}_{\text{reg}}[a,b])^*} \leq \|\eta\|_{\mathbb{BV} \times \mathbb{R}} \leq 3 \|\Phi_\eta\|_{(\mathbb{G}_{\text{reg}}[a,b])^*}. \quad \square$$

7.19 Cvičení. Postupem použitým v důkazech vět 7.17 a 7.18 ukažte, že také platí:

(i) Φ je lineární ohraničený funkcionál na

$$\tilde{\mathbb{G}}_{\mathbb{L}}[a, b] = \{x \in \mathbb{G}[a, b] : x(t-) = x(t) \text{ pro } t \in (a, b)\},$$

(viz (4.2)) právě tehdy, když existuje funkce $p \in \mathbb{BV}[a, b]$ taková, že

$$\Phi(x) = p(b)x(b) - \int_a^b p \, dx \quad \text{pro } x \in \tilde{\mathbb{G}}_{\mathbb{L}}[a, b].$$

(ii) Φ je lineární ohraničený funkcionál na

$$\tilde{\mathbb{G}}_{\mathbb{R}}[a, b] = \{x \in \mathbb{G}[a, b] : x(t+) = x(t) \text{ pro } t \in [a, b)\},$$

(viz (4.2)) právě tehdy, když existuje funkce $p \in \mathbb{BV}[a, b]$ taková, že

$$\Phi(x) = p(a)x(a) + \int_a^b p \, dx \quad \text{pro } x \in \tilde{\mathbb{G}}_{\mathbb{R}}[a, b].$$

7.5 Aplikace v teorii distribucí

V tomto odstavci naznačíme možnosti použití KS-integrálu v teorii distribucí. Distribuce zde budeme chápat ve smyslu L. Schwartze. Připomeňme si nejprve několik základních pojmů a definic.

7.20 Definice. Množinu funkcí $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, které mají pro každé $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ derivaci $\varphi^{(k)}$ k -tého řádu spojitou na \mathbb{R} a takovou, že $\varphi^{(k)}(t) = 0$ pro všechny $t \in \mathbb{R} \setminus (a, b)$, označíme symbolem $\mathcal{D}[a, b]$. Funkcím z $\mathcal{D}[a, b]$ říkáme *testovací funkce* na $[a, b]$.

Množina $\mathcal{D}[a, b]$ je lineární prostor vzhledem k přirozeným operacím sčítání a násobení skalárem. Množina $\mathcal{D}[a, b]$ se stane topologickým vektorovým prostorem, zavedeme-li na ní topologii, ve které posloupnost $\{\varphi_n\} \subset \mathcal{D}[a, b]$ konverguje k $\varphi \in \mathcal{D}[a, b]$ tehdy a jen tehdy, když

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|\varphi_n^{(k)} - \varphi^{(k)}\| = 0 \quad \text{pro každé } k \in \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

Spojitém lineárním funkcionálem na topologickém vektorovém prostoru \mathbb{X} rozumíme, analogicky jako v případě Banachových prostorů, lineární zobrazení prostoru \mathbb{X} do \mathbb{R} , které je spojitě vzhledem k topologii na \mathbb{X} .

Typickými příklady funkcí z prostoru $\mathcal{D}[a, b]$ jsou funkce tvaru

$$\varphi_{c,d}(t) = \begin{cases} \exp\left(\frac{1}{t-c} + \frac{1}{d-t}\right) & \text{pro } t \in (c, d), \\ 0 & \text{pro } t \in \mathbb{R} \setminus (c, d), \end{cases}$$

kde $[c, d]$ může být libovolný podinterval v $[a, b]$.

7.21 Definice. Spojité lineární funkcionály na topologickém vektorovém prostoru $\mathcal{D}[a, b]$ se nazývají *distribuce* na $[a, b]$. Množina všech distribucí na $[a, b]$ je tedy duálním prostorem k $\mathcal{D}[a, b]$. Značíme ji symbolem $\mathcal{D}^*[a, b]$.

Pro danou distribuci $f \in \mathcal{D}^*[a, b]$ a testovací funkci $\varphi \in \mathcal{D}[a, b]$, hodnotu funkcionálu f na φ značíme symbolem $\langle f, \varphi \rangle$.

7.22 Poznámka. Je-li $f \in \mathbb{L}^1[a, b]$, pak předpisem

$$\langle f, \varphi \rangle = \int_a^b f(t) \varphi(t) dt \quad \text{pro } \varphi \in \mathcal{D}[a, b],$$

(kde je použit Lebesgueův integrál) je definována distribuce na $[a, b]$, kterou budeme značit také symbolem f . Říkáme, že distribuce f je určena funkcí f .

Nulový prvek prostoru $\mathcal{D}^*[a, b]$ je určen libovolnou měřitelnou funkcí, která se anuluje s.v. na intervalu $[a, b]$. Speciálně je-li $f \in \mathbb{G}[a, b]$, pak $f = 0 \in \mathcal{D}^*[a, b]$ tehdy a jen tehdy, když $f(t-) = f(t+) = 0$ pro všechna $t \in (a, b)$ a $s \in [a, b]$. Tudíž, je-li $f \in \mathbb{G}_{\text{reg}}[a, b]$, pak $f = 0 \in \mathcal{D}^*[a, b]$ tehdy a jen tehdy, když $f(t) = 0$ pro všechna $t \in [a, b]$. Pro libovolné distribuce $f, g \in \mathcal{D}^*[a, b]$ rovnost $f = g$ znamená, že $f - g = 0 \in \mathcal{D}^*[a, b]$. Z výše uvedeného plyne, že je-li $g \in \mathbb{L}^1[a, b]$, pak existuje nejvýše jedna funkce $f \in \mathbb{G}_{\text{reg}}[a, b]$ taková, že $f = g$ s.v. na $[a, b]$. Dále pro reálné funkce $f, g \in \mathbb{L}^1[a, b]$ platí rovnost $f = g$ ve smyslu $\mathcal{D}^*[a, b]$ tehdy a jen tehdy, když $f = g$ s.v. na $[a, b]$.

7.23 Definice. Pro danou distribuci $f \in \mathcal{D}^*[a, b]$ definujeme její (*distributivní derivaci*) f' předpisem $\langle f', \varphi \rangle = -\langle f, \varphi' \rangle$ pro $\varphi \in \mathcal{D}[a, b]$.

Podobně, pro každé $k \in \mathbb{N}$, $\langle f^{(k)}, \varphi \rangle = (-1)^k \langle f, \varphi^{(k)} \rangle$ pro $\varphi \in \mathcal{D}[a, b]$.

7.24 Poznámka. Distributivní derivace absolutně spojitých funkcí jsou určeny jejich klasickými derivacemi.

7.25 Poznámka. Definujme $H(t) = \begin{cases} 0 & \text{pro } t < 0, \\ \frac{1}{2} & \text{pro } t = 0, \\ 1 & \text{pro } t > 0. \end{cases}$

Nechť $\tau \in (a, b)$ a $h_\tau(t) = H(t - \tau)$ pro $t \in [a, b]$. Potom použitím vět 6.36 a 6.47 a s přihlédnutím k (6.11) a (6.15) dostaneme

$$\langle h'_\tau, \varphi \rangle = -\langle h_\tau, \varphi' \rangle = -\int_a^b h_\tau d\varphi = \int_a^b \varphi dh_\tau = \varphi(\tau).$$

Funkce h_τ se nazývá *Heavisideova funkce* (se středem v bodě τ) a její distributivní derivace h'_τ se značí δ_τ a nazývá se *Diracova δ -distribuce* (se středem v bodě τ).

7.26 Věta. *Nechť $f \in \mathbb{L}^1[a, b]$. Potom její distributivní derivace f' je nulová distribuce tehdy a jen tehdy, když existuje konstanta $c \in \mathbb{R}$ taková, že $f(t) = c$ pro s.v. $t \in [a, b]$.*

D ů k a z. Jestliže $f(t) = c$ pro s.v. $t \in [a, b]$ a $\varphi \in \mathcal{D}[a, b]$, pak

$$\langle f', \varphi \rangle = -\langle c, \varphi' \rangle = -c \int_a^b \varphi'(s) \, ds = -c(\varphi(b) - \varphi(a)) = 0.$$

Naopak, nechť $\langle f, \varphi' \rangle = 0$ pro každou $\varphi \in \mathcal{D}[a, b]$. Nechť je dána libovolná testovací funkce $\rho \in \mathcal{D}[a, b]$. Položme

$$\varphi(t) = \begin{cases} \int_a^t (\rho(s) - a_0 \Theta(s)) \, ds & \text{pro } t \in [a, b], \\ 0 & \text{pro } t \in \mathbb{R} \setminus [a, b], \end{cases}$$

kde

$$a_0 = \int_a^b \rho(s) \, ds \quad \text{a} \quad \Theta(t) = \frac{\varphi_{a,b}(t)}{\int_a^b \varphi_{a,b}(s) \, ds}.$$

Potom

$$\int_a^b \Theta(s) \, ds = 1.$$

Odtud snadno plyne, že $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$ a také že $\varphi \in \mathcal{D}[a, b]$. Dále

$$\varphi'(t) = \rho(t) - a_0 \Theta(t) \quad \text{pro } t \in [a, b].$$

Tudíž $0 = \langle f, \varphi' \rangle = \langle f, \rho \rangle - \left(\int_a^b \rho(s) \, ds \right) \langle f, \Theta \rangle$. Pro každé $\rho \in \mathcal{D}[a, b]$ tedy platí

$$\langle f, \rho \rangle = \left(\int_a^b \rho(s) \, ds \right) \langle f, \Theta \rangle = \int_a^b c \rho(s) \, ds,$$

kde $c = \langle f, \Theta \rangle \in \mathbb{R}$ je konstanta. Tedy $f = c$ ve smyslu distribucí. \square

7.27 Cvičení. *Nechť $f \in \mathbb{L}^1[a, b]$ a $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Dokažte, že $f^{(k)} = 0 \in \mathcal{D}^*[a, b]$ tehdy a jen tehdy, když existují $c_0, c_1, \dots, c_{k-1} \in \mathbb{R}$ takové, že*

$$f(t) = c_0 + c_1 t + \dots + c_{k-1} t^{k-1} \quad \text{pro s.v. } t \in [a, b].$$

Váženým problémem v teorii distribucí je otázka, jak definovat jejich součin. Následující dvě klasické definice se týkají jen jistých speciálních typů distribucí.

7.28 Definice. (i) Jestliže f, g a $f g \in \mathbb{L}^1[a, b]$, pak

$$\langle f g, \varphi \rangle = \int_a^b f(t) g(t) \varphi(t) \, dt \quad \text{pro } \varphi \in \mathcal{D}[a, b].$$

(ii) Jestliže $f \in \mathfrak{D}^*[a, b]$ a funkce g má na $[a, b]$ spojité derivace libovolného řádu, pak $\langle f g, \varphi \rangle = \langle f, g \varphi \rangle$.

Pro zkoumání diferenciálních rovnic s distributivními koeficienty je užitečné mít k dispozici rozumnou definici součinu distribucí f a g' (resp. f' a g), kde $f \in \mathbb{G}[a, b]$ a $g \in \mathbb{BV}[a, b]$. Definice 7.28 ovšem takové součiny definovat neumožňuje. Jejich smysluplnou definici můžeme formulovat teprve využitím KS-integrálu.

7.29 Definice. Jestliže $f \in \mathbb{G}[a, b]$ a $g \in \mathbb{BV}[a, b]$, pak definujeme

$$\langle f' g, \varphi \rangle = \int_a^b \varphi g \, d f \quad \text{a} \quad \langle f g', \varphi \rangle = \int_a^b \varphi f \, d g.$$

7.30 Lemma. Necht' $f \in \mathbb{G}[a, b]$ a $g \in \mathbb{BV}[a, b]$ splňují

$$\Delta^+ f(t) \Delta^+ g(t) = \Delta^- f(t) \Delta^- g(t) \quad \text{pro každé } t \in (a, b). \quad (7.31)$$

Potom

$$f' g = F', \quad \text{kde } F(t) = \int_a^t g \, d f \quad \text{pro } t \in [a, b] \quad (7.32)$$

a

$$f g' = G', \quad \text{kde } G(t) = \int_a^t f \, d g \quad \text{pro } t \in [a, b]. \quad (7.33)$$

D ů k a z. Použitím věty o substituci (věta 6.47) a věty o integraci per-partes (věta 6.36) pro libovolné $\varphi \in \mathfrak{D}[a, b]$ dostaneme

$$\begin{aligned} \langle f' g, \varphi \rangle &= \int_a^b \varphi(t) \, d \left[\int_a^t g \, d f \right] = - \int_a^b \varphi'(t) \left(\int_a^t g \, d f \right) \, d t \\ &= \left\langle \left(\int_a^t g \, d f \right)', \varphi \right\rangle, \end{aligned}$$

tj. platí (7.32). Vztah (7.33) se dokazuje analogicky. \square

7.31 Důsledek. Jestliže funkce $f \in \mathbb{G}[a, b]$ a $g \in \mathbb{BV}[a, b]$ splňují (7.31), pak

$$(f g)' = f g' + f' g.$$

D ů k a z. Podle definice 7.23, věty o integraci per-partes (viz větu 6.36) a lemmatu 7.30 dostáváme

$$\begin{aligned} \langle (f g)', \varphi \rangle &= - \langle f g, \varphi' \rangle \\ &= - \int_a^b \varphi' f g \, d t = \int_a^b \varphi(t) \, d [f(t) g(t) - f(a) g(a)] \\ &= \int_a^b \varphi(t) \, d \left[\int_a^t g \, d f + \int_a^t f \, d g \right] = \langle f g', \varphi \rangle + \langle f' g, \varphi \rangle. \quad \square \end{aligned}$$

7.32 Poznámka. Nechť $f \in \mathbb{G}[a, b]$ a $g \in \mathbb{BV}[a, b]$. Podmínka (7.31) je pak zřejmě splněna např. v následujících případech:

- (i) obě funkce jsou regulární (viz poznámku 4.16),
- (ii) alespoň jedna z nich je spojitá na (a, b) ,
- (iii) jedna z nich zleva spojitá na (a, b) a druhá je zprava spojitá na (a, b) .

7.33 Cvičení. Dokažte, že jestliže $\tau \in (a, b)$ a h_τ , resp. δ_τ jsou Heavisideova funkce, resp. Diracova distribuce se středem v τ , pak $h_\tau \delta_\tau = \delta_\tau/2$.

(Návod: Použijte cvičení 6.33.)

Zobecněné lineární diferenciální rovnice

8.1 Úvod

Všechny integrály v této kapitole jsou KS-integrály, jejichž definice je rozšířena ve smyslu odstavce 6.8 na maticové funkce (tj. funkce zobrazující interval $[a, b]$ do prostoru matic). Jak jsme již v odstavci 6.8 vysvětlili, všechny vlastnosti KS-integrálu i obou typů RS-integrálu, které jsme doposud dokázali pro skalární funkce, platí i pro funkce vektorové či maticové, pokud se v příslušných formulích nezmění pořadí, v jakém se tam maticové funkce objevují. V důkazech se tedy budeme pro potřebné vlastnosti funkcí a integrálů odvolávat na odpovídající tvrzení pro skalární funkce z kapitol 1–6.

Následující definice zavádí prostory vektorových, resp. maticových funkcí, se kterými budeme v této kapitole pracovat.

- 8.1 Definice.** (i) $\mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$ je Banachův prostor funkcí $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, které jsou regulované na $[a, b]$. Norma na $\mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$ je definována předpisem $\|f\| = \sup_{t \in [a, b]} |f(t)|$ pro $f \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$, kde $|f(t)|$ je norma vektoru $f(t)$ v \mathbb{R}^n .
- (ii) $\mathbb{BV}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$ je Banachův prostor funkcí $F: [a, b] \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$, které mají konečnou variaci na $[a, b]$. Norma na $\mathbb{BV}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$ je definována předpisem $\|F\|_{\mathbb{BV}} = |F(a)| + \text{var}_a^b F$ pro $F \in \mathbb{BV}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$, kde $\text{var}_a^b F$ se definuje jako v odstavci 6.8 a $|F(a)|$ je norma matice $F(a)$ v $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$.

Podobně se definují prostory $\mathbb{BV}([a, b], \mathbb{R}^n)$, $\mathbb{C}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$ a $\mathbb{C}([a, b], \mathbb{R}^n)$ a normy na nich. Množinu funkcí $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ s derivací spojitou na intervalu $[a, b]$ značíme $\mathbb{C}^1([a, b], \mathbb{R}^n)$. (Jako obvykle, definujeme $f'(a) = f'(a+)$ a $f'(b) = f'(b-)$ pro $f \in \mathbb{C}^1([a, b], \mathbb{R}^n)$.)

Tématem této kapitoly budou rovnice tvaru

$$x(t) - x(s) - \int_s^t dAx = f(t) - f(s), \quad (8.1)$$

kde $t, s \in [a, b]$, A je $n \times n$ -maticová funkce, f je n -vektorová funkce a hledáme n -vektorovou funkci x vyhovující následující definici.

8.2 Definice. Funkce $x: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ je řešením rovnice (8.1) na intervalu $[a, b]$, jestliže existuje integrál $\int_a^b dAx$ a rovnost (8.1) je splněna pro libovolná $t, s \in [a, b]$.

Rovnice (8.1) se nazývá *zobecněná lineární diferenciální rovnice*.

8.3 Poznámka. Buď dáno $t_0 \in [a, b]$ a nechť x splňuje rovnost

$$x(t) - x(t_0) - \int_{t_0}^t dAx = f(t) - f(t_0) \quad (8.2)$$

pro $t \in [a, b]$. Potom pro libovolné $s \in [a, b]$ máme

$$x(s) = x(t_0) + \int_{t_0}^s dAx + f(s) - f(t_0).$$

Odečteme-li tuto rovnost od (8.2), zjistíme, že (8.1) platí pro libovolná $t, s \in [a, b]$, tj. x je řešením rovnice (8.1). Funkce $x: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ je tedy řešením rovnice (8.1) na $[a, b]$ právě tehdy, když pro nějaké pevné $t_0 \in [a, b]$ splňuje rovnost (8.2) na $[a, b]$.

8.2 Diferenciální rovnice s impulsy

Motivací pro studium zobecněných diferenciálních rovnic jsou mj. úlohy s impulsy. V řadě praktických úloh se totiž potkáme s perturbacemi, jejichž doba působení je sice zanedbatelná v porovnání s dobou celého procesu, které ale nicméně podstatně ovlivní studovaný proces. Zpravidla vhodným modelem pro popis takovýchto procesů jsou *diferenciální rovnice s impulsy*, tj. diferenciální rovnice, jejichž řešení nemusí být hladká, ba ani spojitá.

Zdrojem modelů s impulsy je zejména fyzika (např. popis hodinových mechanismů, oscilace elektromechanických systémů, vyzařování elektrických, resp. magnetických vln v prostředí s rychle se měnícími parametry, stabilizace Kapičova kyvadla, optimální regulace metodou bang-bang), ale také medicína (distribuce léčivých látek v těle, strategie impulsní vakcinace v epidemiologických modelech, studium účinku hromadného očkování proti spalničkám), populační dynamika (modely s rychlými změnami počtu některých populací) či ekonomie (modely trhu, které připouštějí prudké změny cen).

Nejjednodušší idealizací impulsních procesů jsou procesy popsané lineárními diferenciálními rovnicemi, na které v konečném počtu pevně daných bodů působí lineární impulsy.

Předpokládejme, že

$$\left. \begin{aligned} r \in \mathbb{N}, \quad a < \tau_1 < \dots < \tau_r < b, \\ P \in \mathbb{C}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)), \quad q \in \mathbb{C}([a, b], \mathbb{R}^n), \\ B_k \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n), \quad d_k \in \mathbb{R}^n \quad \text{pro } k = 1, 2, \dots, r. \end{aligned} \right\} \quad (8.3)$$

(V této kapitole budou symboly typu B_k , resp. d_k značit také matice, resp. vektory.)

Označme $D = \{\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_r\}$, $\tau_0 = a$, $\tau_{r+1} = b$. Pro každou regulovanou funkci $x: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ definujeme

$$\left. \begin{aligned} x_{[1]}(t) &= x(t) \quad \text{pro } t \in [a, \tau_1] \\ \text{a} \\ x_{[k]}(t) &= \begin{cases} x(\tau_{k-1}+) & \text{když } t = \tau_{k-1}, \\ x(t) & \text{když } t \in (\tau_{k-1}, \tau_k] \end{cases} \quad \text{pro } k = 2, 3, \dots, r+1. \end{aligned} \right\} \quad (8.4)$$

Lineární impulsní úloha je pak tvořena lineární diferenciální rovnicí

$$x' = P(t)x + q(t) \quad (8.5)$$

a lineárními impulsními podmínkami

$$\Delta^+ x(\tau_k) = B_k x(\tau_k) + d_k, \quad k = 1, 2, \dots, r, \quad (8.6)$$

přičemž řešení jsou určena podle následující definice.

8.4 Definice. Řekneme, že funkce $x: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ je řešením úlohy (8.5), (8.6), jestliže

$$x_{[k]} \in \mathbb{C}^1([\tau_{k-1}, \tau_k]) \quad \text{pro každé } k = 1, 2, \dots, r+1, \quad (8.7)$$

x vyhovuje impulsním podmínkám (8.6) a splňuje diferenciální rovnost

$$x'(t) = P(t)x(t) + q(t) \quad \text{pro } t \in [a, b] \setminus D. \quad (8.8)$$

8.5 Poznámka. Povšimněme si, že řešení úlohy (8.5), (8.6) patří vždy do prostoru $\mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$.

Ukážeme nyní, že úlohu (8.5), (8.6) můžeme ekvivalentně přeformulovat jako zobecněnou lineární diferenciální rovnici tvaru (8.2).

Předpokládejme zprvu, že $r = 1$, a necht' $x : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ je řešení impulsní úlohy (8.5), (8.6). Integrací rovnosti (8.8) dostaneme vztahy

$$a \quad x(t) = x(a) + \int_a^t P(s) x(s) \, ds + \int_a^t q(s) \, ds \quad \text{pro } t \in [a, \tau_1]$$

$$x(t) = x(\tau_1+) + \int_{\tau_1}^t P(s) x(s) \, ds + \int_{\tau_1}^t q(s) \, ds \quad \text{pro } t \in (\tau_1, b].$$

Dosazením z podmínek (8.6) (kde $k = r = 1$) do druhého vztahu pak dostaneme pro $t \in (\tau_1, b]$

$$\begin{aligned} x(t) &= x(\tau_1) + B_1 x(\tau_1) + d_1 + \int_{\tau_1}^t P(s) x(s) \, ds + \int_{\tau_1}^t q(s) \, ds \\ &= x(a) + \int_a^t P(s) x(s) \, ds + B_1 x(\tau_1) + \int_a^t q(s) \, ds + d_1, \end{aligned}$$

a tedy

$$\left. \begin{aligned} x(t) &= x(a) + \int_a^t P(s) x(s) \, ds + \chi_{(\tau_1, b]}(t) B_1 x(\tau_1) \\ &\quad + \int_a^t q(s) \, ds + \chi_{(\tau_1, b]}(t) d_1 \end{aligned} \right\} \text{pro } t \in [a, b]. \quad (8.9)$$

Položme

$$A(t) = \int_a^t P(s) \, ds + \chi_{(\tau_1, b]}(t) B_1 \quad \text{a} \quad f(t) = \int_a^t q(s) \, ds + \chi_{(\tau_1, b]}(t) d_1$$

pro $t \in [a, b]$. Pak $A \in \mathbb{BV}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$, $f \in \mathbb{BV}([a, b], \mathbb{R}^n)$ a $A(t-) = A(t)$ a $f(t-) = f(t)$ pro $t \in (a, b]$. Dále

$$A(t+) = \int_a^t P(s) \, ds + \chi_{[\tau_1, b]}(t) B_1 \quad \text{a} \quad f(t+) = \int_a^t q(s) \, ds + \chi_{[\tau_1, b]}(t) d_1$$

neboli

$$\Delta^+ A(t) = \chi_{[\tau_1]}(t) B_1 \quad \text{a} \quad \Delta^+ f(t) = \chi_{[\tau_1]}(t) d_1 \quad \text{pro } t \in [a, b].$$

Podle věty o substituci 6.47 a formule (6.11) z příkladů 6.15 (ii) (viz též příklady 6.44) platí

$$a \quad \int_a^t dAx = \int_a^t P(s) x(s) \, ds + \chi_{(\tau_1, b]}(t) B_1 x(\tau_1)$$

$$f(t) - f(a) = \int_a^t q(s) \, ds + \chi_{(\tau_1, b]}(t) d_1 \quad \text{pro } t \in [a, b]$$

a $x \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$. Dosazením do (8.9) zjistíme, že x splňuje na $[a, b]$ rovnost (8.2), kde $t_0 = a$.

Obráceně, jestliže $x \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$ splňuje (8.2) na $[a, b]$, pak podle výše uvedeného platí opět (8.9). Odtud vidíme, že definujeme-li funkce $x_{[k]}$ jako v (8.4), bude platit (8.7) a (8.8). Navíc, podle Hakeovy věty (viz též cvičení 6.43) je $x(t-) = x(t)$ pro každé $t \in (a, b]$ a

$$\begin{aligned} x(t+) &= x(a) + \lim_{s \rightarrow t+} \int_a^s dA x + f(t+) - f(a) \\ &= x(a) + \int_a^t dA x + f(t) - f(a) + \Delta^+ A(t) x(t) + \Delta^+ f(t) \\ &= x(t) + \chi_{[\tau_1]}(t) (B_1 x(t) + d_1) \quad \text{pro každé } t \in [a, b]. \end{aligned}$$

Speciálně dosazením $t = \tau_1$ zjistíme, že x splňuje impulsní podmínku (8.6), kde $k = r = 1$.

Vzhledem k poznámce 8.3 je tedy pro $r = 1$ úloha (8.5), (8.6) ekvivalentní se zobecněnou diferenciální rovnicí (8.1).

V obecném případě $r \in \mathbb{N}$, definujeme

$$\left. \begin{aligned} A(t) &= \int_a^t P(s) \, ds + \sum_{k=1}^r \chi_{(\tau_k, b]}(t) B_k, \\ f(t) &= \int_a^t q(s) \, ds + \sum_{k=1}^r \chi_{(\tau_k, b]}(t) d_k, \end{aligned} \right\} \quad \text{pro } t \in [a, b]. \quad (8.10)$$

Indukcí snadno ověříme následující tvrzení.

8.6 Věta. *Předpokládejme (8.3) a (8.10). Potom impulsní úloha (8.5), (8.6) je ekvivalentní se zobecněnou diferenciální rovnicí (8.2), tj. $x : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ je řešením úlohy (8.5), (8.6) na intervalu $[a, b]$ tehdy a jen tehdy, když je řešením rovnice (8.1) na intervalu $[a, b]$.* \square

8.3 Lineární operátory

Připomeňme nyní stručně několik základních pojmů z funkcionální analýzy, které budeme nadále potřebovat. Podrobnější informaci lze najít ve většině učebnic funkcionální analýzy (viz např. [3], [16], [32], [41]). Základní přehled je obsažen také v úvodní části monografie [55].

Nechť \mathbb{X}, \mathbb{Y} jsou Banachovy prostory. Zobrazení $T : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{Y}$ (T zobrazuje \mathbb{X} do \mathbb{Y}) je *spojitý operátor*, jestliže

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\|_{\mathbb{X}} = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \|T(x_n) - T(x)\|_{\mathbb{Y}} = 0,$$

kde $\|\cdot\|_{\mathbb{X}}$ je norma na \mathbb{X} a $\|\cdot\|_{\mathbb{Y}}$ je norma na \mathbb{Y} . Operátor $T: \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{Y}$ se nazývá *lineární*, jestliže platí

$$T(c_1 x_1 + c_2 x_2) = c_1 T(x_1) + c_2 T(x_2) \text{ pro } x_1, x_2 \in \mathbb{X} \text{ a } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Dále řekneme, že lineární operátor T je *ohraničený*, existuje-li číslo $K \in [0, \infty)$ takové, že platí $\|T(x)\|_{\mathbb{Y}} \leq K \|x\|_{\mathbb{X}}$ pro každé $x \in \mathbb{X}$.

Je-li T lineární operátor, píšeme, jak je zvykem, Tx místo $T(x)$. Je známo, že lineární operátor $T: \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{Y}$ je spojitý právě tehdy, když je ohraničený.

Množinu ohraničených lineárních zobrazení prostoru \mathbb{X} do prostoru \mathbb{Y} značíme $\mathcal{L}(\mathbb{X}, \mathbb{Y})$. Je-li $\mathbb{X} = \mathbb{Y}$, píšeme $\mathcal{L}(\mathbb{X})$ místo $\mathcal{L}(\mathbb{X}, \mathbb{X})$. Na $\mathcal{L}(\mathbb{X}, \mathbb{Y})$ jsou zřejmým způsobem zavedeny operace sčítání operátorů a násobení operátorů reálným číslem a $\mathcal{L}(\mathbb{X}, \mathbb{Y})$ je pak Banachův prostor vzhledem k normě

$$\|L\|_{\mathcal{L}(\mathbb{X}, \mathbb{Y})} = \sup \{ \|Lx\|_{\mathbb{Y}} : x \in \mathbb{X} \text{ a } \|x\|_{\mathbb{X}} \leq 1 \}.$$

Je známo, že prostor $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ je ekvivalentní s prostorem matic typu $n \times n$.

Konečně, řekneme, že $L \in \mathcal{L}(\mathbb{X}, \mathbb{Y})$ je *kompaktní*, jestliže zobrazuje každou množinu ohraničenou v \mathbb{X} na množinu relativně kompaktní v \mathbb{Y} , tj. jestliže pro každou posloupnost $\{x_n\}$ ohraničenou v \mathbb{X} její obraz $\{Lx_n\} \subset \mathbb{Y}$ obsahuje podposloupnost konvergentní v \mathbb{Y} . Je známo, že každý kompaktní lineární operátor je současně spojitý.

V důkazech hlavních výsledků této kapitoly využijeme následující dvě tvrzení. První z nich je zobecněním jedné z Fredholmových vět známých z teorie integrálních rovnic. Jeho důkaz je obsažen např. v monografiích N. Dunforda a J. T. Schwartz [5], M. Schechtera [44] nebo ve skriptech J. Lukeše [32].

8.7 Věta (FREDHOLMOVA VĚTA O ALTERNATIVĚ). *Bud' \mathbb{X} Banachův prostor a nechť operátor $L \in \mathcal{L}(\mathbb{X})$ je kompaktní. Potom operátorová rovnice*

$$x - Lx = g \tag{8.11}$$

má jediné řešení pro každé $g \in \mathbb{X}$ tehdy a jen tehdy, když příslušná homogenní rovnice

$$x - Lx = 0 \tag{8.12}$$

má pouze triviální řešení $x = 0 \in \mathbb{X}$.

Druhé tvrzení je známo také z elementární teorie matic. Připomeňme si zde jeho obecnou podobu převzatou z monografie [58] (viz Lemma 4.1-C).

8.8 Lemma. *Nechť \mathbb{X} je Banachův prostor, $T \in \mathcal{L}(\mathbb{X})$ a $\|T\|_{\mathcal{L}(\mathbb{X})} < 1$. Potom existuje ohraničený inverzní operátor $[I - T]^{-1}$ k operátoru $[I - T]$ a platí rovnost*

$$\| [I - T]^{-1} \|_{\mathcal{L}(\mathbb{X})} \leq \frac{1}{1 - \|T\|_{\mathcal{L}(\mathbb{X})}}.$$

8.4 Existence řešení zobecněných lineárních diferenciálních rovnic

Studium zobecněných lineárních diferenciálních rovnic zahájíme prostým pozorováním vycházejícím ze známých vlastností KS-integrálu.

8.9 Věta. *Nechť $A \in \mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$ a $f \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$. Potom každé řešení x rovnice (8.1) na $[a, b]$ je regulované na $[a, b]$ a platí pro něj vztahy*

$$\left. \begin{aligned} \Delta^- x(t) &= \Delta^- A(t) x(t) + \Delta^- f(t) \quad \text{když } t \in (a, b], \\ \Delta^+ x(s) &= \Delta^+ A(s) x(s) + \Delta^+ f(s) \quad \text{když } s \in [a, b). \end{aligned} \right\} (8.13)$$

Důkaz plyne z důsledku 6.41 Saksova-Henstockova lemmatu. \square

Vzhledem k větě 8.9 je tedy vhodné hledat řešení zobecněných lineárních diferenciálních rovnic ve třídě $\mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$.

Analogiemi počátečních úloh pro lineární obyčejné diferenciální rovnice jsou úlohy

$$x(t) - \tilde{x} - \int_{t_0}^t dAx = f(t) - f(t_0), \quad (8.14)$$

kde bod $t_0 \in [a, b]$ a vektor $\tilde{x} \in \mathbb{R}^n$ jsou dány předem.

8.10 Definice. Řešením počáteční úlohy (8.14) na intervalu $[a, b]$ rozumíme funkci $x : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, pro kterou je splněna rovnost (8.14) pro každé $t \in [a, b]$.

8.11 Poznámka. Vzhledem k poznámce 8.3 je zřejmé, že funkce x je řešením počáteční úlohy (8.14) na $[a, b]$ právě tehdy, když je řešením rovnice (8.1) na $[a, b]$ a platí $x(t_0) = \tilde{x}$.

Každé funkci $x \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$ a bodu $t_0 \in [a, b]$ přiřadíme funkci $\mathcal{A}_{t_0}x$ předpisem

$$(\mathcal{A}_{t_0}x)(t) = \int_{t_0}^t dAx \quad \text{pro } t \in [a, b]. \quad (8.15)$$

Podle důsledku 6.41 jsou funkce $\mathcal{A}_{t_0}x$ regulované na $[a, b]$. Zobrazení

$$\mathcal{A}_{t_0} : x \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{A}_{t_0}x \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$$

je zřejmě lineární a dále podle věty 6.18 platí

$$\|\mathcal{A}_{t_0}x\| \leq (\text{var}_a^b A) \|x\| \quad \text{pro každé } x \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n).$$

Pro každé $t_0 \in [a, b]$ je tedy \mathcal{A}_{t_0} spojité lineární operátor na $\mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$, tj. $\mathcal{A}_{t_0} \in \mathcal{L}(\mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n))$.

Dokážeme nyní, že současně je předpisem (8.15) definován spojité lineární operátor zobrazující $\mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$ do $\mathbb{BV}([a, b], \mathbb{R}^n)$.

8.12 Lemma. *Nechť $A \in \mathbb{BV}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$, $t_0 \in [a, b]$ a nechť funkce $\mathcal{A}_{t_0}x$ je pro $x \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$ definována vztahem (8.15). Potom $\mathcal{A}_{t_0}x \in \mathbb{BV}([a, b], \mathbb{R}^n)$ pro každé $x \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$ a operátor*

$$x \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{A}_{t_0}x \in \mathbb{BV}([a, b], \mathbb{R}^n)$$

je ohraničený.

D ů k a z. Buď σ libovolné dělení intervalu $[a, b]$. Podle věty 6.18 pro každé $x \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$ máme

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} |(\mathcal{A}_{t_0}x)(\sigma_j) - (\mathcal{A}_{t_0}x)(\sigma_{j-1})| &= \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \left| \int_{\sigma_{j-1}}^{\sigma_j} dAx \right| \\ &\leq \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} (\text{var}_{\sigma_{j-1}}^{\sigma_j} A) \|x\| = (\text{var}_a^b A) \|x\| \end{aligned}$$

a

$$|(\mathcal{A}_{t_0}x)(a)| = \left| \int_{t_0}^a dAx \right| \leq (\text{var}_a^b A) \|x\|.$$

Tudíž $\mathcal{A}_{t_0}x \in \mathbb{BV}([a, b], \mathbb{R}^n)$ a

$$\|\mathcal{A}_{t_0}x\|_{\mathbb{BV}} = |(\mathcal{A}_{t_0}x)(a)| + \text{var}_a^b(\mathcal{A}_{t_0}x) \leq 2(\text{var}_a^b A) \|x\|$$

pro každé $x \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$. □

Pomocí operátoru \mathcal{A}_{t_0} z (8.15) můžeme přepsat počáteční úlohu (8.14) jako operátorovou rovnici

$$x - \mathcal{A}_{t_0}x = g, \quad \text{kde } g = \tilde{x} + f - f(t_0).$$

Protože nemáme k dispozici prostředky postačující k důkazu kompaktnosti operátoru $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(\mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n))$, nemůžeme přímo aplikovat Fredholmovu větu (věta 8.7) a musíme postupovat tak trochu oklikou. V následující větě ukážeme pomocí Hellyovy věty a Osgoodovy věty, že operátor \mathcal{A}_{t_0} generuje kompaktní zobrazení prostoru $\mathbb{BV}([a, b], \mathbb{R}^n)$ do sebe.

8.13 Věta. *Nechť $t_0 \in [a, b]$ a $A \in \mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$. Položme $Lx = \mathcal{A}_{t_0}x$ pro $x \in \mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathbb{R}^n)$. Potom L je kompaktní lineární operátor na $\mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathbb{R}^n)$.*

D ů k a z. Protože je $\|x\| \leq \|x\|_{\mathbb{B}\mathbb{V}}$ pro každé $x \in \mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathbb{R}^n)$, plyne z lemmatu 8.12, že $L \in \mathcal{L}(\mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathbb{R}^n))$.

Dokážeme, že pro každou posloupnost $\{x_n\}$ ohraničenou v $\mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathbb{R}^n)$ její obraz $\{Lx_n\} \subset \mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathbb{R}^n)$ obsahuje podposloupnost, která je konvergentní v $\mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathbb{R}^n)$.

Nechť jsou tedy posloupnost $\{x_n\} \subset \mathbb{B}\mathbb{V}[a, b]$ a číslo $\varkappa \in [0, \infty)$ takové, že $\|x_n\|_{\mathbb{B}\mathbb{V}} \leq \varkappa < \infty$ pro každé $n \in \mathbb{N}$. Podle Hellyovy věty (věta 2.46) existují funkce $x \in \mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathbb{R}^n)$ a rostoucí podposloupnost $\{n_k\} \subset \mathbb{N}$ takové, že

$$\|x\|_{\mathbb{B}\mathbb{V}} \leq 2\varkappa \quad \text{a} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}(t) = x(t) \quad \text{pro každé } t \in [a, b].$$

Označme $z_k(t) = x_{n_k}(t) - x(t)$ a pro $k \in \mathbb{N}$ a $t \in [a, b]$. Potom

$$|z_k(t)| \leq 4\varkappa \quad \text{a} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} z_k(t) = 0 \quad \text{pro } k \in \mathbb{N} \text{ a } t \in [a, b].$$

Vzhledem k tomu, že integrály $\int_c^d dA z_k$ a $\int_c^d d[\text{var}_a^s A] |z_k(s)|$ existují pro libovolná $c, d \in [a, b]$ a $k \in \mathbb{N}$, věta 6.18 zaručuje, že platí

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} |(Lz_k)(\sigma_j) - (Lz_k)(\sigma_{j-1})| &= \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \left| \int_{\sigma_{j-1}}^{\sigma_j} dA z_k \right| \\ &\leq \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \int_{\sigma_{j-1}}^{\sigma_j} d[\text{var}_a^s A] |z_k(s)| \leq \int_a^b d[\text{var}_a^s A] |z_k(s)| \end{aligned}$$

pro libovolná $\sigma \in \mathcal{D}[a, b]$ a $k \in \mathbb{N}$. Máme tedy

$$\text{var}_a^b(Lz_k) \leq \int_a^b d[\text{var}_a^s A] |z_k(s)| \quad \text{pro } k \in \mathbb{N}.$$

Podle věty 6.51 je ovšem

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^b d[\text{var}_a^s A] |z_k(s)| = 0,$$

a tudíž také

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \text{var}_a^b(Lx_{n_k} - Lx) = \lim_{k \rightarrow \infty} \text{var}_a^b(Lz_k) = 0.$$

Podobně

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} |(L x_{n_k}(a) - L x(a))| &= \lim_{k \rightarrow \infty} |(L z_k)(a)| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \int_{t_0}^a d A z_k \right| \\ &\leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{t_0}^a [\text{var}_a^s A] |z_k(s)| = 0. \end{aligned}$$

Věta je dokázána. □

Následující tvrzení je důsledkem věty 8.7 a věty 8.13.

8.14 Věta. *Nechť $A \in \mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$ a $t_0 \in [a, b]$. Potom počáteční úloha*

$$x(t) - \int_{t_0}^t d A x = g(t) \tag{8.16}$$

má pro každou funkci $g \in \mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathbb{R}^n)$ jediné řešení na $[a, b]$ právě tehdy, když odpovídající homogenní úloha

$$x(t) - \int_{t_0}^t d A x = 0 \tag{8.17}$$

má na $[a, b]$ pouze triviální řešení $x \equiv 0$.

D ů k a z. Rovnice (8.16) je ekvivalentní s operátorovou rovnicí $x - L x = g$, kde $L x = \mathcal{A}_{t_0} x$ pro $x \in \mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathbb{R}^n)$, tj.

$$(L x)(t) = \int_{t_0}^t d A x \quad \text{pro } x \in \mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathbb{R}^n) \text{ a } t \in [a, b].$$

Podle věty 8.13 je L lineární kompaktní operátor na $\mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathbb{R}^n)$. K dokončení důkazu věty využijeme větu 8.7. □

Předpokládejme nyní, že $\tau \in (t_0, b]$ a funkce $x \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$ splňuje rovnost (8.14) na intervalu $[t_0, \tau)$. Zřejmě je $x(t_0) = \tilde{x}$. Pomocí Hakeovy věty (věta 6.42, viz též příklady 6.44 a cvičení 6.45) snadno ověříme, že platí

$$\begin{aligned} x(\tau-) &= \tilde{x} + \lim_{s \rightarrow \tau-} \int_{t_0}^s d A x + (f(\tau-) - f(t_0)) \\ &= \tilde{x} + \int_{t_0}^{\tau} d A x + f(\tau) - f(t_0) - \lim_{s \rightarrow \tau-} \int_s^{\tau} d A x - \Delta^- f(\tau) \\ &= \tilde{x} + \int_{t_0}^{\tau} d A x + f(\tau) - f(t_0) - \Delta^- A(\tau) x(\tau) - \Delta^- f(\tau). \end{aligned}$$

Má-li tedy funkce x splňovat (8.14) také v bodě τ , musí hodnota $x(\tau)$ vyhovovat rovnici

$$[I - \Delta^- A(\tau)] x(\tau) = x(\tau-) + \Delta^- f(\tau), \quad (8.18)$$

kde I značí jednotkovou matici typu $n \times n$ (viz Úmluvy a označení (xiv)). Odtud je zřejmé, že řešení počáteční úlohy (8.14) na intervalu $[t_0, \tau)$ bude možno jednoznačným způsobem prodloužit do bodu τ , jestliže bude platit

$$\det [I - \Delta^- A(\tau)] \neq 0. \quad (8.19)$$

Podobně jako výše můžeme usoudit, že funkce $x \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$ splňující (8.14) na intervalu $(\tau, t_0]$, kde $\tau \in [a, t_0)$, splňuje (8.14) také v bodě τ tehdy a jen tehdy, když platí

$$[I + \Delta^+ A(\tau)] x(\tau) = x(\tau+) - \Delta^+ f(\tau), \quad (8.20)$$

a k tomu stačí, aby platilo

$$\det [I + \Delta^+ A(\tau)] \neq 0. \quad (8.21)$$

(Rozmyslete si detaily!) Můžeme tedy očekávat, že podmínky (8.19) a (8.21) jsou podstatné pro existenci řešení úlohy (8.14).

8.15 Lemma. *Nechť $A \in \mathbb{BV}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$ a $t_0 \in [a, b]$. Potom úloha (8.16) má jediné řešení pro každou funkci $g \in \mathbb{BV}([a, b], \mathbb{R}^n)$ tehdy a jen tehdy, když*

$$a \quad \det [I - \Delta^- A(t)] \neq 0 \quad \text{pro každé } t \in (t_0, b] \quad (8.22)$$

$$\det [I + \Delta^+ A(s)] \neq 0 \quad \text{pro každé } s \in [a, t_0). \quad (8.23)$$

(Zde $(t_0, b] = \emptyset$, když $t_0 = b$, a $[a, t_0) = \emptyset$, když $t_0 = a$.)

Důkaz. a) Předpokládejme, že $t_0 \in [a, b)$, $g \in \mathbb{BV}([a, b], \mathbb{R}^n)$, A splňuje (8.22) a (8.23) a x splňuje (8.17) na $[a, b]$. Vzhledem k poznámce 8.3 je x řešením rovnice (8.1) na $[a, b]$, přičemž $x(t_0) = 0$. Podle věty 8.9 je x regulovaná na $[a, b]$ a z druhé rovnice v (8.13) plyne, že platí $\Delta^+ x(t_0) = \Delta^+ A(t_0) x(t_0) = 0$, tj. $x(t_0+) = 0$.

Označme $\alpha(t) = \text{var}_{t_0}^t A$ pro $t \in [t_0, b]$. Funkce α je neklesající na intervalu $[t_0, b]$. Existuje tedy konečná limita $\alpha(t_0+)$ a můžeme zvolit $\delta \in (0, b - t_0)$ tak, aby platilo $0 \leq \alpha(t_0 + \delta) - \alpha(t_0+) < 1/2$. Pro každé $t \in [t_0, t_0 + \delta]$ odtud pomocí

vět 6.18 a 6.42 odvodíme nerovnosti

$$\begin{aligned} |x(t)| &\leq \int_{t_0}^t |x| \, d\alpha = \Delta^+ \alpha(t_0) |x(t_0)| + \lim_{\tau \rightarrow t_0^+} \int_{\tau}^t |x| \, d\alpha \\ &= \lim_{\tau \rightarrow t_0^+} \int_{\tau}^t |x| \, d\alpha \leq [\alpha(t_0 + \delta) - \alpha(t_0 +)] \left(\sup_{t \in [t_0, t_0 + \delta]} |x(t)| \right) \\ &\leq \frac{1}{2} \left(\sup_{t \in [t_0, t_0 + \delta]} |x(t)| \right). \end{aligned}$$

Tudíž $\left(\sup_{t \in [t_0, t_0 + \delta]} |x(t)| \right) \leq \frac{1}{2} \left(\sup_{t \in [t_0, t_0 + \delta]} |x(t)| \right)$. To je ale možné pouze tehdy, když $x = 0$ na $[t_0, t_0 + \delta]$.

Položme $t^* = \sup\{\tau \in (t_0, b] : x = 0 \text{ na } [t_0, \tau]\}$. Zřejmě je $x = 0$ na $[t_0, t^*)$, a tudíž také $x(t^* -) = 0$. Dále podle (8.13) máme $0 = [I - \Delta^- A(t^*)] x(t^*)$. To je ale, vzhledem k předpokladu (8.22), možné pouze tehdy, když $x(t^*) = 0$.

Předpokládejme, že $t^* < b$. Stejnou argumentací, jakou jsme na začátku důkazu dokázali, že existuje $\delta \in (0, b - t_0)$ takové, že x je nulové na $[t_0, t_0 + \delta]$, ukázali bychom nyní, že existuje $\eta \in (0, b - t^*)$ takové, že x se anuluje na $[t^*, t^* + \eta]$, což je ovšem vzhledem k definici t^* nemožné, tudíž musí být $t^* = b$. Dokázali jsme, že každé řešení úlohy (8.17) je nulové na $[t_0, b]$.

Podobně bychom pomocí předpokladu (8.23) dokázali, že je-li $t_0 \in (a, b]$, pak se řešení x úlohy (8.17) anuluje také na $[a, t_0]$.

Dokázali jsme, že platí-li (8.22) a (8.23), má úloha (8.17) pouze triviální řešení na $[a, b]$. Podle věty 8.14 má tedy úloha (8.16) jediné řešení na $[a, b]$.

b) Předpokládejme, že neplatí např. (8.22). Zřejmě je $\det [I - \Delta^- A(t)] \neq 0$, jestliže je $|\Delta^- A(t)| \leq 1/2$. Na druhou stranu, podle důsledku 4.10 obrácená nerovnost $|\Delta^- A(t)| > 1/2$ platí pro nejvýše konečně mnoho bodů $t \in (t_0, b]$. Matice $I - \Delta^- A(t)$ tedy není regulární pro nejvýše konečně mnoho bodů $t \in (t_0, b]$.

Můžeme tedy zvolit $t^* \in (t_0, b]$ takové, že

$$\det [I - \Delta^- A(t)] \neq 0 \text{ pro } t \in (t_0, t^*) \quad \text{a} \quad \det [I - \Delta^- A(t^*)] = 0.$$

Dále ze základů lineární algebry je známo, že potom existuje $d \in \mathbb{R}^n$ takové, že

$$[I - \Delta^- A(t^*)] c \neq d \quad \text{pro každé } c \in \mathbb{R}^n. \quad (8.24)$$

Definujme

$$g(t) = \begin{cases} 0 & \text{když } t \neq t^*, \\ d & \text{když } t = t^*. \end{cases}$$

Máme $g \in \mathbb{BV}([a, b], \mathbb{R}^n)$ a $\Delta^- g(t^*) = d$. Předpokládejme, že rovnice (8.16) má na $[a, b]$ řešení x . Potom podle první části důkazu musí být $x = 0$ na $[a, t^*)$, a

tedy také $x(t^* -) = 0$. Podle věty 8.9 musí platit $[I - \Delta^- A(t^*)] x(t^*) = d$. To je ovšem ve sporu s tvrzením (8.24). Úloha (8.16) tedy nemůže mít řešení.

Neplatí-li (8.23), pak analogicky najdeme bod $t^* \in [a, t_0]$ a funkci g takové, že bude

$$[I + \Delta^+ A(t^*)] c \neq \Delta^+ g(t^*) \quad \text{pro každé } c \in \mathbb{R}^n,$$

což vede opět ke sporu s větou 8.9. □

8.16 Věta. *Nechť $A \in \mathbb{BV}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$ a $t_0 \in [a, b]$. Potom počáteční úloha (8.14) má pro každou funkci $f \in \mathbb{BV}([a, b], \mathbb{R}^n)$ a každý vektor $\tilde{x} \in \mathbb{R}^n$ jediné řešení tehdy a jen tehdy, když platí (8.22) a (8.23).*

Důkaz. Věta je důsledkem lemmatu 8.15, kde položíme

$$g(t) = \tilde{x} + f(t) - f(t_0) \quad \text{pro } t \in [a, b]. \quad \square$$

8.5 Zobecněné Gronwallovo lemma a apriorní odhady řešení

Důležitou roli v teorii obyčejných diferenciálních rovnic (např. při důkazu jednoznačnosti řešení počáteční úlohy nebo při důkazech spojitě závislosti řešení na některých parametrech) hraje tvrzení, které se nazývá Gronwallovo lemma. Připomeňme si jeho znění. Důkaz lze najít ve většině učebnic obyčejných diferenciálních rovnic (viz např. [23, Pomocná věta 4.3.1]).

8.17 Lemma (GRONWALL). *Nechť funkce u a p jsou spojité a nezáporné na $[a, b]$, $K \geq 0$ a nechť*

$$u(t) \leq K + \int_a^t (p(s) u(s)) \, ds \quad \text{pro } t \in [a, b].$$

Potom

$$u(t) \leq K \exp\left(\int_a^t p(s) \, ds\right) \quad \text{pro } t \in [a, b].$$

Pro nás bude podobně důležité zobecnění Gronwallova lemmatu na případ, kdy se v příslušných integrálních nerovnostech vyskytuje Stieltjesův integrál.

8.18 Věta (ZOBECNĚNÉ GRONWALLOVO LEMMA). *Předpokládejme, že funkce $u : [a, b] \rightarrow [0, \infty)$ je ohraničená na $[a, b]$, funkce $h : [a, b] \rightarrow [0, \infty)$ je neklesající a zleva spojitá na (a, b) , $K \geq 0$, $L \geq 0$ a nechť*

$$u(t) \leq K + L \int_a^t u \, dh \quad \text{pro } t \in [a, b]. \quad (8.25)$$

Potom

$$u(t) \leq K \exp(L[h(t) - h(a)]) \quad \text{pro } t \in [a, b]. \quad (8.26)$$

Důk a z. Nechť $\kappa \geq 0$ a $w_\kappa(t) = \kappa \exp(L[h(t) - h(a)])$ pro $t \in [a, b]$. Potom

$$\begin{aligned} \int_a^t w_\kappa \, dh &= \kappa \int_a^t \exp(L[h(s) - h(a)]) \, dh(s) \\ &= \kappa \int_a^t \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{L^k}{k!} [h(s) - h(a)]^k \right) \, dh(s) \quad \text{pro } t \in [a, b]. \end{aligned}$$

Protože, jak známo, řada $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{L^k}{k!} [h(t) - h(a)]^k$ konverguje stejnoměrně na $[a, b]$, můžeme přehodit pořadí operací integrace a sčítání. Použijeme-li nyní navíc tvrzení z příkladu 6.22, dostaneme

$$\begin{aligned} \int_a^t w_\kappa \, dh &= \kappa \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{L^k}{k!} \int_a^t [h(s) - h(a)]^k \right) \, dh(s) \\ &\leq \kappa \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{L^k [h(t) - h(a)]^{k+1}}{(k+1)!} \right) = \frac{\kappa}{L} \left(\exp(L[h(t) - h(a)]) - 1 \right) \\ &= \frac{w_\kappa(t) - \kappa}{L} \end{aligned}$$

pro $t \in [a, b]$. To znamená, že funkce w_κ splňuje pro každé $\kappa \geq 0$ a $t \in [a, b]$ nerovnost

$$w_\kappa(t) \geq \kappa + L \int_a^t w_\kappa \, dh. \quad (8.27)$$

Buď dáno $\varepsilon > 0$ a položíme $\kappa = K + \varepsilon$ a $v_\varepsilon = u - w_\kappa$. Odečtením nerovností (8.25) a (8.27) zjistíme, že platí

$$v_\varepsilon(t) \leq -\varepsilon + L \int_a^t v_\varepsilon \, dh \quad \text{pro } t \in [a, b]. \quad (8.28)$$

Speciálně $v_\varepsilon(a) \leq -\varepsilon < 0$. Zbývající část důkazu bude připomínat postup z důkazu lemmatu 8.15. Funkce u i w_κ jsou evidentně ohraničené na $[a, b]$ pro každé $\kappa \geq 0$. Tudíž také funkce v_ε je ohraničená na $[a, b]$. Podle Hakeovy věty 6.42 (ii) máme

$$\begin{aligned} \int_a^t v_\varepsilon \, dh &= v_\varepsilon(a) \Delta^+ h(a) + \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{a+\delta}^t v_\varepsilon \, dh \\ &\leq -\varepsilon \Delta^+ h(a) + \|v_\varepsilon\| [h(t) - h(a+)] \leq \|v_\varepsilon\| [h(t) - h(a+)], \end{aligned}$$

a tedy

$$v_\varepsilon(t) \leq -\varepsilon + L \int_a^t v_\varepsilon \, dh \leq -\varepsilon + L \|v_\varepsilon\| [h(t) - h(a+)] \quad \text{pro } t \in [a, b].$$

Zvolme $\eta > 0$ tak, aby platilo $L \|v_\varepsilon\| [h(t) - h(a+)] < \varepsilon/2$ pro $t \in [a, a + \eta]$. Pak bude $v_\varepsilon < 0$ na $[a, a + \eta]$. Označme $t^* = \sup\{\tau \in [a, b] : v_\varepsilon < 0 \text{ na } [a, \tau]\}$.

Vidíme, že je $t^* > a$ a $v_\varepsilon < 0$ na $[a, t^*]$. Opětným použitím Hakeovy věty 6.42 (i) dostaneme z (8.28)

$$\begin{aligned} v_\varepsilon(t^*) &\leq -\varepsilon + L \int_a^{t^*} v_\varepsilon \, dh \\ &= -\varepsilon + L \left(v_\varepsilon(t^*) \Delta^- h(t^*) + \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_a^{t^* - \delta} v_\varepsilon \, dh \right) \leq -\varepsilon < 0, \end{aligned}$$

protože $\Delta^- h(t^*) = 0$ a $\int_a^{t^* - \delta} v_\varepsilon \, dh \leq 0$ pro každé $\delta > 0$.

Kdyby bylo $t^* < b$, zopakovali bychom předcházející postup a ukázali, že existuje $\theta \in (0, b - t^*)$ takové, že $v_\varepsilon < 0$ na intervalu $[a, t^* + \theta]$, což je ve sporu s definicí t^* . Tudíž $t^* = b$, $v_\varepsilon < 0$ na celém $[a, b]$ a

$$u(t) < w_\kappa(t) = K \exp(L(h(t) - h(a))) + \varepsilon \exp(L(h(t) - h(a))) \text{ pro } t \in [a, b].$$

Protože $\varepsilon > 0$ bylo libovolné, znamená to, že platí (8.26). \square

8.19 Cvičení. Dokažte následující variantu věty 8.18:

Předpokládejme, že funkce $u: [a, b] \rightarrow [0, \infty)$ je ohraničená na $[a, b]$, funkce $h: [a, b] \rightarrow [0, \infty)$ je neklesající a zprava spojitá na $[a, b]$, $K \geq 0$, $L \geq 0$ a

$$u(t) \leq K + L \int_t^b u \, dh \quad \text{pro } t \in [a, b]. \quad (8.29)$$

Potom

$$u(t) \leq K \exp(L[h(b) - h(t)]) \quad \text{pro } t \in [a, b]. \quad (8.30)$$

8.20 Poznámka. Obecnější verze zobecněného Gronwallova lemmatu jsou obsaženy v monografiích Š. Schwabika [45] (viz větu 1.40) a J. Kurzweila [27] (viz kapitola 22).

V následující větě využijeme zobecněné Gronwallovo lemma k odvození důležitého odhadu pro řešení úlohy (8.14).

8.21 Věta. *Nechť $t_0 \in [a, b]$ a $A \in \mathbb{BV}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$ splňují (8.22) a (8.23), $f \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$, $\tilde{x} \in \mathbb{R}^n$ a nechť x je řešení počáteční úlohy (8.14) na $[a, b]$.*

Potom

$$\text{var}_a^b(x - f) \leq (\text{var}_a^b A) \|x\| < \infty, \quad (8.31)$$

$$c_{(A, t_0)} := \max \left\{ 1, \sup_{t \in (t_0, b)} |[I - \Delta^- A(t)]^{-1}|, \sup_{t \in [a, t_0]} |[I + \Delta^+ A(t)]^{-1}| \right\} < \infty, \quad (8.32)$$

$$\left. \begin{aligned} |x(t)| &\leq c_{(A, t_0)} (|\tilde{x}| + 2 \|f\|) \exp(2 c_{(A, t_0)} \text{var}_{t_0}^t A) \quad \text{pro } t \in [t_0, b], \\ |x(t)| &\leq c_{(A, t_0)} (|\tilde{x}| + 2 \|f\|) \exp(2 c_{(A, t_0)} \text{var}_t^{t_0} A) \quad \text{pro } t \in [a, t_0]. \end{aligned} \right\} \quad (8.33)$$

D ů k a z . a) Pro libovolné dělení σ intervalu $[a, b]$ máme

$$\begin{aligned} & \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \left| x(\sigma_j) - f(\sigma_j) - x(\sigma_{j-1}) + f(\sigma_{j-1}) \right| \\ &= \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \left| \int_{\sigma_{j-1}}^{\sigma_j} d[A] x \right| \leq \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} [(\text{var}_{\sigma_{j-1}}^{\sigma_j} A) \|x\|] = (\text{var}_a^b A) \|x\| < \infty. \end{aligned}$$

Odtud okamžitě plyne, že platí (8.31).

b) Pro $t \in (t_0, b]$ takové, že $|\Delta^- A(t)| \leq \frac{1}{2}$ máme podle lemmatu 8.8

$$|[I - \Delta^- A(t)]^{-1}| \leq \frac{1}{1 - |\Delta^- A(t)|} < 2.$$

Protože množina $\{t \in [a, b]: |\Delta^- A(t)| > \frac{1}{2}\}$ je podle důsledku 4.10 nejvýše konečná, plyne odtud, že

$$\sup_{t \in (t_0, b]} |[I - \Delta^- A(t)]^{-1}| < \infty.$$

Podobně bychom dokázali, že je $\sup_{t \in [a, t_0]} |[I + \Delta^+ A(t)]^{-1}| < \infty$. Platí tedy (8.32).

c) Nechť x splňuje (8.14). Položme

$$B(t) = \begin{cases} A(t), & \text{když } t \in [a, t_0], \\ A(t-), & \text{když } t \in (t_0, b]. \end{cases}$$

Zřejmě $A(t) - B(t) = \Delta^- A(t)$ a

$$\text{var}_{t_0}^t (B - A) = \sum_{s \in (t_0, b]} |\Delta^- A(s)| \leq \text{var}_{t_0}^t A \quad \text{pro } t \in (t_0, b]$$

(viz důsledek 2.27). Tudíž $A - B \in \mathbb{BV}([a, b], \mathbb{R}^n)$ a $\text{var}_{t_0}^t B \leq 2 \text{var}_{t_0}^t A$. Dále podle lemmatu 6.30 je

$$\int_{t_0}^t d[A - B] x = \Delta^- A(t) x(t) \quad \text{pro } t \in (t_0, b].$$

Rovnice (8.14) se tedy na intervalu $(t_0, b]$ redukuje na

$$[I - \Delta^- A(t)] x(t) = \tilde{x} + \int_{t_0}^t d[B] x + f(t) - f(t_0)$$

a odtud snadno (také díky tomu, že je $c_{(A, t_0)} \geq 1$) odvodíme nerovnost

$$|x(t)| \leq K + L \int_{t_0}^t |x| dh \quad \text{pro } t \in [t_0, b],$$

kde $K = c_{(A,t_0)} (|\tilde{x}| + 2 \|f\|)$, $L = c_{(A,t_0)}$ a $h(t) = \text{var}_{t_0}^t B$. Funkce h je neklesající na $[t_0, b]$. Dále protože B je zleva spojitá na $(t_0, b]$, je podle lemmatu 2.24 funkce h také zleva spojitá na $(t_0, b]$. Podle zobecněného Gronwallova lemmatu 8.18 dostáváme tedy konečně první nerovnost v (8.33).

Důkaz druhé nerovnosti v (8.33) by se za pomoci varianty Gronwallovy nerovnosti ze cvičení 8.19 provedl podobně. \square

8.22 Cvičení. Za předpokladů věty 8.21 dokažte podrobně nerovnosti

$$0 < \sup_{t \in [a, t_0]} |[I + \Delta^+ A(t)]^{-1}| < \infty$$

a

$$|x(t)| \leq c_{(A,t_0)} (|\tilde{x}| + 2 \|f\|) \exp(2 c_{(A,t_0)} \text{var}_t^{t_0} A) \quad \text{pro } t \in [a, t_0].$$

8.6 Spojitá závislost řešení na parametrech a existence řešení pro regulované pravé strany

Nechť $t_0 \in [a, b]$ a $A \in \mathbb{BV}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$ splňují (8.22) a (8.23), nechť $\tilde{x} \in \mathbb{R}^n$, $f \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$ a nechť x je řešení úlohy (8.14) na $[a, b]$. Dále nechť y je na $[a, b]$ řešení počáteční úlohy

$$y(t) - \tilde{y} - \int_{t_0}^t dA y = g(t) - g(t_0), \quad (8.34)$$

kde $g \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$ a $\tilde{y} \in \mathbb{R}^n$. Potom

$$(x(t) - y(t)) = (\tilde{x} - \tilde{y}) + \int_{t_0}^t dA (x - y) + (f(t) - g(t)) - (f(t_0) - g(t_0))$$

pro $t \in [a, b]$. Podle věty 8.21 tedy máme

$$\|x - y\| \leq c_{(A,t_0)} \exp(2 c_{(A,t_0)} \text{var}_a^b A) (|\tilde{x} - \tilde{y}| + 2 \|f - g\|),$$

kde $c_{(A,t_0)} \in (0, \infty)$ je definováno v (8.32). Vidíme, že vzájemná „vzdálenost“ řešení počátečních úloh (8.14) a (8.34) je přímo úměrná tomu, jak jsou od sebe „vzdálena“ vstupní data (tj. počáteční hodnoty \tilde{x} , \tilde{y} a pravé strany f , g) těchto rovnic. Podrobněji je tento jev popsán v následující větě.

8.23 Věta. Nechť $t_0 \in [a, b]$ a $A \in \mathbb{BV}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$ splňují (8.22) a (8.23). Dále nechť $f, f_k \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$ a $\tilde{x}, \tilde{x}_k \in \mathbb{R}^n$ pro $k \in \mathbb{N}$. Předpokládejme, že

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\| = 0 \quad (8.35)$$

a

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \tilde{x}_k = \tilde{x}. \quad (8.36)$$

Nechť počáteční úlohy

$$x_k(t) - \tilde{x}_k - \int_{t_0}^t \mathbf{d} A x_k = f_k(t) - f_k(t_0) \quad (8.37)$$

mají pro $k \in \mathbb{N}$ řešení x_k na intervalu $[a, b]$. Potom má také úloha (8.14) řešení x na intervalu $[a, b]$ a platí

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|x_k - x\| = 0. \quad (8.38)$$

D ů k a z . a) V důsledku (8.35) a (8.36) existuje k_0 takové, že $\|f_k\| \leq \|f\| + 1$ a $|\tilde{x}_k| \leq |\tilde{x}| + 1$ platí pro $k \geq k_0$. Podle věty 8.21 platí tedy pro $k \geq k_0$ také

$$\|x_k\| \leq \varkappa_0 < \infty, \quad \text{kde } \varkappa_0 = c_{(A, t_0)} (|\tilde{x}| + 2 \|f\| + 3) \exp(2 c_{(A, t_0)} \text{var}_a^b A)$$

nezávisí na k . Podle téže věty máme dále

$$\text{var}_a^b (x_k - f_k) \leq \varkappa_0 \text{var}_a^b A < \infty \quad \text{pro } k \geq k_0.$$

Nyní, podle Hellyovy věty o výběru (věta 2.46) existují funkce $y \in \mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathbb{R}^n)$ a rostoucí posloupnost $\{k_\ell\} \subset \mathbb{N}$ takové, že $k_1 \geq k_0$,

$$\|y\|_{\mathbb{B}\mathbb{V}} \leq 2 \max\{\varkappa_0 \text{var}_a^b A, \varkappa_0 + \|f\| + 1\}$$

a

$$\lim_{\ell \rightarrow \infty} (x_{k_\ell}(t) - f_{k_\ell}(t)) = y(t) \quad \text{pro } t \in [a, b].$$

Vzhledem k předpokladu (8.35) to ovšem znamená, že pro každé $t \in [a, b]$ existuje limita $x(t) := \lim_{\ell \rightarrow \infty} x_{k_\ell}(t)$ a díky stejnoměrné ohraničenosti posloupnosti $\{x_{k_\ell}\}$ a pomocí Osgoodovy věty (věta 6.51) získáme pro každé $t \in [a, b]$ rovnost

$$\lim_{\ell \rightarrow \infty} \int_a^t \mathbf{d} A x_{k_\ell} = \int_a^t \mathbf{d} A x.$$

Tudíž limitním přechodem $\ell \rightarrow \infty$ v rovnici (8.37) (a také s použitím předpokladů (8.35) a (8.36)) dospějeme ke zjištění, že x je řešením úlohy (8.14) na $[a, b]$.

b) Zopakujeme-li nyní pro každé $k \in \mathbb{N}$ úvahu z úvodu tohoto odstavce, přičemž v ní x_k nahradí y , f_k nahradí g a \tilde{x}_k nahradí \tilde{y} , zjistíme, že pro každé $k \in \mathbb{N}$ platí

$$\|x - x_k\| \leq K (|\tilde{x} - \tilde{x}_k| + 2 \|f - f_k\|),$$

kde $K = c_{(A, t_0)} \exp(2 c_{(A, t_0)} \text{var}_a^b A) < \infty$ nezávisí na k . Platí tedy také (8.38). \square

Požadavek existence řešení rovnic (8.37) v předchozí větě byl podstatný. Existenční věta 8.16, kterou máme zatím k dispozici, se vztahuje pouze na případy, kdy pravá strana f má konečnou variaci na $[a, b]$.

Nyní můžeme konečně doplnit větu 8.16 na obecný případ $f \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$.

8.24 Věta. *Nechť $A \in \mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$, $t_0 \in [a, b]$ a platí (8.22) a (8.23).*

Potom pro každou funkci $f \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$ a každý vektor $\tilde{x} \in \mathbb{R}^n$ má počáteční úloha (8.14) jediné řešení na $[a, b]$.

D ů k a z . a) Máme-li dvě řešení x, y úlohy (8.14) na intervalu $[a, b]$, bude jejich rozdíl na $[a, b]$ řešením homogenní úlohy (8.17), která má ovšem podle lemmatu 8.15 pouze triviální řešení. Musí tedy platit $x \equiv y$ na $[a, b]$.

b) Položme $\tilde{x}_k = \tilde{x}$ pro $k \in \mathbb{N}$. Podle věty 4.8 existuje posloupnost $\{f_k\}$ jednoduchých skokových funkcí (tedy funkcí z $\mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathbb{R}^n)$), která konverguje stejnoměrně na $[a, b]$ k f . Podle věty 8.16 pro každé $k \in \mathbb{N}$ existuje jediné řešení x_k úlohy (8.37) a podle věty 8.23 posloupnost $\{x_k\}$ konverguje stejnoměrně k řešení úlohy (8.14). \square

Ve zbývajících částech odstavce se omezme pro jednoduchost na případ $t_0 = a$, tj. vyšetřujeme počáteční úlohu

$$x(t) - \tilde{x} - \int_a^t d A x = f(t) - f(a) \quad (8.39)$$

jako limitu úloh

$$x_k(t) - \tilde{x}_k - \int_a^t d A_k x_k = f_k(t) - f_k(a), \quad (8.40)$$

kde také jádra A_k závisí na parametru $k \in \mathbb{N}$. Tento případ je poněkud složitější než ten, který jsme řešili ve větě 8.23. Nejprve dokážeme konvergenční větu pro KS-integrály pro situaci, která není pokryta větami z kapitoly 6.

8.25 Věta. *Nechť $f, f_k \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$, $A, A_k \in \mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$ pro $k \in \mathbb{N}$. Předpokládejme, že platí (8.35),*

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|A_k - A\| = 0 \quad (8.41)$$

$$\alpha^* := \sup_{k \in \mathbb{N}} \operatorname{var}_a^b A_k < \infty. \quad (8.42)$$

Potom

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sup_{t \in [a, b]} \left| \int_a^t d A_k f_k - \int_a^t d A f \right| \right) = 0.$$

D ů k a z . Buď dáno $\varepsilon > 0$. Podle věty 4.8 můžeme zvolit funkci $\varphi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ takovou, že každá její komponenta je jednoduchá skoková funkce na $[a, b]$ a přitom $\|f - \varphi\| < \varepsilon$. Dále podle (8.35) a (8.41) můžeme zvolit $k_0 \in \mathbb{N}$ tak, aby současně platilo

$$\|f_k - f\| < \varepsilon \quad \text{a} \quad \|A_k - A\| < \varepsilon \quad \text{pro } k \geq k_0.$$

Pro dané $t \in [a, b]$ a $k \geq k_0$ máme podle vět 6.18 a 6.25

$$\begin{aligned} & \left| \int_a^t \mathbf{d} A_k f_k - \int_a^t \mathbf{d} A f \right| \\ & \leq \left| \int_a^t \mathbf{d} A_k (f_k - \varphi) \right| + \left| \int_a^t \mathbf{d} [A_k - A] \varphi \right| + \left| \int_a^t \mathbf{d} A (\varphi - f) \right| \\ & \leq (\text{var}_a^b A_k) \|f_k - \varphi\| + 2 \|A_k - A\| \|\varphi\|_{\mathbb{B}\mathbb{V}} + (\text{var}_a^b A) \|\varphi - f\| \\ & \leq \alpha^* (\|f_k - f\| + \|f - \varphi\|) + 2 \|A_k - A\| \|\varphi\|_{\mathbb{B}\mathbb{V}} + (\text{var}_a^b A) \|\varphi - f\| \\ & \leq (2\alpha^* + 2\|\varphi\|_{\mathbb{B}\mathbb{V}} + \text{var}_a^b A) \varepsilon = K \varepsilon, \end{aligned}$$

kde $K = (2\alpha^* + 2\|\varphi\|_{\mathbb{B}\mathbb{V}} + \text{var}_a^b A) \in (0, \infty)$ nezávisí ani na k ani na t . Tím je věta dokázána. \square

Dále je třeba dokázat následující pomocné tvrzení.

8.26 Lemma. *Nechť $A, A_k \in \mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$ pro $k \in \mathbb{N}$. Dále předpokládejme, že platí (8.22) (kde $t_0 = a$) a (8.41).*

Potom existuje $k_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé $k \geq k_0$ platí

$$\det [I - \Delta^- A_k(t)] \neq 0 \quad \text{pro } t \in (a, b) \quad (8.43)$$

a

$$\sup_{t \in (a, b)} |[I - \Delta^- A_k(t)]^{-1}| < 2c_A, \quad (8.44)$$

kde $c_A = c_{(A, a)} \in (0, \infty)$ je konstanta definovaná v (8.32) pro $t_0 = a$.

Důkaz. Díky (8.41) platí podle lemmatu 4.14 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|\Delta^- A_k - \Delta^- A\| = 0$.

Můžeme tedy zvolit $k_0 \in \mathbb{N}$ tak, aby bylo

$$|\Delta^- A_k(t) - \Delta^- A(t)| < \frac{1}{4c_A} \quad \text{pro } t \in [a, b] \quad \text{a } k \geq k_0. \quad (8.45)$$

Nechť $t \in (a, b]$ a $k \geq k_0$ jsou dány. Snadno ověříme, že platí rovnost

$$I - \Delta^- A_k(t) = [I - \Delta^- A(t)] [I - T_k(t)],$$

kde

$$T_k(t) = [I - \Delta^- A(t)]^{-1} (\Delta^- A_k(t) - \Delta^- A(t)).$$

Vzhledem k předpokladu (8.22) je tudíž matice $I - \Delta^- A_k(t)$ regulární tehdy a jen tehdy, když je regulární matice $I - T_k(t)$.

Podle (8.32) a (8.45) máme

$$|T_k(t)| = |[I - \Delta^- A(t)]^{-1}| |\Delta^- A_k(t) - \Delta^- A(t)| < \frac{1}{4}.$$

Lemma 8.8 tedy zaručuje, že matice $I - T_k(t)$, a tudíž také $I - \Delta^- A_k(t)$ jsou regulární, a že platí $||[I - T_k(t)]^{-1}|| < 2$. Odtud a z (8.32) plyne

$$|[I - \Delta^- A_k(t)]^{-1}| \leq |[I - T_k(t)]^{-1}| |[I - \Delta^- A(t)]^{-1}| < 2 c_A.$$

Důkaz je dokončen. \square

Nyní můžeme zformulovat a dokázat hlavní větu tohoto odstavce.

8.27 Věta. *Nechť $t_0 = a$, $A, A_k \in \mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$, $f, f_k \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$, $\tilde{x}, \tilde{x}_k \in \mathbb{R}^n$ pro $k \in \mathbb{N}$. Dále předpokládejme, že platí (8.22), (8.35), (8.36), (8.41) a (8.42).*

Potom existuje $k_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé $k \geq k_0$ má počáteční úloha (8.40) jediné řešení x_k na $[a, b]$ a platí (8.38), kde x je řešení úlohy (8.39).

Důk a z. Podle věty 8.24 má úloha (8.39) jediné řešení x na $[a, b]$. Dále podle lemmatu 8.26 existuje $k_0 \in \mathbb{N}$ takové, že (8.43) platí pro $k \geq k_0$. Tudíž, vzhledem k větě 8.24, úloha (8.40) má pro každé $k \geq k_0$ jediné řešení x_k na $[a, b]$. Položme

$$w_k = (x_k - f_k) - (x - f). \quad (8.46)$$

Potom

$$w_k(t) = \tilde{w}_k + \int_a^t dA_k w_k + h_k(t) - h_k(a) \quad \text{pro } k \in \mathbb{N} \text{ a } t \in [a, b],$$

kde $\tilde{w}_k = (\tilde{x}_k - f_k(a)) - (\tilde{x} - f(a))$ a

$$h_k(t) = \int_a^t d[A_k - A](x - f) + \left(\int_a^t dA_k f_k - \int_a^t dA f \right). \quad (8.47)$$

Dokážeme, že

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|w_k\| = 0. \quad (8.48)$$

Podle (8.42), (8.44) a věty 8.21 je

$$|w_k(t)| \leq 2 c_A (|\tilde{w}_k| + \|h_k\|) \exp(4 c_A \alpha^*) \quad \text{pro } t \in [a, b], \quad (8.49)$$

kde, podobně jako v lemmatu 8.26, píšeme c_A místo $c_{(A,a)}$. Stačí tedy dokázat, že

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |\tilde{w}_k| = 0 \quad \text{a} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \|h_k\| = 0. \quad (8.50)$$

Nejprve si povšimněme, že první vztah z (8.50) plyne okamžitě z předpokladů (8.35) a (8.36). Dále podle věty 8.25 je

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sup_{t \in [a, b]} \left| \int_a^t dA_k f_k - \int_a^t dA f \right| = 0. \quad (8.51)$$

Současně podle věty 6.25 máme

$$\left| \int_a^t d[A_k - A](x - f) \right| \leq 2 \|A_k - A\| \|x - f\|_{\mathbb{B}\mathbb{V}} \quad \text{pro } t \in [a, b].$$

Protože $(x - f) \in \mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathbb{R}^n)$ podle (8.31), plyne odtud díky (8.41), že platí také

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sup_{t \in [a, b]} \left| \int_a^t d[A_k - A](x - f) \right| = 0. \quad (8.52)$$

Souhrnem, podle (8.47) a (8.51)–(8.52) dostáváme $\lim_{k \rightarrow \infty} \|h_k\| = 0$. Platí tedy (8.50), a vzhledem k (8.49) tudíž také (8.48).

Podle (8.46) je $x_k - x = w_k + (f_k - f)$. Tvrzení věty tudíž plyne z (8.35) a (8.48). \square

8.7 Fundamentální matice

Zobecněním homogenních systémů lineárních obyčejných diferenciálních rovnic je rovnice

$$x(t) - x(s) - \int_s^t dAx = 0. \quad (8.53)$$

Nechť $A \in \mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$, $t_0 \in [a, b]$ a nechť platí (8.22) a (8.23). Potom podle věty 8.16 (kde $f(t) \equiv f(a)$ na $[a, b]$) má rovnice (8.53) pro každé $\tilde{x} \in \mathbb{R}^n$ právě jedno řešení $x \in \mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathbb{R}^n)$ na $[a, b]$ takové, že $x(t_0) = \tilde{x}$. Naopak, každému řešení x rovnice (8.53) můžeme přiřadit hodnotu $x(t_0) \in \mathbb{R}^n$. Vzhledem k poznámkám 8.3 a 8.11 je tento vztah mezi řešeními rovnice (8.53) a vektorovým prostorem \mathbb{R}^n vzájemně jednoznačný. Snadno ověříme, že jsou-li x, y řešení rovnice (8.53) na $[a, b]$ a $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$, pak $\alpha x + \beta y$ je také řešení rovnice (8.53) na $[a, b]$. Nyní můžeme tyto úvahy shrnout do následujícího tvrzení.

8.28 Věta. *Nechť $A \in \mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$ a nechť platí (8.22) a (8.23). Potom množina řešení rovnice (8.53) je lineární a tvoří podprostor $\mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathbb{R}^n)$ dimenze n .*

Nyní ukážeme, že i pro zobecněné lineární diferenciální rovnice existuje obdoba fundamentální matice. Fundamentální matici pro zobecněné lineární diferenciální rovnice definujeme následujícím způsobem.

8.29 Definice. Maticová funkce $X: [a, b] \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ se nazývá *fundamentální matice rovnice (8.53)* na intervalu $[a, b]$, jestliže splňuje rovnost

$$X(t) = X(s) + \int_s^t dAX \quad \text{pro } t, s \in [a, b] \quad (8.54)$$

a $\det X(t) \neq 0$ pro alespoň jedno $t \in [a, b]$.

8.30 Poznámka. Jestliže maticová funkce X splňuje vztah (8.54), pak snadno ověříme, že pro libovolné $c \in \mathbb{R}^n$ je funkce $x(t) = X(t)c$ řešením rovnice (8.53).

8.31 Lemma. *Nechť $A \in \mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$, $t_0 \in [a, b]$ a necht' platí (8.22) a (8.23). Potom pro každou matici $\tilde{X} \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ existuje jednoznačně určená maticová funkce $X_{t_0} \in \mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$ taková, že platí*

$$X_{t_0}(t) = \tilde{X} + \int_{t_0}^t dA X_{t_0} \quad \text{pro } t \in [a, b]. \quad (8.55)$$

D ů k a z. Pro $k = 1, 2, \dots, n$ označme k -tý sloupec matice \tilde{X} jako \tilde{x}_k . Máme tedy $\tilde{x}_k \in \mathbb{R}^n$ pro $k = 1, 2, \dots, n$ a $\tilde{X} = (\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_n)$. Podle věty 8.16 pro každé $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ existuje právě jedna funkce $x_k \in \mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathbb{R}^n)$ vyhovující rovnosti

$$x_k(t) - \tilde{x}_k - \int_{t_0}^t dA x_k = 0 \quad \text{pro } t \in [a, b].$$

Funkce $X_{t_0}(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$ (tj. maticová funkce se sloupci x_k pro $k = 1, 2, \dots, n$) splňuje tedy vztah (8.55) a je určena jednoznačně. \square

8.32 Poznámka. Je-li $t_0 \in [a, b]$, $\tilde{X} \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ a funkce X_{t_0} je určena lemmaem 8.31, pak funkce $X = X_{t_0}$ zřejmě splňuje vztah (8.54). Je-li tedy $\det \tilde{X} \neq 0$, pak je takto definovaná funkce X fundamentální maticí rovnice (8.53).

Nyní, pro usnadnění, poněkud zesílíme naše předpoklady (8.22) a (8.23). Budeme nyní předpokládat, že platí

$$a \quad \left. \begin{array}{l} \det [I - \Delta^- A(t)] \neq 0 \quad \text{pro každé } t \in (a, b) \\ \det [I + \Delta^+ A(s)] \neq 0 \quad \text{pro každé } s \in [a, b). \end{array} \right\} \quad (8.56)$$

8.33 Lemma. *Nechť $A \in \mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$ a necht' platí (8.56). Potom pro libovolnou fundamentální matici X rovnice (8.53) je*

$$\det X(t) \neq 0 \quad \text{pro každé } t \in [a, b]. \quad (8.57)$$

D ů k a z. Necht' X je fundamentální matice rovnice (8.53) na $[a, b]$ a necht' (8.57) neplatí. Potom existují body $\tau_0, \tau_1 \in [a, b]$ takové, že

$$\det X(\tau_0) \neq 0 \quad \text{a} \quad \det X(\tau_1) = 0.$$

Z druhé rovnosti plyne, že sloupce $x_1(\tau_1), x_2(\tau_1), \dots, x_n(\tau_1)$ matice $X(\tau_1)$ jsou lineárně závislé. Existují tedy koeficienty $c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ takové, že

$$\sum_{k=1}^n |c_k| > 0 \quad \text{a} \quad \sum_{k=1}^n c_k x_k(\tau_1) = 0.$$

Položme $x(t) = \sum_{k=1}^n c_k x_k(t)$ pro $t \in [a, b]$. Potom x je řešením rovnice (8.53) (viz poznámku 8.30) a $x(\tau_1) = 0$. Dosazením $s = \tau_1$ do (8.53) a odečtením takto získané rovnosti od (8.53) zjistíme, že x je řešením počáteční úlohy

$$x(t) = \int_{\tau_1}^t dA x \quad \text{pro } t \in [a, b].$$

Vzhledem k předpokladu (8.56) jsou podmínky (8.22) a (8.23) splněny pro $t_0 = \tau_1$, a protože stejnou úlohu jako x splňuje i identicky nulová funkce, plyne z věty 8.16, kde položíme $t_0 = \tau_1$, že $x = 0$ na $[a, b]$. Speciálně

$$x(\tau_0) = \sum_{k=1}^n c_k x_k(\tau_0) = 0,$$

což ovšem, vzhledem k předpokladům $\det X(\tau_0) \neq 0$ a $\sum_{k=1}^n |c_k| > 0$, není možné. \square

Připomeňme nyní některá označení užívaná pro funkce dvou proměnných.

8.34 Označení. Nechť $U: [a, b] \times [a, b] \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$. Potom pro dané $\tau \in [a, b]$ značí symboly $U(\tau, \cdot)$, resp. $U(\cdot, \tau)$ funkce jedné proměnné

$$U(\tau, \cdot) : s \in [a, b] \rightarrow U(\tau, s) \quad \text{resp.} \quad U(\cdot, \tau) : t \in [a, b] \rightarrow U(t, \tau).$$

Podobně

$$\begin{aligned} U(\tau, s+) &= \lim_{\delta \rightarrow 0+} U(\tau, s + \delta), & U(\tau, s-) &= \lim_{\delta \rightarrow 0+} U(\tau, s - \delta), \\ U(t+, \tau) &= \lim_{\delta \rightarrow 0+} U(t + \delta, \tau), & U(t-, \tau) &= \lim_{\delta \rightarrow 0+} U(t - \delta, \tau). \end{aligned}$$

Následující věta je důsledkem lemmat 8.31 a 8.33.

8.35 Věta. Nechť $A \in \mathbb{BV}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$ splňuje (8.56). Potom existuje právě jedna maticová funkce $U: [a, b] \times [a, b] \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ taková, že platí

$$U(t, s) = I + \int_s^t d[A(\tau)] U(\tau, s) \quad \text{pro } t, s \in [a, b] \times [a, b]. \quad (8.58)$$

Pro každé $t_0 \in [a, b]$ je funkce $U(\cdot, t_0) : t \in [a, b] \rightarrow U(t, t_0) \in \mathbb{R}^n$ fundamentální matice rovnice (8.53).

Funkce U má navíc tyto vlastnosti:

- (i) $U(\cdot, s) \in \mathbb{BV}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$ pro každé $s \in [a, b]$,
- (ii) $U(t, t) = I$ pro každé $t \in [a, b]$,
- (iii) $\det U(t, s) \neq 0$ pro všechna $t, s \in [a, b]$.

D ů k a z . Pro každé $s \in [a, b]$ existuje podle lemmatu 8.31 právě jedna maticová funkce $X_s \in \mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$ taková, že platí

$$X_s(t) = I + \int_s^t d A X_s \quad \text{pro } t \in [a, b].$$

Definujme $U(t, s) = X_s(t)$ pro $t, s \in [a, b]$. Potom U splňuje (8.58) a $U(t, t) = I$ pro $t \in [a, b]$. Vzhledem k poznámce 8.32 odtud plyne, že pro každé $t_0 \in [a, b]$ je $U(\cdot, t_0)$ fundamentální matice rovnice (8.53) na $[a, b]$. Konečně, podle lemmatu 8.33 je $\det U(t, s) \neq 0$ pro všechna $t, s \in [a, b]$. \square

8.36 Věta. *Nechť $A \in \mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$, $t_0 \in [a, b]$, $\tilde{x} \in \mathbb{R}^n$, nechť platí (8.56) a nechť maticová funkce U je určena větou 8.35. Potom $x : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ je řešení počáteční úlohy*

$$x(t) - \tilde{x} - \int_{t_0}^t d A x = 0 \quad (8.59)$$

na intervalu $[a, b]$ tehdy a jen tehdy, když

$$x(t) = U(t, t_0) \tilde{x} \quad \text{pro } t \in [a, b]. \quad (8.60)$$

D ů k a z . a) Dosadíme-li (8.60) do $\int_{t_0}^t d A x$ a využijeme-li (8.58), dostaneme

$$\int_{t_0}^t d A x = \int_{t_0}^t d [A(\tau)] U(\tau, t_0) \tilde{x} = (U(t, t_0) - I) \tilde{x} = x(t) - \tilde{x}$$

pro $t \in [a, b]$, tj. funkce x definovaná vztahem (8.60) je řešení úlohy (8.59).

b) Obrácená implikace plyne z jednoznačnosti řešení počáteční úlohy (8.59) (viz větu 8.16). \square

8.37 Definice. *Nechť $A \in \mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$ a nechť platí (8.56). Potom maticovou funkci U určenou větou 8.35 nazýváme *Cauchyova matice* rovnice (8.53).*

8.38 Důsledek. *Nechť $A \in \mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$, $t_0 \in [a, b]$ a $\tilde{X} \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$. Dále nechť platí (8.56) a nechť U je Cauchyova matice rovnice (8.53). Potom maticová funkce $X : [a, b] \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ splňuje rovnost*

$$X(t) = \tilde{X} + \int_{t_0}^t d A X \quad (8.61)$$

pro $t \in [a, b]$ tehdy a jen tehdy, když

$$X(t) = U(t, t_0) \tilde{X} \quad \text{pro } t \in [a, b]. \quad (8.62)$$

D ů k a z . Pro každý sloupec x_k , $k = 1, 2, \dots, n$, maticové funkce X platí podle věty 8.36

$$x_k(t) = U(t, t_0) \tilde{x}_k \quad \text{pro } t \in [a, b],$$

kde \tilde{x}_k jsou sloupce matice \tilde{X} . Odtud tvrzení okamžitě plyne. \square

8.39 Věta. *Nechť $A \in \mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$, nechť platí (8.56) a nechť U je Cauchyova matice rovnice (8.53). Potom vztahy*

$$U(t, r)U(r, s) = U(t, s), \quad (8.63)$$

$$(U(t, r))^{-1} = U(r, t) \quad (8.64)$$

platí pro libovolnou trojici bodů t, s, r z intervalu $[a, b]$.

Důkaz z. a) Pro libovolná $t, s, r \in [a, b]$ máme podle (8.58)

$$\begin{aligned} U(t, s) &= I + \int_s^t d[A(\tau)]U(\tau, s) \\ &= I + \int_s^r d[A(\tau)]U(\tau, s) + \int_r^t d[A(\tau)]U(\tau, s) \\ &= U(r, s) + \int_r^t d[A(\tau)]U(\tau, s). \end{aligned}$$

Označíme-li sloupce matice U symboly u_k , $k = 1, 2, \dots, n$, zjistíme, že pro každé $k = 1, 2, \dots, n$ a $r, s \in [a, b]$ je funkce $x(t) = u_k(t, s)$ řešením úlohy

$$x(t) - u_k(r, s) - \int_r^t dAx = 0$$

na $[a, b]$. Podle věty 8.36 tudíž platí

$$u_k(t, s) = U(t, r)u_k(r, s) \quad \text{pro } k = 1, 2, \dots, n \quad \text{a } t, s, r \in [a, b].$$

Odtud už vztah (8.63) okamžitě plyne.

b) Speciálně jestliže $t = s$, pak podle věty 8.35 dostáváme $U(t, r)U(r, t) = I$ pro každé $r \in [a, b]$. Vzhledem k větě 8.35 (iii) tedy platí (8.64). \square

8.40 Poznámka. Je-li U Cauchyova matice pro (8.53), pak podle věty 8.39 platí

$$U(t, s) = U(t, a)U(a, s) = U(t, a)(U(s, a))^{-1} \quad \text{pro } t, s \in [a, b].$$

Označíme-li tedy $X(t) = U(t, a)$, bude platit $U(t, s) = X(t)(X(s))^{-1}$ pro $t, s \in [a, b]$. Připomeňme, že X je fundamentální matice rovnice (8.53).

Ve zbývajícím části tohoto odstavce uvedeme ještě několik dalších vlastností Cauchyovy matice rovnice (8.53).

8.41 Věta. *Nechť $A \in \mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$, nechť platí (8.56) a nechť U je Cauchyova matice rovnice (8.53). Potom existuje $M \in (0, \infty)$ takové, že platí*

$$|U(t, s)| + \text{var}_a^b U(\cdot, s) + \text{var}_a^b U(t, \cdot) \leq M \quad \text{pro } t, s \in [a, b]. \quad (8.65)$$

D ů k a z . a) Pro $k = 1, 2, \dots, n$ označme symbolem e_k k -tý sloupec jednotkové matice I . Potom $|e_k| = 1$ pro každé $k = 1, 2, \dots, n$. Podle věty 8.21 máme

$$|u_k(t, s)| \leq M_1 := c_A \exp(2c_A \operatorname{var}_a^b A) < \infty \text{ pro } t, s \in [a, b] \text{ a } k = 1, 2, \dots, n,$$

kde díky předpokladu (8.56) můžeme položit

$$c_A := \max \left\{ 1, \sup_{t \in (a, b)} |[I - \Delta^- A(t)]^{-1}|, \sup_{t \in (a, b)} |[I + \Delta^+ A(t)]^{-1}| \right\}.$$

Tudíž

$$|U(t, s)| = \max_{k=1,2,\dots,n} |u_k(t, s)| \leq M_1 \text{ pro } t, s \in [a, b]. \quad (8.66)$$

b) Nechť $t_1, t_2, s \in [a, b]$ a $t_1 \leq t_2$. Potom

$$|u_k(t_2, s) - u_k(t_1, s)| = \left| \int_{t_1}^{t_2} d[A(\tau)] u_k(\tau, s) \right| \leq M_1 \operatorname{var}_{t_1}^{t_2} A.$$

Pro libovolné $s \in [a, b]$, $k = 1, 2, \dots, n$ a libovolné dělení σ intervalu $[a, b]$ tedy máme

$$V(u_k(\cdot, s), \sigma) \leq M_1 \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \operatorname{var}_{\sigma_{j-1}}^{\sigma_j} A = M_1 \operatorname{var}_a^b A =: M_2 < \infty,$$

a proto

$$\operatorname{var}_a^b U(\cdot, s) \leq \max_{k=1,2,\dots,n} \operatorname{var}_a^b u_k(\cdot, s) \leq M_2 \text{ pro } s \in [a, b]. \quad (8.67)$$

c) Nechť $s_1, s_2 \in [a, b]$ a $s_1 \leq s_2$. Potom pro každé $t \in [a, b]$ máme

$$\begin{aligned} & u_k(t, s_2) - u_k(t, s_1) \\ &= \int_{s_2}^t d[A(\tau)] u_k(\tau, s_2) - \int_{s_2}^t d[A(\tau)] u_k(\tau, s_1) - \int_{s_1}^{s_2} d[A(\tau)] u_k(\tau, s_1) \\ &= - \int_{s_1}^{s_2} d[A(\tau)] u_k(\tau, s_1) + \int_{s_2}^t d[A(\tau)] (u_k(\tau, s_2) - u_k(\tau, s_1)). \end{aligned}$$

Funkce $x(t) = u_k(t, s_2) - u_k(t, s_1)$ je tedy na $[a, b]$ řešením počáteční úlohy

$$x(t) = - \int_{s_1}^{s_2} d[A(\tau)] u_k(\tau, s_1) + \int_{s_2}^t dA x.$$

Podle věty 8.36 pro každé $t \in [a, b]$ a $k = 1, 2, \dots, n$ platí

$$u_k(t, s_2) - u_k(t, s_1) = -U(t, s_2) \left(\int_{s_1}^{s_2} d[A(\tau)] u_k(\tau, s_1) \right).$$

Tudíž $|u_k(t, s_2) - u_k(t, s_1)| \leq M_1^2 \operatorname{var}_{s_1}^{s_2} A$ pro $k = 1, 2, \dots, n$ a $t \in [a, b]$.

Pro libovolné $t \in [a, b]$, $k = 1, 2, \dots, n$ a libovolné dělení σ intervalu $[a, b]$ platí

$$V(u_k(t, \cdot), \sigma) \leq M_1^2 \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \text{var}_{\sigma_{j-1}}^{\sigma_j} A = M_1^2 \text{var}_a^b A =: M_3 < \infty,$$

a proto

$$\text{var}_a^b U(t, \cdot) \leq \max_{k=1,2,\dots,n} \text{var}_a^b u_k(t, \cdot) \leq M_3 \quad \text{pro } t \in [a, b]. \quad (8.68)$$

d) Podle (8.65)–(8.67) tvrzení věty platí pro $M = M_1 + M_2 + M_3$. \square

8.42 Věta. *Nechť $A \in \mathbb{B}\mathbb{V}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$, nechť platí (8.56) a nechť U je Cauchyova matice rovnice (8.53). Potom platí*

$$\left. \begin{aligned} U(t+, s) &= [I + \Delta^+ A(t)] U(t, s) && \text{pro } t \in [a, b], s \in [a, b], \\ U(t-, s) &= [I - \Delta^- A(t)] U(t, s) && \text{pro } t \in (a, b], s \in [a, b], \\ U(t, s+) &= U(t, s) [I + \Delta^+ A(s)]^{-1} && \text{pro } t \in [a, b], s \in [a, b], \\ U(t, s-) &= U(t, s) [I - \Delta^- A(s)]^{-1} && \text{pro } t \in [a, b], s \in (a, b]. \end{aligned} \right\} (8.69)$$

D ů k a z. Nejprve si všimněme, že podle předchozí věty mají funkce $U(\cdot, s)$ a $U(t, \cdot)$ konečné variace na $[a, b]$ pro libovolná $t, s \in [a, b]$. Všechny jednostranné limity objevující se ve vztazích (8.69) tedy mají smysl.

a) První dva vztahy odvodíme, jestliže do vztahů (8.13) z lemmatu 8.15 dosadíme postupně za x sloupce maticové funkce U .

b) Nechť $s \in [a, b]$ a $\delta \in (0, b - s)$. Potom podle (8.58) máme

$$\begin{aligned} U(t, s + \delta) - U(t, s) &= \int_{s+\delta}^t d[A(\tau)] U(\tau, s + \delta) - \int_s^t d[A(\tau)] U(\tau, s) \\ &= \int_{s+\delta}^t d[A(\tau)] (U(\tau, s + \delta) - U(\tau, s)) - \int_s^{s+\delta} d[A(\tau)] U(\tau, s) \end{aligned}$$

pro každé $t \in [a, b]$. Maticová funkce $Y(t) = U(t, s + \delta) - U(t, s)$ tedy splňuje rovnost

$$Y(t) = \tilde{Y} + \int_{s+\delta}^t d[A(\tau)] Y(\tau) \quad \text{pro } t \in [a, b],$$

kde

$$\tilde{Y} = - \int_s^{s+\delta} d[A(\tau)] U(\tau, s).$$

Podle důsledku 8.38 tudíž máme

$$\begin{aligned} U(t, s + \delta) - U(t, s) &= Y(t) = U(t, s + \delta) \tilde{Y} \\ &= -U(t, s + \delta) \int_s^{s+\delta} d[A(\tau)] U(\tau, s) \end{aligned}$$

pro $t \in [a, b]$. Limitním přechodem $\delta \rightarrow 0+$ při použití Hakeovy věty 6.42 odtud dostaneme

$$U(t, s+) - U(t, s) = -U(t, s+) \Delta^+ A(s) U(s, s) = -U(t, s+) \Delta^+ A(s)$$

neboli $U(t, s) = U(t, s+) [I + \Delta^+ A(s)]$. Odtud okamžitě plyne platnost třetího vztahu z (8.69). Zbývající rovnost bychom dokázali analogicky. \square

Pro funkce dvou proměnných je možno definovat pojem variace několika různými způsoby. Pro nás je zajímavá definice Vitaliova.

8.43 Definice. Nechť $F : [a, b] \times [a, b] \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$. Pro daná dělení σ, ρ intervalu $[a, b]$, $j = 1, 2, \dots, \nu(\sigma)$ a $k = 1, 2, \dots, \nu(\rho)$ položme

$$\Delta_{j,k}(F, \sigma, \rho) = F(\sigma_j, \rho_k) - F(\sigma_{j-1}, \rho_k) - F(\sigma_j, \rho_{k-1}) + F(\sigma_{j-1}, \rho_{k-1}).$$

Potom veličina

$$v(F) = \sup_{\sigma, \rho \in \mathcal{D}[a,b]} \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \sum_{k=1}^{\nu(\rho)} |\Delta_{j,k}(F, \sigma, \rho)|$$

se nazývá *Vitaliova variace* funkce F na intervalu $[a, b] \times [a, b]$.

8.44 Věta. Nechť $A \in \mathbb{BV}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$, nechť platí (8.56) a nechť U je Cauchyova matice rovnice (8.53). Potom $v(U) < \infty$.

Důkaz. Mějme dvě libovolná dělení σ, ρ intervalu $[a, b]$. Podle věty 8.39 (viz též poznámku 8.40) je $U(t, s) = U(t, a) U(a, s)$ pro $t, s \in [a, b]$. Pro libovolná $j = 1, 2, \dots, \nu(\sigma)$ a $k = 1, 2, \dots, \nu(\rho)$ tedy máme

$$\begin{aligned} & \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \sum_{k=1}^{\nu(\rho)} |\Delta_{j,k}(U, \sigma, \rho)| \\ &= \sum_{j=1}^{\nu(\sigma)} \sum_{k=1}^{\nu(\rho)} \left| [U(\sigma_j, a) - U(\sigma_{j-1}, a)] [U(a, \rho_k) - U(a, \rho_{k-1})] \right| \\ &\leq \text{var}_a^b U(\cdot, a) \text{var}_a^b U(a, \cdot) \leq M^2, \end{aligned}$$

kde $M < \infty$ bylo určeno ve větě 8.41. \square

8.8 Nehomogenní rovnice

Vraťme se nyní k nehomogenní počáteční úloze

$$x(t) - \tilde{x} - \int_{t_0}^t dA x = f(t) - f(t_0). \quad (8.14)$$

Budeme předpokládat, že $A \in \mathbb{BV}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$ splňuje (8.56). Pro libovolná $\tilde{x} \in \mathbb{R}^n$ a $f \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$ existuje podle věty 8.24 jediné řešení x počáteční úlohy (8.14) a toto řešení je regulované na $[a, b]$.

Následující věta ukazuje, že toto řešení je možno vyjádřit ve tvaru připomínajícím formuli *variace konstant* známou z teorie obyčejných diferenciálních rovnic.

8.45 Věta. *Nechť $t_0 \in [a, b]$, $A \in \mathbb{BV}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$ splňuje (8.56) a nechť U je Cauchyova matice rovnice (8.53). Potom úloha (8.14) má pro každé $\tilde{x} \in \mathbb{R}^n$ a každé $f \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$ jediné řešení x na $[a, b]$. Toto řešení je dáno formulí*

$$x(t) = U(t, t_0) \tilde{x} + f(t) - f(t_0) - \int_{t_0}^t d_s[U(t, s)] (f(s) - f(t_0)) \quad \left. \vphantom{x(t)} \right\} \quad (8.70)$$

pro $t \in [a, b]$.

Je zřejmé, že pro podrobný důkaz je nutné něco vědět o integrálních operátorech typu

$$\mathcal{K}: x \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n) \rightarrow y(t) = \int_{t_0}^t d_s[K(t, s)] x(s), \quad (8.71)$$

kde funkce K má stejné vlastnosti jako Cauchyova matice U příslušné homogenní rovnice a symbol d_s naznačuje, že integrujeme funkce proměnné s , zatímco t je zde parametr. Vzhledem k vlastnostem funkce U popsaným v předešlém odstavci je vidět, že pro každou funkci $x \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$ je její obraz $y = \mathcal{K}x$ dobře definován na celém intervalu $[a, b]$. (Jde vždy o integraci funkce regulované vzhledem k funkci s konečnou variací.) Bohužel, vlastnosti operátorů tvaru (8.72) nejsou už tak na první pohled zřejmé. Navíc, abychom dokázali, že funkce x je řešením úlohy (8.14), potřebujeme umět zaměnit pořadí integrace ve dvojném integrálu

$$\int_a^t d[A(\tau)] \left(\int_{t_0}^{\tau} d_s[U(\tau, s)] (f(s) - f(t_0)) \right)$$

tak, aby bylo možno využít vztah (8.58) definující funkci U . K tomu je nutné mít k dispozici aparát umožňující zacházení s dvojnými integrály. Ten se opírá též o pojem variace funkcí dvou proměnných zavedený v definici 8.43. Toto vše se v potřebném rozsahu už do tohoto textu nevejde. Nebudeme zde tedy provádět podrobné důkazy a jenom se pokusíme aspoň přiblížit jejich hlavní myšlenky. Většinou není obtížné doplnit vynechané detaily na základě znalosti postupů z předešlých kapitol. Podrobnosti týkající se variace funkcí dvou proměnných a integrálních operátorů určených takovýmito funkcemi lze najít zejména v kapitole III monografie [11] a v odstavci I.6 a kapitole II monografie [55]. Formule variace konstant pro $f \in \mathbb{BV}([a, b], \mathbb{R}^n)$ je dokázána v [55, III.2] nebo v [45, Theorem 6.17], zatímco v [59, Proposition 4.4.3] je dokázána pro f regulovanou.

Omezíme se nyní na případ $t_0 = a$, tj. hledáme řešení úlohy (8.39). Důkaz je rozdělen na 4 kroky:

Nejprve definujeme

$$K(t, s) = \begin{cases} U(t, s) & \text{když } a \leq s \leq t \leq b, \\ U(t, t) & \text{když } a \leq t < s \leq b. \end{cases}$$

Zřejmě je $\text{var}_a^b K(t, \cdot) \leq \text{var}_a^t U(t, \cdot)$ a $\text{var}_a^b K(\cdot, s) \leq \text{var}_s^b U(\cdot, s)$ pro libovolná $t, s \in [a, b]$. Lze také dokázat, že je $v(K) < \infty$ (viz [55, Lemma III.2.7]). Existuje tedy konstanta $\varkappa \in (0, \infty)$ taková, že

$$v(K) + \text{var}_a^b K(t, \cdot) + \text{var}_a^b K(\cdot, s) \leq \varkappa < \infty \quad \text{pro } t, s \in [a, b].$$

Dále pro každé $x \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$ je funkce

$$y: t \in [a, b] \rightarrow \int_a^b \mathbf{d}_s [K(t, s)] x(s) \quad (8.72)$$

dobře definována na $[a, b]$, přičemž

$$\int_a^c \mathbf{d}_s [K(t, s)] x(s) = \int_a^t \mathbf{d}_s [U(t, s)] x(s) \quad \text{pro každé } t \in [a, b] \text{ a } c \in [t, b].$$

Podle [55, Theorem I.6.18] je $\text{var}_a^b y \leq v(K) \|x\| < \infty$.

Druhý krok spočívá v důkazu, že platí

$$y(t+) = \int_a^b \mathbf{d}_s [K(t+, s)] x(s) \quad \text{když } t \in [a, b), \quad (8.73)$$

$$y(t-) = \int_a^b \mathbf{d}_s [K(t-, s)] x(s) \quad \text{když } t \in (a, b]. \quad (8.74)$$

Podle [55, Lemma I.6.14] mají všechny funkce

$$K(t+, \cdot) \text{ a } K(s-, \cdot), \quad t \in [a, b), s \in (a, b],$$

konečnou variaci na $[a, b]$, a tudíž jsou integrály na pravých stranách v (8.73) dobře definovány. Protože x je na $[a, b]$ stejnoměrná limita jednoduchých skokových funkcí, stačí dokázat, že rovnosti (8.73) platí pro každou funkci typu

$$\chi_{[a, \tau]}, \chi_{[\tau, b]}, \quad \tau \in [a, b]. \quad (8.75)$$

Je-li například $x = \chi_{[a, \tau]}$, kde $\tau \in [a, b]$, pak pro každé $t \in [a, b]$ dostaneme (viz (6.18)) $y(t) = K(t, \tau+) - K(t, a)$, a tudíž

$$y(t+) = K(t+, \tau+) - K(t+, a) \quad \text{když } t \in [a, b)$$

a

$$y(t-) = K(t-, \tau+) - K(t-, a) \quad \text{když } t \in (a, b].$$

Na druhou stranu, máme

$$\begin{aligned} \text{a} \quad & \int_a^b \mathbf{d}_s [K(t+, s)] \chi_{[a, \tau]} = K(t+, \tau+) - K(t+, a) \quad \text{když } t \in [a, b] \\ & \int_a^b \mathbf{d}_s [K(t-, s)] \chi_{[a, \tau]} = K(t-, \tau+) - K(t-, a) \quad \text{když } t \in (a, b], \end{aligned}$$

tj. platí (8.73) pro $x = \chi_{[a, \tau]}$. Podobně bychom ověřili platnost relací (8.73) pro funkce tvaru $x = \chi_{[\tau, b]}$, $\tau \in [a, b]$, a tedy i pro každou funkci $x \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$.

Vidíme tedy, že funkce $x(t)$ definovaná formulí (8.70) je regulovaná na $[a, b]$ pro každou funkci $f \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$ a každý vektor $\tilde{x} \in \mathbb{R}^n$.

Třetím krokem je důkaz, že za našich předpokladů je pro každé $t \in [a, b]$ a každou funkci $f \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$ pravdivá relace Fubiniova typu

$$\begin{aligned} \int_a^t \mathbf{d} [A(\tau)] \left(\int_a^\tau \mathbf{d}_s [K(\tau, s)] (f(s) - f(a)) \right) \\ = \int_a^t \mathbf{d}_s \left[\int_a^\tau \mathbf{d} [A(\tau)] K(\tau, s) \right] (f(s) - f(a)). \end{aligned}$$

V důkazu tohoto kroku se opět využije stejnoměrná aproximace regulovaných funkcí jednoduchými skokovými funkcemi, vzorce z příkladů 6.15 a konvergenční vlastnosti KS-integrálu. Navíc je ovšem nutno také použít vlastnosti operátorů

$$\text{tvaru } f \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n) \rightarrow \int_a^b K(\cdot, s) \mathbf{d} [f(s)].$$

Na závěr dosadíme (8.70), tj.

$$x(t) = U(t, a) \tilde{x} + f(t) - f(a) - \int_a^t \mathbf{d}_s [K(t, s)] (f(s) - f(a)),$$

do integrálu $\int_a^t \mathbf{d} A x$ a, vzhledem k definici funkce K , dostaneme

$$\begin{aligned} \int_a^t \mathbf{d} A x &= \int_a^t \mathbf{d} [A(\tau)] U(\tau, a) \tilde{x} + \int_a^t \mathbf{d} [A(s)] (f(s) - f(a)) \\ &\quad - \int_0^t \mathbf{d} [A(\tau)] \left(\int_a^\tau \mathbf{d}_s [U(\tau, s)] (f(s) - f(a)) \right) \\ &= [U(t, a) - I] \tilde{x} + \int_a^t \mathbf{d} [A(s)] (f(s) - f(a)) \\ &\quad - \int_0^t \mathbf{d} [A(\tau)] \left(\int_a^\tau \mathbf{d}_s [K(\tau, s)] (f(s) - f(a)) \right) \\ &= [U(t, a) - I] \tilde{x} + \int_a^t \mathbf{d} [A(s)] (f(s) - f(a)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& - \int_a^t \mathrm{d}_s \left[\int_a^s \mathrm{d}[A(\tau)] K(\tau, s) \right] (f(s) - f(a)) \\
&= [U(t, a) - I] \tilde{x} + \int_a^t \mathrm{d}[A(s)] (f(s) - f(a)) \\
&\quad - \int_a^t \mathrm{d}_s \left[\int_a^s \mathrm{d}[A(\tau)] U(\tau, \tau) \right] (f(s) - f(a)) \\
&\quad - \int_a^t \mathrm{d}_s \left[\int_s^t \mathrm{d}[A(\tau)] U(\tau, s) \right] (f(s) - f(a)) \\
&= [U(t, a) - I] \tilde{x} + \int_a^t \mathrm{d}[A(s)] (f(s) - f(a)) \\
&\quad - \int_a^t \mathrm{d}[A(s)] (f(s) - f(a)) - \int_a^t \mathrm{d}_s [U(t, s) - I] (f(s) - f(a)) \\
&= [U(t, a) - I] \tilde{x} - \int_a^t \mathrm{d}_s [U(t, s)] (f(s) - f(a)) \\
&= x(t) - \tilde{x} - f(t) + f(a).
\end{aligned}$$

Funkce x je tedy řešením úlohy (8.39) na $[a, b]$. Tímto je důkaz věty 8.45 dokončen.

Jestliže je funkce A spojitá zleva na intervalu $(a, b]$ a $t_0 = a$, pak je možno vzorec (8.70) poněkud zjednodušit, definujeme-li $X(t) = U(t, a)$ pro $t \in [a, b]$ a

$$Y(s) = \begin{cases} U(a, s+), & \text{když } a \leq s < b, \\ U(a, b), & \text{když } s = b. \end{cases} \quad (8.76)$$

8.46 Důsledek. *Nechť $t_0 = a$ a $A \in \mathbb{BV}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$ je zleva spojitá na $(a, b]$ a platí $\det[I + \Delta^+ A(t)] \neq 0$ pro $t \in [a, b]$. Nechť U je Cauchyova matice rovnice (8.53), $X(t) = U(t, a)$ pro $t \in [a, b]$ a Y je definovaná předpisem (8.76).*

Potom rovnice (8.39) má pro každé $\tilde{x} \in \mathbb{R}^n$ a každou funkci $f \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$ zleva spojitou na $(a, b]$ jediné řešení x na $[a, b]$. Toto řešení je dáno formulí

$$x(t) = X(t) \tilde{x} + X(t) \left(\int_a^t Y \mathrm{d}f \right) \quad \text{pro } t \in [a, b]. \quad (8.77)$$

D ů k a z. Nechť $\tilde{x} \in \mathbb{R}^n$ a nechť $f \in \mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$ je zleva spojitá na $(a, b]$. Podle věty 8.45 má rovnice (8.39) jediné řešení x na $[a, b]$. Formulí (8.70) můžeme přepsat ve tvaru

$$x(t) = X(t) \tilde{x} + (f(t) - f(a)) - X(t) \left(\int_a^t \mathrm{d}[X^{-1}(s)] (f(s) - f(a)) \right),$$

kde $X^{-1}(s) = U(a, s)$ pro $s \in [a, b]$. Máme $X^{-1}(s) = Y(s) - \Delta^+ X^{-1}(s)$ pro

$s \in [a, b)$. Podle lemmatu 6.34 je pro každé $t \in [a, b]$

$$\begin{aligned} & \int_a^t d[X^{-1}(s)] (f(s) - f(a)) \\ &= \int_a^t d[Y(s)] (f(s) - f(a)) - \Delta^+ X^{-1}(t) (f(t) - f(a)). \end{aligned}$$

Protože f je zleva spojitá na $(a, b]$ a Y je zprava spojitá na $[a, b)$, integrací per partes (věta 6.36) dostaneme pro každé $t \in [a, b]$

$$\begin{aligned} x(t) &= X(t) \tilde{x} + (f(t) - f(a)) - X(t) \left(\int_a^t d[X^{-1}(s)] (f(s) - f(a)) \right) \\ &= X(t) \tilde{x} - (f(t) - f(a)) + X(t) \int_a^t Y \, d f \\ &\quad + X(t) \Delta^+ X^{-1}(t) (f(t) - f(a)) - X(t) Y(t) (f(t) - f(a)). \end{aligned}$$

Konečně, protože pro každé $t \in [a, b]$

$$\begin{aligned} & X(t) \Delta^+ X^{-1}(t) (f(t) - f(a)) - X(t) Y(t) (f(t) - f(a)) \\ &= X(t) (X^{-1}(t+) - X^{-1}(t)) (f(t) - f(a)) - X(t) X^{-1}(t+) (f(t) - f(a)) \\ &= -(f(t) - f(a)), \end{aligned}$$

dostáváme konečně (8.77). □

Díky větě 8.45, resp. jejímu důsledku 8.46 je již možné s úspěchem vyšetřovat například okrajové úlohy, ve kterých se hledá funkce, která splňuje na intervalu $[a, b]$ rovnici (8.59) a navíc i nějaké dodatečné podmínky, například dvoubodové podmínky $Mx(a) + Nx(b) = 0$, kde $M, N \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$. To je ale už jiný příběh, který se do tohoto textu, stejně jako řada dalších témat, jako jsou souvislosti s funkcionálně-diferenciálními rovnicemi, dynamickými systémy na tzv. časových škálách (*time scales*), aplikace na úlohy s impulsy a další, už opravdu nevejde. Jako doplňkovou literaturu k této kapitole lze doporučit například monografie [12], [27], [45], [59] nebo články [1], [7], [38], [51], [52].

Literatura

- [1] S. AFONSO, E. M. BONOTTO, M. FEDERSON AND Š. SCHWABIK. Discontinuous local semiflows for Kurzweil equations leading to LaSalle's invariance principle for non-autonomous systems with impulses. *J. Differential Equations* **250** (2011) 2969–3001.
- [2] M. BROKATE, P. KREJČÍ. Duality in the space of regulated functions and the play operator. *Mathematische Zeitschrift* **245** (2003) 667–688.
- [3] P. DRÁBEK, A. KUFNER. *Úvod do funkcionální analýzy*. (Učební text, ZČU Plzeň, 1993)
[http://www.kma.zcu.cz/0000_DATA/eBOOKs/Drabek/UFA.pdf].
- [4] M. DIMIAN, P. KREJČÍ, H. LAMBA, S. MELNIK, D. RACHINSKII. Explicit solution of a market model with interacting agents: Drawdowns, drawups, financial bubbles, and stochastic resonance. In preparation.
- [5] N. DUNFORD, J.T. SCHWARTZ. *Linear Operators I, II*. Interscience Publishers, New York & London, 1958 a 1963.
- [6] D. FRAŇKOVÁ. Regulated functions. *Mathematica Bohemica* **116** (1991) 20–59.
- [7] Z. HALAS, G. MONTEIRO AND M. TVRDÝ. Emphatic convergence and sequential solutions of generalized linear differential equations. *Mem. Differential Equations Math. Phys.* 54 (2011), 27–49.
- [8] I. HALPERIN. *Introduction to the Theory of Distributions*. University of Toronto Press, Toronto, 1952.
- [9] R. HENSTOCK. *Lectures on the Theory of Integration*. World Scientific, Singapore, 1988.
- [10] T. H. HILDEBRANDT. On integrals related to and extensions of the Lebesgue integrals. *Bull. Amer. Math. Soc.* (2) **24** (1917) 113–144, (1918) 177–202.
- [11] T. H. HILDEBRANDT. *Theory of Integration*. Academic Press, New York & London, 1963.
- [12] CH. S. HÖNIG. *Volterra Stieltjes-Integral Equations*. North Holland & American Elsevier, Mathematics Studies 16, Amsterdam & New York, 1975.
- [13] CH. S. HÖNIG. Volterra-Stieltjes integral equations. In: *Functional Differential Equations and Bifurcation, Proceedings of the Saõ Carlos Conference 1979* (Lecture Notes in Mathematics 799, Springer-Verlag, Berlin, 1980), pp. 173–216.
- [14] V. JARNÍK. *Diferenciální počet II*. Academia, Praha, 1976.
[<http://dml.cz/handle/10338.dmlcz/402004>].

- [15] V. JARNÍK. *Integrální počet II*. Academia, Praha, 1976.
[<http://dml.cz/handle/10338.dmlcz/402027>].
- [16] A.N. KOLMOGOROV, S.V. FOMIN. *Základy teorie funkcí a funkcionální analýzy*. SNTL, Praha, 1975.
- [17] J. KRÁL. *Teorie potenciálu*. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1965.
- [18] P. KREJČÍ. The Kurzweil integral with exclusion of negligible sets. *Mathematica Bohemica* **128** (2003) 277–292.
- [19] P. KREJČÍ. The Kurzweil integral and hysteresis. In: *Proceedings of the International Workshop on Multi-Rate Processes and Hysteresis* (Cork, 3.4.2006–8.4.2006, eds: M. Mortell, R. O'Malley, A. Pokrovskii, V.Sobolev). *Journal of Physics: Conference Series* **55**, (2006) 144–154.
- [20] P. KREJČÍ, J. KURZWEIL. A nonexistence result for the Kurzweil integral. *Mathematica Bohemica* **127** (2002) 571–580.
- [21] P. KREJČÍ, PH. LAURENÇOT. Generalized variational inequalities. *Journal of Convex Analysis* **9** (2002), 159–183.
- [22] P. KREJČÍ, M. LIERO. Rate independent Kurzweil processes. *Applications of Mathematics* **54** (2009) 117–145.
- [23] J. KURZWEIL. *Obyčejné diferenciální rovnice. (Úvod do teorie obyčejných diferenciálních rovnic v reálném oboru.)* SNTL, Praha, 1978. *Czechoslovak Mathematical Journal* **8(83)** (1958), 360–387.
- [24] J. KURZWEIL. *Nichtabsolut konvergente Integrale*. Teubner-Verlag, Leipzig, 1980.
- [25] J. KURZWEIL. *Henstock-Kurzweil Integration : Its Relation to Topological Vector Spaces*. World Scientific, Singapore, 2000.
- [26] J. KURZWEIL. *Integration Between the Lebesgue Integral and the Henstock-Kurzweil Integral: Its Relation to Local Convex Vector Spaces*. World Scientific, Singapore, 2002.
- [27] J. KURZWEIL. Generalized ordinary differential equations (Not Absolutely Continuous Solutions). Series in Real Analysis–Vol. 11, World Scientific, Singapore, 2012.
- [28] J. KURZWEIL. Generalized ordinary differential equation and continuous dependence on a parameter. *Czechoslovak Mathematical Journal* **7(82)** (1957), 418–449.
- [29] J. KURZWEIL. Generalized ordinary differential equations. *Czechoslovak Mathematical Journal* **8(83)** (1958) 360–387.
- [30] H. LEBESGUE. Sur l'intégrale de Stieltjes et sur les opérations fonctionnelles linéaires. *Comptes Rendus* **150** (1910), 86–88.
- [31] J. LUKEŠ. *Teorie míry a integrálu*. Státní ped. nakladatelství, Praha, 1972.

- [32] J. LUKEŠ. *Úvod do funkcionální analýzy*. Karolinum, Univerzita Karlova v Praze, 2011.
- [33] J. LUKEŠ, J. MALÝ. *Measure and Integral*. matfyzpress, Praha, 1995 [http://www.mff.cuni.cz/to.en/fakulta/mfp/download/books/luke-maly_-_measure_and_integral.pdf].
- [34] R. M. MCLEOD. *The generalized Riemann integral*. Carus Monograph, No.2, Mathematical Association of America, Washington, 1980.
- [35] J. MAŘÍK. Základy teorie integrálu v Euklidových prostorech I–III. *Časopis pro pěstování matematiky* **77** (1952) (1) 1–51, (2) 125–145, (3) 267–301.
- [36] J. MAWHIN. L’eternal retour des sommes de Riemann-Stieltjes dans l’évolution du calcul intégral. *Bulletin de la Soc. Royale des Sciences de Liège* **70** (2001) (4-5-6) 345–364.
- [37] G. MONTEIRO, M. TVRDÝ. On Kurzweil-Stieltjes integral in Banach space, *Mathematica Bohemica* **137** (2012), 365–381.
- [38] G. MONTEIRO, M. TVRDÝ. Generalized linear differential equations in a Banach space: Continuous dependence on a parameter. *Discrete and Continuous Dynamical Systems* **33** (2013) 283–303.
- [39] O. PERRON. *Die Lehre von den Kettenbrüchen*. Teubner, Leipzig, 1913.
- [40] F. RIESZ. Sur les opérations fonctionnelles linéaires. *Comptes Rendus Acad. Sci. Paris* **149** (1909), 974–977.
- [41] W. RUDIN. *Functional Analysis*. McGraw-Hill Series in Higher Mathematics, New York, 1973.
- [42] S. SAKS. *Théorie de l’Intégrale*. Monografie Matematyczne, Warszawa, Lwów, 1933.
Anglický překlad: *Theory of the Integral*. Monografie Matematyczne, Warszawa, Lwów, 1937.
- [43] E. SCHECHTER. *Handbook of Analysis and its Foundations*. Academic Press, San Diego, 1997.
- [44] M. SCHECHTER. *Principles of Functional Analysis*. Academic Press, New York & London, 1973.
- [45] Š. SCHWABIK. *Generalized Ordinary Differential Equations*. Series in Real Analysis–Vol. 5, World Scientific, Singapore, 1992.
- [46] Š. SCHWABIK. *Integrace v \mathbb{R} (Kurzweilova teorie)*. Karolinum, Univerzita Karlova v Praze, 1999.
- [47] Š. SCHWABIK. Verallgemeinerte lineare Differentialgleichungssysteme. *Časopis pro pěstování matematiky* **96** (1971) 183–211.
- [48] Š. SCHWABIK. On the relation between Young’s and Kurzweil’s concept of Stieltjes integral. *Časopis pro pěstování matematiky* **98** (1973) 237–251.

- [49] Š. SCHWABIK. On a modified sum integral of Stieltjes type. *Časopis pro pěstování matematiky* **98** (1973) 274–277.
- [50] Š. SCHWABIK. Abstract Perron-Stieltjes integral. *Mathematica Bohemica* **121** (1996), 425–447.
- [51] Š. SCHWABIK. Linear Stieltjes integral equations in Banach spaces. *Mathematica Bohemica* **124** (1999), 433–457.
- [52] Š. SCHWABIK. Linear Stieltjes integral equations in Banach spaces II: operator valued solutions. *Mathematica Bohemica* **125** 2000, 431–454.
- [53] Š. SCHWABIK. A note on integration by parts for abstract Perron-Stieltjes integrals, *Mathematica Bohemica* **126** 2001, 613–629.
- [54] Š. SCHWABIK, P. ŠARMANOVÁ. *Malý průvodce historií integrálu*. Prometheus, Praha, 1996 [http://dml.cz/handle/10338.dmlcz/400862].
- [55] Š. SCHWABIK, M. TVRDÝ, O. VEJVODA. *Differential and Integral Equations: Boundary Value Problems and Adjoint*. Academia and Reidel. Praha and Dordrecht, 1979 [http://dml.cz/handle/10338.dmlcz/400391].
- [56] A. SLAVÍK. Dynamic equations on time scales and generalized ordinary differential equations. *J. Math. Anal. Appl.* **385** (2011), 534–550.
- [57] T. J. STIELTJES. *Recherches sur les fractions continues*. Ann. Fac. Sci. Toulouse Sci. Math. Sci. Phys. **8** (1894), J1–122, **9** (1895) A1–47. Přetištěno v *Oeuvres II* (P. Noordhoff, Groningen, 1918), 402–566.
Anglický překlad: *Investigations on continued fractions*. In: T. J. Stieltjes, *Collected Papers* Vol. II (Springer-Verlag, Berlin, 1993), 609–745.
- [58] A. E. TAYLOR. *Úvod do funkcionální analýzy*. Academia, Praha, 1973.
- [59] M. TVRDÝ. *Differential and Integral Equations in the Space of Regulated Functions*. Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics vol.25 (2002), pp. 1–104.
- [60] C. J. DE LA VALLÉE POUSSIN. *Intégrales de Lebesgue, Fonctions d'Ensemble. Classes de Baire*. Paris, 1916.
- [61] E. B. VAN VLECK. Haskin's momental theorem and its connection with Stieltjes's problem of moments. *Trans. Amer. Math. Soc* **18** (1917), 326–330.
- [62] A. J. WARD. The Perron-Stieltjes integral. *Mathematische Zeitschrift* **41** (1936), 578–604.
- [63] L. C. YOUNG. *The Theory of Integration*. Cambridge, 1927.
- [64] L. C. YOUNG. An inequality of the Hölder type, connected with Stieltjes integration. *Acta Mathematica* **67** (1936), 251–282.
- [65] W. H. YOUNG. Integration with respect to a function of bounded variation. *Proc. London Math. Soc.* (2) **13** (1914), 109–150.

Věcný rejstřík

- bilinéární zobrazení, 151
- část funkce
 - absolutně spojitá, 53
 - skoková, 38, 53
 - spojitá, 38
 - spojitá singulární, 53
- dělení intervalu, 9, 13, 63
 - δ -jemné, 107
 - značené, 63
- délka křivky, 17
- diferenciální rovnice
 - lineární, 173
 - s impulsy, 173
 - s impulsy, 172
 - zobecněná lineární, 172
 - homogenní, 192
 - nehomogenní, 199
- distribuce, 167
 - Diracova, 167
- duální pár, 151
- formule variace konstant, 199
- funkce
 - absolutně spojitá, 43
 - Heavisideova, 167
 - jednoduchá skoková, 32
 - lipschitzovská, 20
 - ohraňčená esenciálně, 160
 - ohraňčená v podstatě, 160
 - regulovaná, 55
 - regulární, 59
 - s konečnou variací, 17
 - normalizovaná, 157
 - singulární, 32
 - skoková, 32
 - testovací, 166
- integrace per-partes, 88, 132
- integrál
 - (δ)RS, 64
 - (δ)Riemannův-Stieltjesův, 64
 - (σ)RS, 64
 - (σ)Riemannův-Stieltjesův, 64
 - abstraktní, 149
 - Cauchyův, 105
 - Darbouxův, 96
 - dolní, 94
 - horní, 94
 - Dushnikův (vnitřní), 149
 - KN (Krejčího), 149
 - křivkový druhého druhu, 15
 - křivkový prvního druhu, 15
 - KH, 108
 - Kurzweilův-Henstockův, 108
 - KS, 108
 - Kurzweilův-Stieltjesův, 108
 - Lebesgueův, 43
 - LS, 147
 - Lebesgueův-Stieltjesův, 147
 - Mooreův-Pollardův, 64
 - Perronův, 146
 - PS, 147
 - Perronův-Stieltjesův, 147
 - dolní, 147
 - horní, 147
 - Riemannův, 14, 64
 - RS, 64
 - Riemannův-Stieltjesův, 64
 - středový, 105
 - Stieltjesův, 15
 - vektorové funkce, 16
 - Youngův, 148
- integrální součet
 - Riemannův, 13
 - Riemannův-Stieltjesův, 63
- integrand, 64

- integrátor, 64
- kalibr, 107
- lemma
 - Arzelàovo, 96
 - Cousinovo, 108
 - Gronwallovo, 183
 - zobecněné, 183
 - Rieszovo, 49
 - Saksovo-Henstockovo, 134
- lineární funkcionál, 151
 - ohraničený, 151
 - spojitý, 151
- majoranta, 146
- matice
 - Cauchyova, 195
 - fundamentální, 192
- minoranta, 146
- míra nulová, 31
- množina nulové míry, 31
- modul oscilace, 56
- moment
 - setrvačnosti, 15
 - statický, 14
- operátor
 - lineární, 175
 - kompaktní, 176
 - ohraničený, 176
 - spojitý, 176
 - spojitý, 175
- počáteční úloha, 177
- podmínka
 - Bolzanova-Cauchyova, 67, 109
 - Lipschitzova, 20
 - pseudoaditivita, 74
- podpokrytí, 55
- pokrytí intervalu, 55
 - otevřené, 55
- posloupnost prostá, 9
- prostor
 - adjungovaný, 151
 - duální, 151
- pseudoaditivita, 74
- rozklad funkce s konečnou variací
 - Jordanův, 38
 - Lebesgueův, 52
- semivariace, 150
- skoro všude (s.v.), 31
- substituce, 86, 87, 147, 148
- variace funkce, 17
 - Vitaliova, 198
- vektor značek, 13, 63
- věta
 - Bolzanova-Weierstrašova, 26
 - Fredholmova, 176
 - Fubiniova (malá), 34
 - Hahnova-Banachova, 152
 - Hakeova, 137
 - Heinova-Borelova, 56
 - Hellyova
 - o konvergenci integrálu, 98
 - o výběru, 39
 - Jordanova
 - druhá, 17
 - první, 36
 - Lebesgueova
 - o derivaci monotónní funkce, 31
 - o rozkladu funkce s konečnou variací, 52
 - o integraci per-partes, 88, 132
 - o střední hodnotě, 104
 - Osgoodova, 96, 143
 - Rieszova, 153
- zjemnění, 9, 63
- značka intervalu, 13, 63

Symboly

FUNKCE

χ_M , 10
 $f(x-), f(x+)$, 11
 f^{AC} , 53
 f^{SC} , 53
 f^{B} , 38, 53
 f^{C} , 38
 $U(\tau, \cdot), U(\cdot, \tau)$, 194

INTEGRÁLY

$\int_a^b f(x) \, dx$, 14
 $\int_a^b f \, dg$, 64, 108
 $(\delta) f, (\sigma) f$, 64
 $(\text{PS}) \int_a^b f \, dg$, 147

MNOŽINY

$[a, b], (a, b), [a, b), (a, b], [a]$, 9
 \setminus, \subset , 9
 $\overline{M}, \text{Lin } M$, 11
 $\{x \in A : B(x)\}$, 9
 $\{x_n\}$, 9
 $\mathcal{A}(\delta)$, 108
 $\mathcal{A}(\delta; [a, b])$, 108
 $\mathcal{D}[a, b]$, 9
 $\mathcal{G}[a, b]$, 107
 $\tau(\sigma)$, 63
 $\mathcal{S}[a, b]$, 63

PROSTORY

$\text{AC}[a, b]$, 43
 $\text{B}[a, b]$, 32
 $\text{BV}[a, b]$, 17
 $\text{BV}([a, b], \mathcal{L}(\mathbb{R}^n))$, 171
 $\text{C}^1([a, b], \mathbb{R}^n)$, 171
 $\mathcal{D}[a, b]$, 166
 $\mathcal{D}^*[a, b]$, 167
 $\mathbb{G}[a, b]$, 55
 $\mathbb{G}([a, b], \mathbb{R}^n)$, 171
 $\mathbb{G}_{\text{L}}[a, b]$, 59

$(\mathbb{G}_{\text{L}}[a, b])^*$, 164

$\mathbb{G}_{\text{L}}[a, b]$, 59

$\mathbb{G}_{\text{R}}[a, b]$, 59

$\tilde{\mathbb{G}}_{\text{R}}[a, b]$, 59

$\mathbb{G}_{\text{reg}}[a, b]$, 59

$(\mathbb{G}_{\text{reg}}[a, b])^*$, 162

$\tilde{\mathbb{G}}_{\text{reg}}[a, b]$, 59

$\text{L}^1[a, b]$, 11

$\text{L}^\infty[a, b]$, 160

$\mathcal{L}(\mathbb{X}, \mathbb{Y})$, 176

$\mathcal{L}(\mathbb{X}, \mathbb{Y}), \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$, 11

\mathbb{N} , 9

$\text{NBV}[a, b]$, 157

\mathbb{R} , 9

\mathbb{R}^m , 9

$\mathbb{S}[a, b]$, 32

\mathbb{X}^* , 151

OSTATNÍ SYMBOLY

$A^+, A^-, \text{sign}(A)$, 10

sup ess , 160

$\sum_{x \in (a, b)}$, 31

$S_{f\Delta g}(\sigma, \xi)$, 64

$S_{f\Delta g}(\sigma, \xi; [a, b])$, 64

$\Delta^+, \Delta^-, \Delta$, 11

$V(f, \sigma)$, 17

$\text{var}_a^b f$, 17

$\sigma' \supset \sigma, \nu(\sigma), |\sigma|$, 9

$\omega_J(f), \omega_\sigma(f)$, 56

$\omega(S_{f\Delta g}; [c, d])$, 79

$|I|$, 9

$\|\cdot\|$, 10

$\|\cdot\|_1$, 11

$\|\cdot\|_{\mathbb{G}}$, 58

$f_n \rightrightarrows f$, 10

$x_n \rightarrow A$, 10

doc. RNDr. Milan Tvrđý, CSc.
Stieltjesův integrál (Kurzweilova teorie)
Výkonný redaktor prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
Odpovědná redaktorka Bc. Vendula Drozdová
Technická redakce autor
Grafické zpracování obálky Jiří Jurečka

Vydala a vytiskla Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
www.upol.cz/vup

Olomouc 2012

č.z. 2012/520

1. vydání

ISBN 978-80-244-3240-3

Předložená monografie je první česky psaná ucelená učebnice Stieltjesova integrálu. Z valné části je založena na autorově vlastním výzkumu. Její hlavní předností je zařazení moderní teorie založené na Kurzweilově definici zobecněného integrálu, která umožňuje maximálně rozšířit třídy integrovatelných funkcí a zjednodušit důkazy základních vlastností integrálu. Jsou zde také ukázány aplikace ve funkcionální analýze a v teorii diferenciálních rovnic. Kniha je určena studentům matematiky v rámci magisterského nebo doktorandského studia, ale i specialistům v oboru. Exaktní výklad je doplněn řadou příkladů a cvičení.



9 788024 432403
