

104. *Callidium cedri*, n. sp. — Long. 9-15 mm.; lat. max. coleopt. 2,5-5,3 mm. — *Corpus ex toto aerarium, antennis versus apicem tarsisque brunneis, pube reclinata necnon pilis longioribus erectis (capite, pronoto, coleopterorum basi, parte infera, pedibus) aureo hirtum, deplanatum, clypeo et labro exceptis opacum, densissime usque ad apicem punctato-rugosum. Antennae dimidium corporis valde superantes. Pronotum ante basin dilatatum, bifoveatum, latius quam longius (apud feminam) fere duplo. Coleoptera triplo longiora, ad humeros maximam latitudinem explentia. — Maris antennae longiores, pronotum parum dilatatum.*

Larva vitam agit in ligno emortuo Cedri atlanticae.

Crête du Haïzer (Djurdjura) et Atlas de Blida; éclos de branches de cèdre de 6 à 8 cm. de diamètre rapportées à Alger : un ♂, de très petite taille, sorti le 30 mars, et trois ♀, sorties vers la fin mai (les deux plus grandes venaient de l'Atlas de Blida).

Ce *Callidium*, voisin par sa sculpture de *C. violaceum* L. d'Europe, dont la larve vit dans le sapin (sec. MULSANT), en diffère sensiblement par sa couleur d'un bronzé mat, la pubescence plus longue et plus fournie et le pronotum plus court, presque aussi large que les élytres. Sa découverte en deux régions aussi éloignées et aussi dissemblables donne à penser que, comme la majorité des parasites du cèdre, il accompagne cette essence dans tous les points aujourd'hui disjoints de son aire géographique actuelle.

Description d'un *Eretmotus* nouveau, du Maroc

[COL. HISTERIDAE]

par André THÉRY.

Eretmotus Peyerimhoffi, n. sp. — Très voisin d'*E. tangerianus* Mars., qui lui-même diffère de tous les autres *Eretmotus* par la forme du pronotum dont les côtés divergent brusquement au tiers postérieur. Distinct par le pronotum plus court et nettement ponctué, le mésosternum arrondi (au lieu d'être triangulaire), les stries prosternales complètement effacées en avant (au lieu d'être simplement atténuées). Sculpture du dessous du corps plus dense et plus marquée; élytres sensiblement élargis en arrière de l'épaule, à pointillé visible; couleur plus noire et taille plus petite. Saillie prosternale très rugueuse sur toute sa surface.