

Elytres d'un roux testacé, ordinairement un peu noirâtres sur la suture et le bord externe ; pattes entièrement noires. v. *C nigripes* Kr.

Elytres flaves avec les pattes entièrement claires, rarement avec les cuisses postérieures courtement obscurcies à l'extrémité,

v. *D. flavipes* Pic.

Hesperophanes Muls.

H. affinis Luc. Je désignerai sous le nom de v. *pubescens* une modification provenant de Tougourt (coll. Pic) caractérisée par la pubescence générale très dense et assez longue, d'un gris blanchâtre, parsemée de quelques petites taches dénudées, soit sur le prothorax, soit sur les élytres.

Rhopalopus Muls.

Rh. femoratus L. Cette espèce offre quelquefois les cuisses très rembrunies et il n'est pas impossible que l'on capture un jour des exemplaires présentant ces organes franchement noirs.

Rh. clavipes F. Parfois chez cette espèce la forme est relativement étroite et allongée, rappelant un peu celle de *Rh. spinicornis*, plus rarement encore les pattes passent au brunâtre. Je possède un seul exemplaire de cette dernière modification provenant de Grenoble.

Purpuricenus Fisch.

Pur. Desfontainesi ou *Desfontainei* F. — Tableaux des var. nommées.

Prothorax en majeure partie rouge ou au moins aussi rouge que noir 1.

Prothorax en majeure partie noir. (var.) *nigricollis* Pic.

1. Elytres présentant une bande ou tache noire humérale.

Forme type.