

antice posticeque aequaliter angustatum, basi modice transverse constrictum, lateribus medio rotundatis et tuberculo instructis; superficie parum convexa, dense, subtiliter punctata, parce nigro-pilosa, vittisque tribus ochraceis ornata. Scutello rotundato, ochraceo-tomentoso. Elytris atro-coeruleis, pronoto latioribus et plus quam triplo longioribus, humeris modice productis et elevatis, infra hos lateribus parallelis, apice conjunctim rotundo; superficie planatim convexa, intra humeros parum longitudinaliter impressa, subrude rugoso-punctata, punctatura versus apicem sensim subtiliore. Subtus nigra, nigro-cinereo-pubescentia, pectore subtiliter rugoso-punctato, abdomine et pedibus transverse aciculatis. Tarsorum articulis basi cano-, apice vero nigro-pubescentibus.

In Asia minore inventa.

Színezetére nézve az Agap. pilicornis-hoz hasonló; de rövidebb és szélesebb, előháta sűrűbben és gyöngébben pontozott, három szennysárga sával s minden felén dudorkával jelölt, röptyűi erősebben redősen-pontozottak és csápjainak idoma különböző. — A fej fekete, sűrűn pontozott, bolyhos fekete szörökkel fedett, homloka kevéssé domborodott s fejtetőjén szennysárga vonal van; a hím csápjai a testnél kissé hosszabbak, a nőstényei rövidebbek, első s második izülékök fekete, az előbbi sűrűn pontozott és bolyhos fekete szörű, a harmadik a negyediknél egy harmadával hosszabb és minden kettő rötszinű, de végeik feketék, a következők is közepükig rötszinűek s innét fogva feketék. Előháta rövid, előre s hátrafelé egyenlően keskenyedett, alapjánál kissé harántan összeszorult, oldalai középen kerekítettek s dudorkával ellátottak; felülete kissé domborodott, sűrűn és finomul pontozott s három szennysárga sávval diszitett. Paizsa kerekített és szennysárga molyhos szörözettel fedett. Röptyűi setétképek, a torjnál szélesebbek és több mint háromszor hosszabbak, vállszögleteik kissé kiállók s emelkedettek, ezek mögött az oldalak párhuzamosak és végeik közösen kerekítettek; felületük kissé laposan domborodott, a vállszögleteken belül hosszában némileg benyomott, meglehetősen durván s redősen pontozott, de a pontozat hátrafelé lassankint gyengülő. Alul fekete, hamvas-fekete pelyhedző szörökkel; melle finomul redősen-pontozott; hasa és lábai harántan karczoltak. A kocsák ízei tövükönél fehér, végeiken pedig fekete pelyhes-szörökkel borítottak. — Hossza 11 m/m .

Hazája Kis-Ázsia.

2. PHYTOECIA ARMENIACA.

Nigra, brevis, latiuscula, dense cinereo-pubescentia; pronoto rufo, margine antico anguste, postico late nigro-cinctis, punctis quatuor transverse positis lineaque ante scutellum elevata nigris, nitidis; elytris flavidо-rufis, nigro-holosericeo maculatis et punctatis; tibiis rufis apice nigris. (♀)

Long. 11. lat 4 m/m .

Caput nigrum, rugoso-punctatum, cinereo-pubescent; fronte parum convexa, inter antennas macula parva nitida, linea divisa notata; antennis nigris, supra cinereo-, subtus cano-pubescentibus, articulis tertio et quarto aequilongis, supra obscure brunescens. Pronotum breve, lateribus medio rotundatis, basi parum constrictum, rugoso-punctatum, rufum, margine antico anguste, basali in medio latius nigro, disco modice transversim convexo, punctis quatuor transverse positis lineaque brevi ante basim nigris, nitidis ornato, puncta duo intermedia paulo majuscula sunt et callosa, lateralia vero plana et cum fascia marginis postici, oblique ascende, nixa. Scutellum rotundatum, cinereo pubescent. Elytra pronoto multo latiora, humeris callose prominulis, infra hos mox angustata, dein usque ad infra medium suparallelala, hinc vero ad apicem leniter angustata; apice oblique truncato; in dorso subplana, sat dense, basi fortius, postice subtilius punctata et pubescentia subtili cana tecta, flavidо-rufa, maculis et punctis nigro-holosericeis ornata, et quidem: ad basim maculis duabus obliquis subreniformibus, infra has duabus paulo majoribus etiam obliquis conicis, ante apicem duabus transversis utrinque abbreviatis, in disco punctis aliquot congregatis, in latere 3—4 longitudinaliter dislocatis et in deflexione elytrorum post humeros punto majusculo. Subtus nigra, subtiliter punctulata et dense cinereo-pubescent. Femoribus tarsisque nigris, cinereo-pubescentibus; tibiis rufis, apice et posticis etiam basi nigris.

Eximia haec species in Armenia ad Diarbekir olim ab ALBERTO KINDERMANN detecta est.

Feje fekete, redősen pontozott, finom hamvas szörökkel borított, homloka kevessé domborodott, a csápok között kis, fényes hosszvonalakkal átszelt, folttal jelölt; csápjai feketék, felül hamvas-, alul fehérszürke pelyhes szörösséggel, a harmadik és negyedik íz egyenlő hosszaságúak s felül homályos-barnásak. Az előtorj rövid, kerekített oldalakkal, alapjánál kissé összeszorult, redősen-pontozott, rötszinű, előszéle vékonyan, alapja közepén szélesben feketével szegélyzett, korongja kevessé harántan domborodott, négy harántan fekvő fekete, fényes petytyel, két középső petty valamivel nagyobb és emelkedett, az oldalvástiak pedig laposak s az alapszélén levő fekete szalag által, mely ferdén fölfelé szélesbedik, érintetnek. A paizs kerekített s hamvas-pelyhesszőrű. A röptyük a torjnál sokkal szélesebbek, vállszögleteik pittyedten kiállók, ezek mögött az oldalak tüstént keskenyednek, azután közepeiken túlig majdnem párhuzamosak, innét pedig büütök felé lassudan keskenyedettek, a büttő ferdén metszett, korongjuk laposdad, meglehetősen sűrűn, alapjok alatt erősebben, hátul gyöngébben pontozottak, finom, fehér-szürke pelyhedző szörökkel borítottak, sárgás-rötszinűek s bársony-fekete foltokkal és pettyekkel diszitettek; jelesen: alapjukon két ferde, majdnem veseidomú folt, ezek alatt két valamivel nagyobb, szintén ferdén helyezett kúpidomú, végeik előtt két haránt, minden két felén rövidített,