

## OD RADIKÁLOVÝCH A FOTOCHEMICKÝCH REAKCÍ K BIOKOMPATIBILNÍM LÁTKÁM

**VLADIMÍR CÍRKVA**

Ústav chemických procesů, Akademie věd České republiky,  
Rozvojová 135, 165 02, Praha 6, e-mail: cirkva@icpf.cas.cz

Přednáška nositele Baderovy ceny za rok 2000

Výzkum biokompatibilních látek<sup>1</sup> se v poslední době stal hlavním a progresivním směrem na poli organické i bioorganické chemie. Snahou je připravit výhodným způsobem nové syntetické látky, které budou mít podobné či srovnatelné vlastnosti v porovnání s přírodními materiály, případně vlastnosti výhodnější. Zvýšená pozornost je věnována materiálům s dobrou propustností kyslíku, které se mohou stát vhodnými náhradami pro cévy, tkáně, srdeční chlopňe a v neposlední řadě také materiály pro nové kontaktní čočky. Do této oblasti patří i příprava nových krevních náhrad ve spojitosti s nedostatkem krve ve světě pro náročné operace.


Použití fluoru jako modifikujícího substituentu v biologicky aktívnych molekulách je dobře známo<sup>2</sup>. U sloučenin s delším fluorovaným řetězcem se projevuje zvýšená propustnost pro plyny či celkové snížení povrchového napětí. Těchto fyzikálně-chemických vlastností bylo využito při přípravě několika nových biokompatibilních látek a materiálů<sup>3</sup>.

Výzkum s cílem připravit nové biokompatibilní látky začal studiem radikálových a fotochemických adicí na fluorované olefiny v systémech s alkanoly<sup>4</sup>, THF<sup>5</sup> a 1,3-dioxolany<sup>6</sup>. Vedle nových příprav byla studována také regioselektivita reakce, nově bylo objeveno několik efektů<sup>7,8</sup> (sterický vliv, délka a typ fluorovaného řetězce či silný vliv terminálního


atomu chloru u chlorfluorpropenů). Požadovaný fluoralkylový řetězec byl do molekuly zaveden také pomocí epoxidů, které byly připraveny novou selektivní metodou<sup>9,10</sup>. Reaktivita<sup>11</sup> těchto epoxidů byla využita při syntéze nových biokompatibilních tenzidů pro krevní náhrady (obr. 1) a amfifilních monomerů pro kontaktní čočky s vysokým transportem kyslíku (obr. 2).

## LITERATURA

- Církva V.: *Disertační práce*. VŠCHT, Praha 1997.
- Banks R. E., Smart B. E., Tatlow J. C.: *Organofluorine Chemistry, Principles and Commercial Applications*. Plenum Press, New York 1994.
- Lowe K. C.: *Artif. Cells, Blood Substitutes, Immob. Biotechnol.* 28, 25 (2000).
- Církva V., Polák R., Paleta O.: *J. Fluor. Chem.* 80, 135 (1996).
- Paleta O., Církva V., Kvíčala J.: *J. Fluor. Chem.* 80, 125 (1996).
- Církva V., Paleta O.: *J. Fluor. Chem.* 94, 141 (1999).
- Církva V., Böhm S., Paleta O.: *J. Fluor. Chem.* 102, 159 (2000).
- Paleta O., Církva V., Budková Z., Böhm S.: *J. Fluor. Chem.* 86, 155 (1997).
- Církva V., Améduri B., Boutevin B., Kvíčala J., Paleta O.: *J. Fluor. Chem.* 74, 97 (1995).
- Církva V., Améduri B., Boutevin B., Paleta O.: *J. Fluor. Chem.* 83, 151 (1997).
- Církva V., Améduri B., Boutevin B., Paleta O.: *J. Fluor. Chem.* 84, 53 (1997).



Obr. 1. Příklady nových fluorovaných biotenzidů pro krevní náhrady



Obr. 2. Nové fluorované monomery pro kontaktní čočky