



Zahájení na nádraží v Srbsku u Berouna
Doc. L. Hrouda (vpravo) a dr. P. Špryňar, naši průvodci



Rukevník východní (*Bunias orientalis*),
brukvovitá rostlina, planě rostoucí u cest,



Rukevník východní, detail květenství



Vlaštovičník větší (*Chelidonium majus*)
z čeledi Papaveraceae



Kvetoucí šalvěj luční (*Salvia pratensis*)



Pryšec chvojka (*Euphorbia cyparissias*), jedovatá rostlina z čeledi pryšcovitých



Hrachor jarní (*Lathyrus vernus*), známý také jako lecha jarní



Jahodník truskavec (*Fragaria moschata*)
má z planých druhů největší plody



Jahodník obecný (*Fragaria vesca*),
běžnější v trávnících, má drobnější plody



Vzrostlá řepka (brukek řepka, *Brassica napus*) ze sousedního pole výškou převyšuje mnohé účastníky exkurze



Hlaváček letní (*Adonis aestivalis*), polní plevel



Hloh jednosemenný (*Crataegus monogyna*)



Celkový pohled na lom Na Chlumu, nyní již netěžený. Některé chodby slouží jako zimoviště netopýrů, jiné jsou zazděné.



Jeřáb břek (*Sorbus torminalis*)



Úročník bolhoj (*Anthyllis vulneraria*)



Hlaváček jarní (*Adonis vernalis*), jeden z pozdních květů, většina rostlin již byla odkvetlá



Pipla osmahlá (*Nonea pulla*), z čeledi brutnákovitých



kosatec nízký (*Iris pumila*) zatím nekvětl



mateřídouška (*Thymus* sp.)



Koniklec (*Pulsatila patens* v. *nigricans*) již má
téměř zralá semena



Chrpa chlumní (*Centaurea triumfetti*) v květu



Okrotice bílá (*Cephalanthera damasonium*)
roste v řídkých lesích. Těsně před rozkvětem.



Rozrazil rozprostřený (*Veronica prostrata*)
na skalkách a kamenitých cestách



Heřmánkovec nevonný (*Tripleurospermum inodorum*),
běžný polní plevel



Brslen evropský (*Euonymus europaeus*) v plném květu
Nápadný je na podzim červenooranžovými plody
(viz detail v pravém horním rohu)



Kokořík vonný (*Polygonatum odoratum*)



Jetel ladní (*Trifolium campestre*),
drobná rostlinka se žlutými květy



Zběhovec ženevský (*Ajuga genevensis*)



česnek zelinny (Allium oleraceum) v habrovém lese



Hlístník hnízdák (*Neottia nidus-avis*)
nezelená rostlina, která po zahřátí plamenem
zápalky vytvoří v buňkách chlorofyl



Svízel vonný (*Galium odoratum*),
spíše známý jako mářinka vonná



Medovník velkokvětý (*Melittis melissophyllum*),
naše nejnápadnější hluchavkovitá rostlina




Vraní oko čtyřlisté (*Paris quadrifolia*), jedovatá rostlina. Zde již po odkvětu.



Bubovické vodopády



řeřicha hořká (*Cardamine amara*),
rostlina mokrých stanovišť



Kozí brada východní (*Tragopogon orientalis*),
luční rostlina.



Vesnovka obecná (*Lepidium draba*, dříve *Cardaria draba*)
na jaře 2-3 týdny bohatě kvete, zbytek roku je nenápadná.